

Chir.

270^f

2724K

1. 10

OPHTHALMIATRIK.

NACH DEN NEUESTEN FORSCHUNGEN

FÜR

DAS STUDIUM UND DIE PRAXIS

BEARBEITET

VON

Dr. C. H. Schauenburg,

Docenten an der Universität in Bonn.

Mit Holzschnitten und vier lithographirten Tafeln.

LAHR,

VERLAG VON J. H. GEIGER (M. SCHAUENBURG).


1856.

hir. 270 $\frac{1}{2}$


Schauenburg

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Schematischer Horizontaldurchschnitt des rechten Auges.



OPHTHALMIATRIK.

NACH DEN NEUESTEN FORSCHUNGEN

FÜR

DAS STUDIUM UND DIE PRAXIS


BEARBEITET

VON

Dr. C. H. Schauenburg,

Docenten an der Universität in Bonn.

Mit Holzschnitten und vier lithographirten Tafeln.




LAHR,

VERLAG VON J. H. GEIGER (M. SCHAUENBURG).

1856.

Druck von **J. H. Geiger** in Lahr.



LAHR

1855

Sr. MAGNIFICENZ

DEM ZEITIGEN

RECTOR DER UNIVERSITÄT

ZU

BONN,

Herrn Geheimen Medicinalrath Dr. Antzer,

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER CHIRURGIE,

DIRECTOR DER CHIRURGISCHEN UND AUGENÄRZTLICHEN

KLINIK,

DIRECTOR DER DELEGIRTEN

EXAMINATIONS-COMMISSION FÜR ÄRZTE,

RITTER etc. etc.

Wenn es möglich ist, durch Zurückgabe eines kleinen Theiles dessen, was uns aus reicher Fülle mit freigebiger Hand gespendet worden ist, Dank zu beweisen, so wünsche

IV

ich, dass mir dies gelingen möge, indem ich Ihnen, hochverehrter Lehrer und Gönner, dieses Buch widme.

Das treue Wohlwollen, welches Sie mir seit dem Jahre 1840, wo ich zuerst Ihr Zuhörer war, erwiesen haben, Ihr förderlicher Rath in meinen Bestrebungen, Ihre thätige Beihülfe in meinen Arbeiten erfüllen mich mit aufrichtiger und unwandelbarer Ergebenheit; aber das Bewusstsein, als Ihr Schüler und demnächst als Ihr klinischer Assistent von Ihrem gelehrten Wissen, von Ihrer sichern practischen Thätigkeit und von Ihrem unermüdlichen Lehreifer so grossen Gewinn gezogen zu haben, als mein Vermögen gestattete, macht es mir zu einer erhebenden Pflicht, auch offen dem Danke Worte zu geben, den Ihnen mit mir Unzählige in ähnlich hohem Grade schuldig sind.

Darf ich noch einen Wunsch hinzufügen, so ist es der, dass Ihnen noch viele Jahre gegönnt sein möchten, rüstig zu wirken und fröhlichen Gemüthes auf eine lange und gesegnete Laufbahn zurückzublicken.

SCHAUENBURG.

Vorwort.

Die Aufgabe, welche ich mir bei der Abfassung dieser Ophthalmiatrik stellte war eine zwiefache. Ich wollte das gesammte Material sowohl vom naturwissenschaftlichen als vom empirischen Standpunkte aus prüfen und sichten und die Ausbeute meiner Arbeit in möglichster Kürze und Uebersichtlichkeit derart darstellen, dass der beschäftigte wie der studirende Arzt dem Buche die Bezeichnung wissenschaftlicher Strenge und praktischer Brauchbarkeit nicht versagen könnten.

Die an sich grossen Schwierigkeiten, welche ich bei der Lösung dieser Doppelaufgabe zu überwinden hatte, waren durch die ungewöhnlichen

VI

Fortschritte, deren sich die ophthalmische Physiologie und Diagnostik in ihrer letzten Periode rühmen dürfen, noch sehr gesteigert. Während die pathologische Anatomie nur eine langsame und stetige Förderung unserer Erkenntniss gestattet, ist die Optik, indem sie der Forschung neue Gesichtspunkte anwies, Anlass geworden, dass die Gesamtlehre in kurzer Zeit überraschend bereichert wurde und dass die Capitel von den inneren Augenkrankheiten eine andere Gestalt annehmen mussten. Von einem grossen Theile der überkommenen Lehrsätze ist Abstand zu nehmen und manches Neue muss substituirt werden, dem es, den Dogmenfreunden gegenüber, schwer halten wird, das ihm zuständige Bürgerrecht zu verschaffen. Letzterer Umstand ist indess keineswegs in dem Grade zu beklagen, wie vielfältig geschieht, da er wesentlich dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit gespannt zu erhalten und Irrgängen vorzubeugen. Je mannichfaltiger z. B. die Ergebnisse der ophthalmoskopischen Untersuchungsmethode ausfallen, um so nothwendiger wird es, durch vorsichtige Wiederholung der Experimente, durch weitere Beobachtung des Krankheitsverlaufes und

-ausgangs im einzelnen Falle, durch statistische Uebersichten und durch möglichst zahlreiche Sectionsbefunde den wahren Werth derselben festzustellen.

An den einschlagenden Arbeiten habe ich nach Kräften theilgenommen und ich gestehe offen, dass die reine Freude an diesen Arbeiten mich schadlos gehalten hat für viele Unbilden, die mir um sie zufielen.

Hinsichtlich der Methode der Bearbeitung des ophthalmiatischen Materials verweise ich auf das Buch selbst und erwarte den Erfolg, den es bei dem ärztlichen Publikum finden wird. Nur in Bezug auf die Systematisirung bemerke ich, dass ich gern auf ein künstliches System, von denen stets eines das andere stürzt, Verzicht geleistet habe und der anatomischen Topographie ihrer bekannten und bedeutenden Vorzüge halber bis zum Schluss treu geblieben bin. Die Krankheitsnamen, unter denen das Einzelne zum Vortrag gebracht wird, bezeichnen desshalb bald recente anomale Processe, bald Resultate solcher.

Die hauptsächlich zu diagnostischen Zwecken nothwendigen physicalischen, ebenso die chirurgi-

VIII

schen Operationen habe ich getrennt abgehandelt und im Texte auf sie verwiesen, für die Augeneilmittel habe ich mir einen besonderen Anhang erlaubt und ein Glossarium mit dem alphabetischen Register vereinigt, um der obsoleten Terminologie schon beim ersten Nachschlagen ihren Platz in der Geschichte anzuweisen.

Das Buch erscheint später, als meine ursprüngliche Absicht war, zum Theil wegen einer Reihe wichtiger Vorarbeiten, bei denen ich mich der Theilnahme des Herrn Professor Donders in Utrecht erfreute.

Einen besonderen Dank aber fühle ich mich schliesslich noch gedrungen dem Herrn Geheimrath Professor Wutzer in Bonn auszusprechen, der mich, seit ich als erster Assistenzarzt in der Bonner Universitätsklinik eintrat, mit der ihm eigenthümlichen Liberalität jederzeit bei meinen Arbeiten unterstützt hat.

Godesberg, im Sommer 1855.

Schauenburg.

Inhaltsverzeichniss.

	pag.
Einleitung	1—5
I. Die Lider	5—20
Ablepharon	5
Coloboma palpebr.	5
Ankyloblepharon	6
Phimosis palpebr.	6
Symblepharon	6
Lagophthalmos	7
Blepharoptosis	7
Epicanthus	8
Entropium	9
Ectropium	10
Trichiasis, Distichiasis	11
Madarosis	12
Phthiriasis	12
Hordeolum	12
Chalazion	13
Milium	14
Laesiones palpebr., Corpora aliena	14
Blepharitis phlegmonosa	14
— erysipelatos	15

	pag.
Blepharadenitis ciliaris	16
— Meybomiana	18
Crusta lactea palpebr.	19
Furunculus, Carbunculus simplex und contagiosus	19
Warzen, Krebs, Muttermäler etc.	20
II. Die Bindehäute	20—44
Conjunctivitis simplex	20
— exanthematica	21
— catarrhalis	22
— trachomatosa	23
— lymphatica	27
— blennorrhoeica	29
— A. Ophthalmia neonatorum	30
— B. — gonorrhoeica	32
— C. — aegyptiaca	33
— membranacea, — Diphtheritis	35
Chemosis	39
Xerosis conjunctivae	40
Pterygium	40
Pinguecula	42
Laesiones conjunctivae	42
Haemorrhagia conj.	43
Neoplasmata conj.	43
III. Hornhaut und Kammersystem	45—76
Keratitis pustulosa	45
— pannosa	46
— parenchymatosa	48
Hydromeningitis	50
Ulcera corneae	51
Malacia und Gangraena corn.	53
Obscuraciones corn.	54
Perforatio corn.	61
Keratocele	62
Synechia anterior	63

pag.

Prolapsus Iridis 64

Pseudocornea 65

Laesiones corn. 68

Keratoconus 71

Hydrophthalmus ant. 73

Hypopyon 73

Haemorrhagia interna 75

Cysticercus cellulosae 75

IV. Die Lederhaut 76-79

Scleritis 76

Sclerectasia 77

Laesiones sclerae 78

V. Die Regenbogenhaut 79-95

Iritis 79

Korectopie und Polykorie 86

Irideremie 87

Iridodonesis 88

Hippus 89

Myosis 89

Mydriasis 90

Synicesis 92

Synechia posterior 93

Coloboma Iridis 94

Laesiones Iridis 94

VI. Das Linsensystem 95-109

Laesiones systematis lentis 95

Dislocatio lentis spontanea 96

Phakitis und Periphakitis 97

Cataracta 98

— capsularis 98

— lenticularis 100

— capsulo-lenticularis 103

— congenita 103

XII

	pag.
Cataracta secundaria	104
— spuria	104
VII. Der Glaskörper	110—112
Hyalitis	110
Hydrops corp. vitr.	110
Synchysis	110
Opacitäten	111
VIII. Die Netzhaut	112—127
Retinitis	112
Fungus medullaris retinae	114
Hyperästhesia retinae	115
Hemiopia ex. hyperästhesia ret.	119
Nyctalopia	120
Anästhesia retinae (Amaurosis)	120
Hemeralopia	126
Obliteratio art. centr. retin. part.	126
IX. Die Augennerven	127—138
Hyperästhesie und Anästhesie des N. opt.	127
Acinesen der motorischen Nerven	129—132
Acinesis n. oculomot. part.	129
— — — total	130
— n. trochl.	130
— n. abducent.	130
— ram. ophthalm. n. fac.	131
Mydriasis paralytica	131
Accommodationsparese	131
Hypercinesen der motorischen Nerven	132—134
Nictitatio	132
Blepharospasmus	133
Lagophthalmus spasticus	133
Nystagmus	133
Strabismus spasticus	134
Hippus, Myosis, Mydriasis etc.	134

	pag.
Anästhesieen der sensitiven Nerven	135
Anästh. ciliar. imperf.	135
— ram. ophth. n. trig. perf.	136
Hyperästhesieen der sensitiven Nerven	137—138
Hyperästh. ciliar. photophobica	137
— — dolorosa	138
— supraorbitalis dolorosa	138
— lacrym. dolorosa	138
X. Die Aderhaut	139—149
Congestion	139
Choroiditis	140
Apoplexia choroideae	145
Hydrops chor.	146
Laesiones chor.	148
Albinismus, Coloboma etc.	148
XI. Der Strahlenkörper	149—150
Kyklitis	149
Staphyloma corp. cil.	150
XII. Die Augenmuskeln	150—154
Ophthalmomyitis	150
Cystenbildung	150
Strabismus	151
XIII. Die Thränenorgane	154—160
Dacryadenitis	154
Dacryops	155
Hydatis gland. lacrym.	155
Dacryocystitis	156
Fistula sacc. lacrym.	157
Atonia und Atresia punct. und canal. lacr.	158
Polyp. duct. lacr.	159
Encanthis	160
XIV. Der Augapfel	160—168
Anophthalmus	160

	pag.
Monophthalmus	161
Mikrophthalmus	161
Megalophthalmus	161
Myopia	161
Presbyopia	163
Diplopia	163
Hydrophthalmus bulbi	165
Cancer bulbi	165
Laesiones bulbi	166
Panophthalmitis	167
Atrophia bulbi	167

Operationslehre.

Physicalischer Theil	169
Die Loupe	169
Das Purkinje-Sanson'sche Experiment	170
Entoptik	175
Die Brillen	178
Das Optometer	181
Der Augenspiegel	182
Die Augenprismen	185
Die myotische Brille	187
Chirurgischer Theil	188
Ablepharon	189
Coloboma palp.	190
Ankyloblepharon	190
Phimosis palp.	190
Symblepharon	191
Lagophthalmus organicus	192
Blepharoptosis mechanica	193
Epicanthus	193

	pag.
Entropium	193
Ectropium	195
Trichiasis, Distichiasis	198
Chalazion	199
Milium	199
Laesiones palp.	199
Warzen, Krebs, Teleangiectasieen etc.	200
Pterygium	201
Punctio corneae	201
Pseudocornea	202
Scarrificatio	203
Cataracta	204
Koremorphosis	225
Strabismus	229
Morbi org. lacrym.	233
Fistula sacci lacrym.	234
Exstirpatio bulbi	236
Prothesis ocularis	236

Augenheilmittel 240

Glossarium und Register 255

Erklärung der Tafeln 270



108	Antropomorphie
109	Antropomorphie
110	Antropomorphie
111	Antropomorphie
112	Antropomorphie
113	Antropomorphie
114	Antropomorphie
115	Antropomorphie
116	Antropomorphie
117	Antropomorphie
118	Antropomorphie
119	Antropomorphie
120	Antropomorphie
121	Antropomorphie
122	Antropomorphie
123	Antropomorphie
124	Antropomorphie
125	Antropomorphie
126	Antropomorphie
127	Antropomorphie
128	Antropomorphie
129	Antropomorphie
130	Antropomorphie
131	Antropomorphie
132	Antropomorphie
133	Antropomorphie
134	Antropomorphie
135	Antropomorphie
136	Antropomorphie
137	Antropomorphie
138	Antropomorphie
139	Antropomorphie
140	Antropomorphie
141	Antropomorphie
142	Antropomorphie
143	Antropomorphie
144	Antropomorphie
145	Antropomorphie
146	Antropomorphie
147	Antropomorphie
148	Antropomorphie
149	Antropomorphie
150	Antropomorphie

151	Angewandte Mittel
152	Glossarium und Register
153	Erläuterung der Tafeln

Die augenärztliche Thätigkeit beginnt mit einem ihrer schwierigsten Theile, der Untersuchung.

Obwohl die Neueren Recht haben, Augenkrankheiten mehr als Lokalleiden gelten zu lassen, wie dies früher zu geschehen pflegte, so ist es doch erforderlich, stets auch den Gesamtzustand des Organismus und alle auf wichtige Anomalien bezügliche Antecedentien bis zur möglichen Klarheit zu erforschen. Wie überhaupt so würde es besonders in Hinsicht hierauf tadelnswerth genannt werden müssen, ausschliesslich Augenarzt sein zu wollen.

Wer heilen will, muss mit der Heilwissenschaft vollständig vertraut sein, wenigstens die Resultate der Hülfswissenschaften, Chemie, Physik etc., genau kennen, scharfen Beobachtungsgeist, Unbefangenheit des Urtheils, Geistesgegenwart, Entschlossenheit zum Handeln besitzen und ausserdem diejenigen körperlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, welche unumgängliche Erfordernisse sind, um jeder Art operativer Aufgaben gewachsen zu sein.

Der Augenarzt bedarf ausser allen diesem zweier guten und geübten Augen, um sowohl auf den ersten Blick alles Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu können, als auch um bei den Detailerforschungen nicht zu irren.

Das Examen kranker Augen beschäftigt sich zunächst mit den objectiven Merkmalen an denselben, zuerst aus einiger Entfernung, dann in unmittelbarer Nähe und mit Benutzung der diagnostischen Hilfsmittel, der Loupe, des Tages und Kerzenlichtes, der Verdunkelung, der Eröffnung der Lider mittelst der Finger oder entsprechender Instrumente und der Pupille mittelst mydriatischer Mittel, am Besten einer Atropine-solution, endlich der Apparate, um den Zustand der inneren Augenorgane festzustellen, d. h. der verschiedenen Brillengläser, der Prismen, der Platten zur entoptischen Untersuchung, eines Augenspiegels, bis jetzt am Besten des Zehender'schen, etc. Ist nur ein Auge erkrankt, so wird dieses zuerst untersucht und soweit es statthaft ist mit dem Zustande des gesunden in Vergleich gebracht.

Im Allgemeinen befolge man bei der Detailuntersuchung eine gewisse Ordnung und beginne mit der Haltung des Kopfes, der Beschaffenheit des Blickes, dann der natürlichen Schutzorgane des Auges, a) der Brauen hinsichtlich der Zahl, der Ausdehnung, des Brauengrundes, etwaiger Narben, b) der Lider, besonders hinsichtlich der Lidränder und der Wimpern, c) der Orbita und erst dann des Bulbus.

Zur Untersuchung der Bindehäute ist erforderlich, die Lider abzuführen, besser sie umzustülpen, was beim untern Lide einfach ist, beim obern dadurch erleichtert wird, dass man an den Wimpern oder bei deren Mangel am Rande das Lid fasst, es anzieht und nun mittelst eines angemessenen Druckes mit dem Finger oder einer Sonde die Umstülpung bewerkstelligt. Kleine und ungeberdige Kinder werden am Besten von einer vor dem Arzte sitzenden Person so auf den Schooss des Arztes niedergesenkt, dass der Kopf zwischen den Knien des Arztes fixirt werden kann, worauf die Eröffnung und Umstülpung der Lider wenig Schwierigkeiten macht. Ausser Alienationen der Bindehaut werden Sekrete, fremde Körper, Thränenpunkte und Thränenkarunkel auf diese Weise zur Anschauung gebracht. Um die ectropionirten Lider zu ätzen, dränge man sie über dem Bulbus zusammen.

Der Bulbus muss im Allgemeinen und hinsichtlich der einzelnen Theile untersucht werden. Ausser der Form, Grösse, Richtung, Beweglichkeit kommt es besonders auf den Resistenzgrad an, der durch Fingerdruck zu prüfen ist und wofür man in zweifelhaften Fällen das Tastgefühl an gesunden Augen zu üben hat.

Die Hornhaut ist en profil und en face zu betrachten, um deren Durchsichtigkeit, Krümmungsoberfläche, Glanz, Gleichmässigkeit im Centrum und in der Peripherie zu bestimmen. Lichtreflex und Loupenbetrachtung gibt über kleine und doch oft sehr nachtheilige Unebenheiten, Facetten, Geschwürchen etc. in der Oberfläche Aufschluss. Irrthümern vorzubeugen, ist es absolut erforderlich, überhaupt jedes zweite Licht zu beseitigen und stets nur in einfenstrigen Zimmern Augenuntersuchungen und -operationen vorzunehmen. Ist Lichtscheu sehr hinderlich, so wird die Untersuchung bisweilen dadurch erleichtert, dass man sich und dem Patienten ein Tuch überhängt, um in beschattetem Raume in das kranke Auge zu blicken. Auch wird gerathen, Augen mit grossem Lichtreiz im Schlaf des Patienten leise zu öffnen. Jedenfalls sei man bedacht, mit schnellem Blick jede Anomalie wahrzunehmen.

Von der Sclerotica gilt dasselbe; besonders ist der Scleralfalz auf Missfarbigkeit, der übrige Theil auf Injection, Substanzalienation, Ectasie u. dgl. zu untersuchen, was hinsichtlich des hinteren Hemiglobes oft nur durch Induction oder durch Ophthalmoscopie möglich ist.

Der Raum zwischen Hornhaut und Iris kann erweitert, verengert oder gänzlich geschwunden sein, ebenso kann er fremde Körper, Eiter, Blut, entmischtes Kammerwasser u. dgl. enthalten.

Die Iris kann entfärbt sein, eingezogen oder vorgetrieben, in ihrer Structur verändert, nach Hinten oder Vorn ganz oder theilweise verwachsen, mit Flecken und Eiterheerden durchsetzt, die Bewegung kann zu stark, zu schwach, verändert oder aufgehoben sein u. s. w.

Um den Beweglichkeitsgrad zu constatiren, wird die Lichtprobe gemacht nach zeitweiser Verdunkelung. Auch kann man durch gelinde Reibung und Reizung des Bulbus durch das Oberlid Contraction der Iris bewirken.

Die Pupille wird mit der Iris gemeinschaftlich und für sich untersucht. Hauptsache ist, dass sie frei sei, um dem Lichte ungehinderten Zutritt zu den Augenmedien und den lichtpercipirenden Organen zu gestatten. Sie kann zu weit, starr, zu eng oder gänzlich aufgehoben sein, letzteres meist in Folge von Einlagerungen. Oft ist sie verzogen, seitlich gelagert, mehrfach vorhanden etc. — Die normale Purpurschwärze fehlt oft, weil die tief hinter ihr gelegenen Theile krank sind.

Zur genauen Untersuchung des Linsensystems bedarf es ausser der directen Betrachtung diagnostischer Experimente, die ihres Orts besprochen werden.

Dasselbe gilt von Corp. vitr., Retina, Choroidea, Nerv. optic. etc.

Nach Aufsuchung der objectiven Lokalalienationen ermittle man die des Gesamtorganismus und gehe erst dann zum Examen der subj. Symptome über, die hinsichtlich des Grades der Sehkraft und der Gefährdung innerer Organe entscheidende Wichtigkeit haben. Chronischer Entzündungszustand z. B. der Chor. ist ohne Beachtung der subj. Symptome häufig nicht zu erkennen. Die Sehkraft scheint bisweilen gänzlich aufgehoben, während sie nur in hohem Grade verringert ist, was durch Versuche mit grellem Licht in beschattetem Raume festzustellen ist. Doch bleibe man bedacht, subj. Lichterscheinungen nicht mit Lichtempfindungsvermögen zu verwechseln, wozu Irrthum des Kranken Anlass geben kann. Ebenso beachte man Funken-, Nebel-, Mücken-, Einfach-, Doppelt-, und Halbsehen, die Fähigkeit der Farbenunterscheidung, die Grenze der Sehkraft in der Nähe und auf Abstand, das Vermögen, für längere oder kürzere Dauer scharf zu sehen, die Haltung des Kopfes und der Augen beim Sehen und ob im hellen oder im gemässigten Lichte, ob durch feinperforirte Platten besser und dauerhafter gesehen wird und welche entoptische Erscheinungen der Patient dabei wahrzunehmen angibt. Den Grad der Schärfe stellt man durch Benutzung

der Jäger'schen Tafeln in verschiedenen Abständen fest, (dieselben enthalten Druckschriften von der verschiedensten Grösse) ausserdem durch experimentelle Vorrichtungen verschiedener Art, deren später Erwähnung sein wird.

Erst zum Schluss wird alles anamnestisch Wichtige ermittelt, die Genese des gegenwärtigen Zustandes, Krankheitsanlage, Gewohnheiten und Beschäftigung des Patienten, vorhergegangene Behandlung u. dgl. In einigen Fällen lässt sich der stat. praesens nur aus der Anamnese mit voller Sicherheit diagnosticiren.

In therapeutischer Hinsicht beginne man im Allgemeinen vorsichtig mit den schwächeren Mitteln und verzichte auf Wiederholung einer schon einmal erfolglosen Behandlungsart, insofern es nicht unzweifelhaft ist, dass sie vordem unzweckmässig oder unzeitig in Anwendung gezogen wurde. Jedenfalls sei man sich über die Diagnose durchaus klar, ehe man zu energischen Mitteln greift, und untersuche lieber wiederholt, um nicht übereilt Unzuverlässiges anzuordnen.

I.

Die Lider.

Ablepharon (v. Ammon).

Mangel des Lides, uni — oder bilateral, angeboren oder erworben.

a. Abl. congenitum. — Die Lider sind in der 10—12 Woche des Foetallebens zuerst bemerklich, (*Blandin, Meckel*) vereinigen sich zuerst an den Rändern und lösen sich wieder vor der Geburt. Hemmungsbildungen sind selten, besonders ohne andere ähnliche Defecte; sie kommen aber vor (*Vicq-d'Azyr, Morgagni, Sprengel, Carron*).

b. Abl. acquisitum ist eine häufige Erscheinung nach Verletzungen. Schusswunde¹⁾, Biss eines Hundes (*Desmarres*). Verbrennung, Lupus u. s. f.

Cur: Plastische Operationen müssen bald vorgenommen werden, um das Auge zu retten.

Coloboma palpebr.

Spaltung des Lides, uni — oder bilateral, angeboren oder erworben, ähnlich dem Labium leporinum.

a. Col. congenitum. — Nicht so selten, als *Ablepharon*, aber beobachtet (v. Ammon, Seiler), partiell, wo dann der Bulbus noch bedeckt werden kann, oder total, so dass die Entstellung bedeutend ist und operirt werden muss.

b. Col. acquisitum, sehr häufig, besonders nach Hieb- wunden²⁾, heilt nach sofortiger Naht p. prim. intentionem meist sehr günstig, vernachlässigt kann es sich compliciren mit *Symblepharon, Ptosis, En* — und *Ectropium*. Wird die Operation versäumt oder missglückt sie, so kommt das Auge in Gefahr.

Cur: operativ. Bleibt nach einer Verletzung eine schwieligte Spalte eines Thränenröhrchens (*J. A. Schmidt*), so werden die Thränen nur unvollkommen aufgesogen. Dieser Zustand widersteht in der Regel, aber ohne Nachtheil den Operationsversuchen, da das andere Thränenröhrchen allein die frühere Function beider übernimmt.

¹⁾ v. Ammon. Krankheiten des menschl. Auges. II. Bd. Taf. VI. Fig. 17.

²⁾ v. Ammon l. c. Taf. I. 4. II. 1—4.

Ankyloblepharon,

Verwachsung der freien Lidränder mit einander, partiell oder total, angeboren oder erworben.

a. Ank. congenitum. Sehr selten, mit gleichzeitigem Defect des Bulbus (*Botin*), durch eine Pseudomembran bewirkt (*Wenzel*), partiell und total (*Schæn, Kaltschmidt, Rognetta*) durch Bindehautfalten geschlossen der Art, dass eine Oeffnung zum Abfluss der Thränen bleibt (*Rognetta*). *Andreæ* u. A. behaupten, völlige Verschliessung komme nie vor. Partielle Complication mit *Symblepharon* fehlt fast nie. Es kommt auch bei Hausthieren vor (*Leblanc*).

b. Ank. acquisitum ist ziemlich häufig, besonders partiell, doch meist ohne Adhaesion des Lides mit dem Bulbus. Wunden durch Explosionen, ätzende Substanzen, Lidverschwärung mit anhaltendem Lidkrampf¹⁾, Operationen an den Lidrändern und Aehnliches können dieses *Ank.* herbeiführen. Die Verwachsung ist selten eine unmittelbare, die Knorpel sind nie mit einander verwachsen gefunden. Meist ist ligamentöse oder pseudomembranöse Zwischensubstanz nachweisbar, oft ist nur die äussere Haut (bei *Excoriation* und Krampf) sehr dünn verwachsen.

Cur: nur operativ.

Phimosis palpebrarum (v. Ammon).

Zu enge Lidspalte, wie solche bei *Ankyloblepharon* und *Atrophia bulbi* vorkommt, selten angeboren, noch seltner erblich (*Desmarres*). Temporär bei fetten Kindern mit *Ophthalmia neonatorum*. Wird das Sehen beeinträchtigt oder drohen *Strabismus*, *Amblyopie* u. d., so muss auf operativem Wege Hülfe geschafft werden.

Symblepharon,

Verwachsung des Lides mit dem Bulbus, total und partiell, angeboren und erworben.

a. Symb. congenitum, äusserst selten, nur bei Atrophie des Bulbus beobachtet.

b. Symb. acquisitum²⁾ ist häufiger, sowohl partiell als total. Letzteres, auch *Symb. posterius* genannt, beruht gewöhnlich nicht auf Verwachsung der Bindehaut, sondern auf Atrophie und Defect derselben, so, dass die Bindehaut vom Ciliarrande direct auf den Bulbus übergeht. Das Partielle hat viele Zwischenstufen und ist nicht selten mit *Ankyloblepharon* complicirt. Bei der einfachsten Form ist nur ein Pseudoligament zwischen Lid und Bulbus vorhanden, häufiger aber sind mehre vorhanden, oft viele so feste und kurze, dass die Beweglichkeit des Bulbus beeinträchtigt ist. Dies ist besonders

¹⁾ v. Ammon. Taf. VI. Fig. 14, Ank. med., indem beiderseits keine Verwachsung stattfindet.

²⁾ v. Ammon l. c. Tab. VI. Fig. 1—13 verschiedene Formen und Grade.

der Fall, wenn die Cornea an der Verwachsung participirt. Ich operirte ein solches wiederholt, die Verwachsung kehrte stets zurück. Ich verlor den Kranken, dem ich eine künstliche Pupillenbildung vorschlagen wollte, da das andere Auge atrophisch war, nachher aus den Augen. Die fibröse oder pseudomembranöse Zwischensubstanz erstreckt sich sehr oft bis in die Uebergangsfalte, so dass sie mit Sonden nicht umgangen werden kann. Das *Symb.* kann Veranlassung zum *Strabismus* geben. Als aetiologische Momente kommen Wunden mit Substanzverlust, *Caries*, üble Eiterungen, langwierige Verschwärungen, besonders aber Explosionen und Aetzwunden am Häufigsten vor.

Cur: nur operativ.

Lagophthalmos,

Hasenaugen, d. h. ein solches Auge, an dem ein Lid oder beide Lider zu kurz sind, um sich beim Versuche des Schliessens zu berühren. Das Auge bleibt also mehr oder weniger unbedeckt und ist verderblichen Entzündungen ausgesetzt. Ueber angeborenes wirkliches Hasenaugen gibt es wenig zuverlässige Nachrichten. Das erworbene kommt häufig vor nach *Gangræna*, *Anthrax*, Verletzung und Narbencontraction¹⁾, langwieriger Entzündung und Eiterung der Lider, *Periorbitis*, *Caries* u. s. f. und muss als *Lag. organicus* unterschieden werden von *Lag. paralyticus*, mit welchem Namen man die aus Lähmung des *N. facialis* entstandene Unfähigkeit, die Lider zu schliessen, bezeichnet. Ist das untere Lid gelähmt und gesenkt, so gewinnt oft das obere Kraft, durch tiefere Senkung das untere noch zu erreichen.

Lag. spasticus, durch Krampf des *M. levator palp. sup.* hervorgebracht, ist noch nicht zur Evidenz erwiesen. (Uebrigens s. Nervenkrankheiten.)

Lag. organicus complicirt sich leicht mit *Ectropium*.

Cur: operativ, da erschlaffende und ausdehnende äussere Mittel nie mit Erfolg angewendet worden sind.

Blepharoptosis s. Lapsus palp. sup.

Herabhängen des oberen Lides über den ganzen Bulbus oder einen Theil desselben. Das Aufheben des Lides mit den Fingern ist möglich, dem Willen des Patienten ist es unmöglich.

a. Bleph. organica. Durch gänzlich oder theilweises Fehlen des *M. levat. palp. sup.* (*Caffe*), durch Zellgewebsschwund im höheren Alter oder nach Krankheiten (*Oedema chronicum*, *Blepharitis phlegmonosa*, *erysipelatos*, *Ophthalmia granulosa*, *Tylosis*, *Ecchymosis* und *Abscessus palp.* —) und dann oft mit Lähmung complicirt. Ebenso können *Hypertrophie*

¹⁾ v. Ammon. l. c. Taf. V. Fig. 12—14, nach einem Hufschlage.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon*.)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingen (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres.*) — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards.*)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres.*) — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards.*)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*).

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* geſellen ſich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beſchreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im erſten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweiſe, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt dieſe Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muſs die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatiſche Waſchungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorſichtig nach Bedarf auf das Lid gepinſelt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie iſt Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille iſt dilatirt, weil auch die motoriſchen Ciliarzweige gelähmt ſind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den ſtärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* feſtgeſtellt. Die Sehkraft iſt ſchwächer, beſonders für nahe Objecte wegen beſchränkter Coaptation. Contractur der antagoniſtiſchen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieſes Zuſtandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zuſtand, wo ſich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugeſellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel ſich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber ſelten vor. Der angeborene iſt oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muſs aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlaſſung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und beſteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemiſch. (*Edwards*).

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* geſellen ſich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beſchreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im erſten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweiſe, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt dieſe Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muſs die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatiſche Waſchungen (Rcp. 1) adstringirende Bähungen (Rcp. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorſichtig nach Bedarf auf das Lid gepinſelt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rcp. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie iſt Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille iſt dilatirt, weil auch die motoriſchen Ciliarzweige gelähmt ſind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den ſtärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* feſtgeſtellt. Die Sehkraft iſt ſchwächer, beſonders für nahe Objecte wegen beſchränkter Coaptation. Contractur der antagoniſtiſchen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieſes Zuſtandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zuſtand, wo ſich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugeſellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel ſich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber ſelten vor. Der angeborene iſt oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muſs aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlaſſung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und beſteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemiſch. (*Edwards*).

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* geſellen ſich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beſchreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im erſten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweiſe, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt dieſe Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muſs die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatiſche Waſchungen (Rcp. 1) adstringirende Bähungen (Rcp. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorſichtig nach Bedarf auf das Lid gepinſelt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rcp. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie iſt Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille iſt dilatirt, weil auch die motoriſchen Ciliarzweige gelähmt ſind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den ſtärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* feſtgeſtellt. Die Sehkraft iſt ſchwächer, beſonders für nahe Objecte wegen beſchränkter Coaptation. Contractur der antagoniſtiſchen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieſes Zuſtandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zuſtand, wo ſich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugeſellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel ſich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber ſelten vor. Der angeborene iſt oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muſs aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlaſſung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und beſteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemiſch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. Entropium congenitum, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b. Entropium acquisitum hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* geſellen ſich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. *Ammon* beſchreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im erſten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweiſe, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt dieſe Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muſs die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatiſche Waſchungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorſichtig nach Bedarf auf das Lid gepinſelt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie iſt Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille iſt dilatirt, weil auch die motoriſchen Ciliarzweige gelähmt ſind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den ſtärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* feſtgeſtellt. Die Sehkraft iſt ſchwächer, beſonders für nahe Objecte wegen beſchränkter Coaptation. Contractur der antagoniſtiſchen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieſes Zuſtandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zuſtand, wo ſich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugeſellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. *Ammon.*)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel ſich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber ſelten vor. Der angeborene iſt oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. *Ammon*), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muſs aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlaſſung waren. (*Desmarres.*) — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und beſteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemiſch. (*Edwards.*)

¹⁾ v. *Ammon*. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. Inversio palpebrarum.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rcp. 1) adstringirende Bähungen (Rcp. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rcp. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres.*) — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards.*)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* geſellen ſich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beſchreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im erſten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweiſe, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt dieſe Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muſs die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatiſche Waſchungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorſichtig nach Bedarf auf das Lid gepinſelt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie iſt Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille iſt dilatirt, weil auch die motoriſchen Ciliarzweige gelähmt ſind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den ſtärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* feſtgeſtellt. Die Sehkraft iſt ſchwächer, beſonders für nahe Objecte wegen beſchränkter Coaptation. Contractur der antagoniſtiſchen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieſes Zuſtandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zuſtand, wo ſich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugeſellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel ſich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber ſelten vor. Der angeborene iſt oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muſs aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlaſſung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und beſteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemiſch. (*Edwards*).

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. Inversio palpebrarum.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. Entropium congenitum, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare **Entr. congen.** verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b Entropium acquisitum hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des **Ectropiums**) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (**Entr. senile**), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (**Rosas.**) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum **Entropium** gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, **Tylosis**, **Chalazion** und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst **Ankyloblepharon** mit Verkrümmung des Knorpels und dann **Entropium**.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rcp. 1) adstringirende Bähungen (Rcp. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rcp. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chatazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon*.)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*.) — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon.*)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*).

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiſis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon*.)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon*.)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei


3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.


¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

hier. 270 $\frac{1}{2}$. Schauenburg



Schematischer Horizontaldurchschnitt des rechten Auges.



OPHTHALMIATRIK.

NACH DEN NEUESTEN FORSCHUNGEN

FÜR

DAS STUDIUM UND DIE PRAXIS


BEARBEITET

VON

Dr. C. H. Schauenburg,

Docenten an der Universität in Bonn.

Mit Holzschnitten und vier lithographirten Tafeln.




LAHR,

VERLAG VON J. H. GEIGER (M. SCHAUENBURG).

1856.

Druck von **J. H. Geiger** in Lahr.



LAHR

1858

IV
Sr. MAGNIFICENZ

DEM ZEITIGEN

RECTOR DER UNIVERSITÄT

ZU

BONN,

Herrn Geheimen Medicinalrath Dr. Antzer,

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER CHIRURGIE,

DIRECTOR DER CHIRURGISCHEN UND AUGENÄRZTLICHEN

KLINIK,

DIRECTOR DER DELEGIRTEN

EXAMINATIONS-COMMISSION FÜR ÄRZTE,

RITTER etc. etc.

*Wenn es möglich ist, durch Zurückgabe eines kleinen
Theiles dessen, was uns aus reicher Fülle mit freigebiger
Hand gespendet worden ist, Dank zu beweisen, so wünsche*

IV

ich, dass mir dies gelingen möge, indem ich Ihnen, hochverehrter Lehrer und Gönner, dieses Buch widme.

Das treue Wohlwollen, welches Sie mir seit dem Jahre 1840, wo ich zuerst Ihr Zuhörer war, erwiesen haben, Ihr förderlicher Rath in meinen Bestrebungen, Ihre thätige Beihülfe in meinen Arbeiten erfüllen mich mit aufrichtiger und unwandelbarer Ergebenheit; aber das Bewusstsein, als Ihr Schüler und demnächst als Ihr klinischer Assistent von Ihrem gelehrten Wissen, von Ihrer sichern practischen Thätigkeit und von Ihrem unermüdlichen Lehreifer so grossen Gewinn gezogen zu haben, als mein Vermögen gestattete, macht es mir zu einer erhebenden Pflicht, auch offen dem Danke Worte zu geben, den Ihnen mit mir Unzählige in ähnlich hohem Grade schuldig sind.

Darf ich noch einen Wunsch hinzufügen, so ist es der, dass Ihnen noch viele Jahre gegönnt sein möchten, rüstig zu wirken und fröhlichen Gemüthes auf eine lange und gesegnete Laufbahn zurückzublicken.

SCHAUENBURG.

Vorwort.

Die Aufgabe, welche ich mir bei der Abfassung dieser Ophthalmiatrik stellte war eine zwiefache. Ich wollte das gesammte Material sowohl vom naturwissenschaftlichen als vom empirischen Standpunkte aus prüfen und sichten und die Ausbeute meiner Arbeit in möglichster Kürze und Uebersichtlichkeit derart darstellen, dass der beschäftigte wie der studirende Arzt dem Buche die Bezeichnung wissenschaftlicher Strenge und praktischer Brauchbarkeit nicht versagen könnten.

Die an sich grossen Schwierigkeiten, welche ich bei der Lösung dieser Doppelaufgabe zu überwinden hatte, waren durch die ungewöhnlichen

VI

Fortschritte, deren sich die ophthalmische Physiologie und Diagnostik in ihrer letzten Periode rühmen dürfen, noch sehr gesteigert. Während die pathologische Anatomie nur eine langsame und stetige Förderung unserer Erkenntniss gestattet, ist die Optik, indem sie der Forschung neue Gesichtspunkte anwies, Anlass geworden, dass die Gesamtlehre in kurzer Zeit überraschend bereichert wurde und dass die Capitel von den inneren Augenkrankheiten eine andere Gestalt annehmen mussten. Von einem grossen Theile der überkommenen Lehrsätze ist Abstand zu nehmen und manches Neue muss substituirt werden, dem es, den Dogmenfreunden gegenüber, schwer halten wird, das ihm zuständige Bürgerrecht zu verschaffen. Letzterer Umstand ist indess keineswegs in dem Grade zu beklagen, wie vielfältig geschieht, da er wesentlich dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit gespannt zu erhalten und Irrgängen vorzubeugen. Je mannichfaltiger z. B. die Ergebnisse der ophthalmoskopischen Untersuchungsmethode ausfallen, um so nothwendiger wird es, durch vorsichtige Wiederholung der Experimente, durch weitere Beobachtung des Krankheitsverlaufes und

-ausgangs im einzelnen Falle, durch statistische Uebersichten und durch möglichst zahlreiche Sectionsbefunde den wahren Werth derselben festzustellen.

An den einschlagenden Arbeiten habe ich nach Kräften theilgenommen und ich gestehe offen, dass die reine Freude an diesen Arbeiten mich schadlos gehalten hat für viele Unbilden, die mir um sie zufielen.

Hinsichtlich der Methode der Bearbeitung des ophthalmiatischen Materials verweise ich auf das Buch selbst und erwarte den Erfolg, den es bei dem ärztlichen Publikum finden wird. Nur in Bezug auf die Systematisirung bemerke ich, dass ich gern auf ein künstliches System, von denen stets eines das andere stürzt, Verzicht geleistet habe und der anatomischen Topographie ihrer bekannten und bedeutenden Vorzüge halber bis zum Schluss treu geblieben bin. Die Krankheitsnamen, unter denen das Einzelne zum Vortrag gebracht wird, bezeichnen desshalb bald recente anomale Processe, bald Resultate solcher.

Die hauptsächlich zu diagnostischen Zwecken nothwendigen physicalischen, ebenso die chirurgi-

VIII

schen Operationen habe ich getrennt abgehandelt und im Texte auf sie verwiesen, für die Augeneilmittel habe ich mir einen besonderen Anhang erlaubt und ein Glossarium mit dem alphabetischen Register vereinigt, um der obsoleten Terminologie schon beim ersten Nachschlagen ihren Platz in der Geschichte anzuweisen.

Das Buch erscheint später, als meine ursprüngliche Absicht war, zum Theil wegen einer Reihe wichtiger Vorarbeiten, bei denen ich mich der Theilnahme des Herrn Professor Donders in Utrecht erfreute.

Einen besonderen Dank aber fühle ich mich schliesslich noch gedrungen dem Herrn Geheimrath Professor Wutzer in Bonn auszusprechen, der mich, seit ich als erster Assistenzarzt in der Bonner Universitätsklinik eintrat, mit der ihm eigenthümlichen Liberalität jederzeit bei meinen Arbeiten unterstützt hat.

Godesberg, im Sommer 1855.

Schauenburg.

Inhaltsverzeichniss.

	pag.
Einleitung	1—5
I. Die Lider	5—20
Ablepharon	5
Coloboma palpebr.	5
Ankyloblepharon	6
Phimosis palpebr.	6
Symblepharon	6
Lagophthalmos	7
Blepharoptosis	7
Epicanthus	8
Entropium	9
Ectropium	10
Trichiasis, Distichiasis	11
Madarosis	12
Phthiriasis	12
Hordeolum	12
Chalazion	13
Milium	14
Laesiones palpebr., Corpora aliena	14
Blepharitis phlegmonosa	14
— erysipelatos	15

	pag.
Blepharadenitis ciliaris	16
— Meybomiana	18
Crusta lactea palpebr.	19
Furunculus, Carbunculus simplex und contagiosus	19
Warzen, Krebs, Muttermäler etc.	20
II. Die Bindehäute	20—44
Conjunctivitis simplex	20
— exanthematica	21
— catarrhalis	22
— trachomatosa	23
— lymphatica	27
— blennorrhoeica	29
— A. Ophthalmia neonatorum	30
— B. — gonorrhoeica	32
— C. — aegyptiaca	33
— membranacea, — Diphtheritis	35
Chemosis	39
Xerosis conjunctivae	40
Pterygium	40
Pinguecula	42
Laesiones conjunctivae	42
Haemorrhagia conj.	43
Neoplasmata conj.	43
III. Hornhaut und Kammersystem	45—76
Keratitis pustulosa	45
— pannosa	46
— parenchymatosa	48
Hydromeningitis	50
Ulcera corneae	51
Malacia und Gangraena corn.	53
Obscuraciones corn.	54
Perforatio corn.	61
Keratocele	62
Synechia anterior	63

	pag.
Prolapsus Iridis	64
Pseudocornea	65
Laesiones corn.	68
Keratoconus	71
Hydrophthalmus ant.	73
Hypopyon	73
Haemorrhagia interna	75
Cysticercus cellulosae	75
IV. Die Lederhaut	76 -79
Scleritis	76
Sclerectasia	77
Laesiones sclerae	78
V. Die Regenbogenhaut	79—95
Iritis	79
Korectopie und Polykorie	86
Irideremie	87
Iridodonesis	88
Hippus	89
Myosis	89
Mydriasis	90
Synicesis	92
Synechia posterior	93
Coloboma Iridis	94
Laesiones Iridis	94
VI. Das Linsensystem	95—109
Laesiones systematis lentis	95
Dislocatio lentis spontanea	96
Phakitis und Periphakitis	97
Cataracta	98
— capsularis	98
— lenticularis	100
— capsulo-lenticularis	103
— congenita	103

XII

	pag.
Cataracta secundaria	104
— spuria	104
VII. Der Glaskörper	110—112
Hyalitis	110
Hydrops corp. vitr.	110
Synchysis	110
Opacitäten	111
VIII. Die Netzhaut	112—127
Retinitis	112
Fungus medullaris retinae	114
Hyperästhesia retinae	115
Hemiopia ex. hyperästhesia ret.	119
Nyctalopia	120
Anästhesia retinae (Amaurosis)	120
Hemeralopia	126
Obliteratio art. centr. retin. part.	126
IX. Die Augennerven	127—138
Hyperästhesie und Anästhesie des N. opt.	127
Acinesen der motorischen Nerven	129—132
Acinesis n. oculomot. part.	129
— — — total	130
— n. trochl.	130
— n. abducent.	130
— ram. ophthalm. n. fac.	131
Mydriasis paralytica	131
Accommodationsparese	131
Hypercinesen der motorischen Nerven	132—134
Nictitatio	132
Blepharospasmus	133
Lagophthalmus spasticus	133
Nystagmus	133
Strabismus spasticus	134
Hippus, Myosis, Mydriasis etc.	134

	pag.
Anästhesieen der sensitiven Nerven	135
Anästh. ciliar. imperf.	135
— ram. ophth. n. trig. perf.	136
Hyperästhesieen der sensitiven Nerven	137—138
Hyperästh. ciliar. photophobica	137
— — dolorosa	138
— supraorbitalis dolorosa	138
— lacrym. dolorosa	138
X. Die Aderhaut	139—149
Congestion	139
Choroiditis	140
Apoplexia choroideae	145
Hydrops chor.	146
Laesiones chor.	148
Albinismus, Coloboma etc.	148
XI. Der Strahlenkörper	149—150
Kyklitis	149
Staphyloma corp. cil.	150
XII. Die Augenmuskeln	150—154
Ophthalmomyitis	150
Cystenbildung	150
Strabismus	151
XIII. Die Thränenorgane	154—160
Dacryadenitis	154
Dacryops	155
Hydatis gland. lacrym.	155
Dacryocystitis	156
Fistula sacc. lacrym.	157
Atonia und Atresia punct. und canal. lacr.	158
Polyp. duct. lacr.	159
Encanthis	160
XIV. Der Augapfel	160—168
Anophthalmus	160

	pag.
Monophthalmus	161
Mikrophthalmus	161
Megalophthalmus	161
Myopia	161
Presbyopia	163
Diplopia	163
Hydrophthalmus bulbi	165
Cancer bulbi	165
Laesiones bulbi	166
Panophthalmitis	167
Atrophia bulbi	167

Operationslehre.

Physicalischer Theil	169
Die Loupe	169
Das Purkinje-Sanson'sche Experiment	170
Entoptik	175
Die Brillen	178
Das Optometer	181
Der Augenspiegel	182
Die Augenprismen	185
Die myotische Brille	187
Chirurgischer Theil	188
Ablepharon	189
Coloboma palp.	190
Ankyloblepharon	190
Phimosis palp.	190
Symblepharon	191
Lagophthalmus organicus	192
Blepharoptosis mechanica	193
Epicanthus	193

	pag.
Entropium	193
Ectropium	195
Trichiasis, Distichiasis	198
Chalazion	199
Milium	199
Laesiones palp.	199
Warzen, Krebs, Teleangiectasieen etc.	200
Pterygium	201
Punctio corneae	201
Pseudocornea	202
Scarrificatio	203
Cataracta	204
Koremorphosis	225
Strabismus	229
Morbi org. lacrym.	233
Fistula sacci lacrym.	234
Exstirpatio bulbi	236
Prothesis ocularis	236

Augenheilmittel	240
Glossarium und Register	255
Erklärung der Tafeln	270



108	Antropomorphie
109	Antropomorphie
110	Antropomorphie
111	Antropomorphie
112	Antropomorphie
113	Antropomorphie
114	Antropomorphie
115	Antropomorphie
116	Antropomorphie
117	Antropomorphie
118	Antropomorphie
119	Antropomorphie
120	Antropomorphie
121	Antropomorphie
122	Antropomorphie
123	Antropomorphie
124	Antropomorphie
125	Antropomorphie
126	Antropomorphie
127	Antropomorphie
128	Antropomorphie
129	Antropomorphie
130	Antropomorphie

131	Angewandte Ethnologie
132	Angewandte Ethnologie
133	Angewandte Ethnologie
134	Angewandte Ethnologie
135	Angewandte Ethnologie
136	Angewandte Ethnologie
137	Angewandte Ethnologie
138	Angewandte Ethnologie
139	Angewandte Ethnologie
140	Angewandte Ethnologie

Die augenärztliche Thätigkeit beginnt mit einem ihrer schwierigsten Theile, der Untersuchung.

Obwohl die Neueren Recht haben, Augenkrankheiten mehr als Lokalleiden gelten zu lassen, wie dies früher zu geschehen pflegte, so ist es doch erforderlich, stets auch den Gesamtzustand des Organismus und alle auf wichtige Anomalien bezügliche Antecedentien bis zur möglichen Klarheit zu erforschen. Wie überhaupt so würde es besonders in Hinsicht hierauf tadelnswerth genannt werden müssen, ausschliesslich Augenarzt sein zu wollen.

Wer heilen will, muss mit der Heilwissenschaft vollständig vertraut sein, wenigstens die Resultate der Hilfswissenschaften, Chemie, Physik etc., genau kennen, scharfen Beobachtungsgeist, Unbefangenheit des Urtheils, Geistesgegenwart, Entschlossenheit zum Handeln besitzen und ausserdem diejenigen körperlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, welche unumgängliche Erfordernisse sind, um jeder Art operativer Aufgaben gewachsen zu sein.

Der Augenarzt bedarf ausser allen diesem zweier guten und geübten Augen, um sowohl auf den ersten Blick alles Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu können, als auch um bei den Detailerforschungen nicht zu irren.

Das Examen kranker Augen beschäftigt sich zunächst mit den objectiven Merkmalen an denselben, zuerst aus einiger Entfernung, dann in unmittelbarer Nähe und mit Benutzung der diagnostischen Hilfsmittel, der Loupe, des Tages und Kerzenlichtes, der Verdunkelung, der Eröffnung der Lider mittelst der Finger oder entsprechender Instrumente und der Pupille mittelst mydriatischer Mittel, am Besten einer Atropine-solution, endlich der Apparate, um den Zustand der inneren Augenorgane festzustellen, d. h. der verschiedenen Brillengläser, der Prismen, der Platten zur entoptischen Untersuchung, eines Augenspiegels, bis jetzt am Besten des Zehender'schen, etc. Ist nur ein Auge erkrankt, so wird dieses zuerst untersucht und soweit es statthaft ist mit dem Zustande des gesunden in Vergleich gebracht.

Im Allgemeinen befolge man bei der Detailuntersuchung eine gewisse Ordnung und beginne mit der Haltung des Kopfes, der Beschaffenheit des Blickes, dann der natürlichen Schutzorgane des Auges, ^{a)} der Brauen hinsichtlich der Zahl, der Ausdehnung, des Brauengrundes, etwaiger Narben, ^{b)} der Lider, besonders hinsichtlich der Lidränder und der Wimpern, ^{c)} der Orbita und erst dann des Bulbus.

Zur Untersuchung der Bindehäute ist erforderlich, die Lider abzuziehen, besser sie umzustülpen, was beim untern Lide einfach ist, beim obern dadurch erleichtert wird, dass man an den Wimpern oder bei deren Mangel am Rande das Lid fasst, es anzieht und nun mittelst eines angemessenen Druckes mit dem Finger oder einer Sonde die Umstülpung bewerkstelligt. Kleine und ungeberdige Kinder werden am Besten von einer vor dem Arzte sitzenden Person so auf den Schooss des Arztes niedergesenkt, dass der Kopf zwischen den Knien des Arztes fixirt werden kann, worauf die Eröffnung und Umstülpung der Lider wenig Schwierigkeiten macht. Ausser Alienationen der Bindehaut werden Sekrete, fremde Körper, Thränenpunkte und Thränenearunkel auf diese Weise zur Anschauung gebracht. Um die ectropionirten Lider zu ätzen, dränge man sie über dem Bulbus zusammen.

Der Bulbus muss im Allgemeinen und hinsichtlich der einzelnen Theile untersucht werden. Ausser der Form, Grösse, Richtung, Beweglichkeit kommt es besonders auf den Resistenzgrad an, der durch Fingerdruck zu prüfen ist und wofür man in zweifelhaften Fällen das Tastgefühl an gesunden Augen zu üben hat.

Die Hornhaut ist en profil und en face zu betrachten, um deren Durchsichtigkeit, Krümmungsoberfläche, Glanz, Gleichmässigkeit im Centrum und in der Peripherie zu bestimmen. Lichtreflex und Loupenbetrachtung gibt über kleine und doch oft sehr nachtheilige Unebenheiten, Facetten, Geschwürchen etc. in der Oberfläche Aufschluss. Irrthümern vorzubeugen, ist es absolut erforderlich, überhaupt jedes zweite Licht zu beseitigen und stets nur in einfenstrigen Zimmern Augenuntersuchungen und -operationen vorzunehmen. Ist Lichtscheu sehr hinderlich, so wird die Untersuchung bisweilen dadurch erleichtert, dass man sich und dem Patienten ein Tuch überhängt, um in beschattetem Raume in das kranke Auge zu blicken. Auch wird gerathen, Augen mit grossem Lichtreiz im Schlaf des Patienten leise zu öffnen. Jedenfalls sei man bedacht, mit schnellem Blick jede Anomalie wahrzunehmen.

Von der Sclerotica gilt dasselbe; besonders ist der Scleralfalz auf Missfarbigkeit, der übrige Theil auf Injection, Substanzalienation, Ectasie u. dgl. zu untersuchen, was hinsichtlich des hinteren Hemiglobes oft nur durch Induction oder durch Ophthalmoscopie möglich ist.

Der Raum zwischen Hornhaut und Iris kann erweitert, verengert oder gänzlich geschwunden sein, ebenso kann er fremde Körper, Eiter, Blut, entmischtes Kammerwasser u. dgl. enthalten.

Die Iris kann entfärbt sein, eingezogen oder vorgetrieben, in ihrer Structur verändert, nach Hinten oder Vorn ganz oder theilweise verwachsen, mit Flecken und Eiterheerden durchsetzt, die Bewegung kann zu stark, zu schwach, verändert oder aufgehoben sein u. s. w.

Um den Beweglichkeitsgrad zu constatiren, wird die Lichtprobe gemacht nach zeitweiser Verdunkelung. Auch kann man durch gelinde Reibung und Reizung des Bulbus durch das Oberlid Contraction der Iris bewirken.

Die Pupille wird mit der Iris gemeinschaftlich und für sich untersucht. Hauptsache ist, dass sie frei sei, um dem Lichte ungehinderten Zutritt zu den Augenmedien und den lichtpercipirenden Organen zu gestatten. Sie kann zu weit, starr, zu eng oder gänzlich aufgehoben sein, letzteres meist in Folge von Einlagerungen. Oft ist sie verzogen, seitlich gelagert, mehrfach vorhanden etc. — Die normale Purpurschwärze fehlt oft, weil die tief hinter ihr gelegenen Theile krank sind.

Zur genauen Untersuchung des Linsensystems bedarf es ausser der directen Betrachtung diagnostischer Experimente, die ihres Orts besprochen werden.

Dasselbe gilt von Corp. vitr., Retina, Choroidea, Nerv. optic. etc.

Nach Aufsuchung der objectiven Lokalalienationen ermittele man die des Gesamtorganismus und gehe erst dann zum Examen der subj. Symptome über, die hinsichtlich des Grades der Sehkraft und der Gefährdung innerer Organe entscheidende Wichtigkeit haben. Chronischer Entzündungszustand z. B. der Chor. ist ohne Beachtung der subj. Symptome häufig nicht zu erkennen. Die Sehkraft scheint bisweilen gänzlich aufgehoben, während sie nur in hohem Grade verringert ist, was durch Versuche mit grellem Licht in beschattetem Raume festzustellen ist. Doch bleibe man bedacht, subj. Lichterscheinungen nicht mit Lichtempfindungsvermögen zu verwechseln, wozu Irrthum des Kranken Anlass geben kann. Ebenso beachte man Funken-, Nebel-, Mücken-, Einfach-, Doppelt-, und Halbsehen, die Fähigkeit der Farbenunterscheidung, die Grenze der Sehkraft in der Nähe und auf Abstand, das Vermögen, für längere oder kürzere Dauer scharf zu sehen, die Haltung des Kopfes und der Augen beim Sehen und ob im hellen oder im gemässigten Lichte, ob durch feinperforirte Platten besser und dauerhafter gesehen wird und welche entoptische Erscheinungen der Patient dabei wahrzunehmen angibt. Den Grad der Schärfe stellt man durch Benutzung

der Jäger'schen Tafeln in verschiedenen Abständen fest, (dieselben enthalten Druckschriften von der verschiedensten Grösse) ausserdem durch experimentelle Vorrichtungen verschiedener Art, deren später Erwähnung sein wird.

Erst zum Schluss wird alles anamnestisch Wichtige ermittelt, die Genese des gegenwärtigen Zustandes, Krankheitsanlage, Gewohnheiten und Beschäftigung des Patienten, vorhergegangene Behandlung u. dgl. In einigen Fällen lässt sich der stat. praesens nur aus der Anamnese mit voller Sicherheit diagnosticiren.

In therapeutischer Hinsicht beginne man im Allgemeinen vorsichtig mit den schwächeren Mitteln und verzichte auf Wiederholung einer schon einmal erfolglosen Behandlungsart, insofern es nicht unzweifelhaft ist, dass sie vordem unzweckmässig oder unzeitig in Anwendung gezogen wurde. Jedenfalls sei man sich über die Diagnose durchaus klar, ehe man zu energischen Mitteln greift, und untersuche lieber wiederholt, um nicht übereilt Unzuverlässiges anzuordnen.

I.

Die Lider.

Ablepharon (v. Ammon).

Mangel des Lides, uni — oder bilateral, angeboren oder erworben.

a. Abl. congenitum. — Die Lider sind in der 10—12 Woche des Foetallebens zuerst bemerklich, (*Blandin, Meckel*) vereinigen sich zuerst an den Rändern und lösen sich wieder vor der Geburt. Hemmungsbildungen sind selten, besonders ohne andere ähnliche Defecte; sie kommen aber vor (*Vicq-d'Azyr, Morgagni, Sprengel, Carron*).

b. Abl. acquisitum ist eine häufige Erscheinung nach Verletzungen. Schusswunde¹⁾, Biss eines Hundes (*Desmarres*). Verbrennung, Lupus u. s. f.

Cur: Plastische Operationen müssen bald vorgenommen werden, um das Auge zu retten.

Coloboma palpebr.

Spaltung des Lides, uni — oder bilateral, angeboren oder erworben, ähnlich dem Labium leporinum.

a. Col. congenitum. — Nicht so selten, als *Ablepharon*, aber beobachtet (v. *Ammon, Seiler*), partiell, wo dann der Bulbus noch bedeckt werden kann, oder total, so dass die Entstellung bedeutend ist und operirt werden muss.

b. Col. acquisitum, sehr häufig, besonders nach Hieb- wunden²⁾, heilt nach sofortiger Naht p. prim. intentionem meist sehr günstig, vernachlässigt kann es sich compliciren mit *Symblepharon, Ptosis, En* — und *Ectropium*. Wird die Operation versäumt oder missglückt sie, so kommt das Auge in Gefahr.

Cur: operativ. Bleibt nach einer Verletzung eine schwieligte Spalte eines Thränenröhrchens (*J. A. Schmidt*), so werden die Thränen nur unvollkommen aufgesogen. Dieser Zustand widersteht in der Regel, aber ohne Nachtheil den Operationsversuchen, da das andere Thränenröhrchen allein die frühere Function beider übernimmt.

¹⁾ v. Ammon. Krankheiten des menschl. Auges. II. Bd. Taf. VI. Fig. 17.

²⁾ v. Ammon l. c. Taf. I. 4. II. 1—4.

Ankyloblepharon,

Verwachsung der freien Lidränder mit einander, partiell oder total, angeboren oder erworben.

a. Ank. congenitum. Sehr selten, mit gleichzeitigem Defect des Bulbus (*Botin*), durch eine Pseudomembran bewirkt (*Wenzel*), partiell und total (*Schæn*, *Kaltschmidt*, *Rognetta*) durch Bindehautfalten geschlossen der Art, dass eine Oeffnung zum Abfluss der Thränen bleibt (*Rognetta*). *Andreæ* u. A. behaupten, völlige Verschliessung komme nie vor. Partielle Complication mit *Symblepharon* fehlt fast nie. Es kommt auch bei Hausthieren vor (*Leblanc*).

b. Ank. acquisitum ist ziemlich häufig, besonders partiell, doch meist ohne Adhaesion des Lides mit dem Bulbus. Wunden durch Explosionen, ätzende Substanzen, Lidverschwärung mit anhaltendem Lidkrampf¹⁾, Operationen an den Lidrändern und Aehnliches können dieses *Ank.* herbeiführen. Die Verwachsung ist selten eine unmittelbare, die Knorpel sind nie mit einander verwachsen gefunden. Meist ist ligamentöse oder pseudomembranöse Zwischensubstanz nachweisbar, oft ist nur die äussere Haut (bei *Excoriation* und Krampf) sehr dünn verwachsen.

Cur: nur operativ.

Phimosis palpebrarum (v. Ammon).

Zu enge Lidspalte, wie solche bei *Ankyloblepharon* und *Atrophia bulbi* vorkommt, selten angeboren, noch seltener erblich (*Desmarres*). Temporär bei fetten Kindern mit *Ophthalmia neonatorum*. Wird das Sehen beeinträchtigt oder drohen *Strabismus*, *Amblyopie* u. d., so muss auf operativem Wege Hülfe geschafft werden.

Symblepharon,

Verwachsung des Lides mit dem Bulbus, total und partiell, angeboren und erworben.

a. Symb. congenitum, äusserst selten, nur bei Atrophie des Bulbus beobachtet.

b. Symb. acquisitum²⁾ ist häufiger, sowohl partiell als total. Letzteres, auch *Symb. posterius* genannt, beruht gewöhnlich nicht auf Verwachsung der Bindehaut, sondern auf Atrophie und Defect derselben, so, dass die Bindehaut vom Ciliarrande direct auf den Bulbus übergeht. Das Partielle hat viele Zwischenstufen und ist nicht selten mit *Ankyloblepharon* complicirt. Bei der einfachsten Form ist nur ein Pseudoligament zwischen Lid und Bulbus vorhanden, häufiger aber sind mehre vorhanden, oft viele so feste und kurze, dass die Beweglichkeit des Bulbus beeinträchtigt ist. Dies ist besonders

¹⁾ v. Ammon. Taf. VI. Fig. 14, Ank. med., indem beiderseits keine Verwachsung stattfindet.

²⁾ v. Ammon l. c. Tab. VI. Fig. 1—13 verschiedene Formen und Grade.

der Fall, wenn die Cornea an der Verwachsung participirt. Ich operirte ein solches wiederholt, die Verwachsung kehrte stets zurück. Ich verlor den Kranken, dem ich eine künstliche Pupillenbildung vorschlagen wollte, da das andere Auge atrophisch war, nachher aus den Augen. Die fibröse oder pseudomembranöse Zwischensubstanz erstreckt sich sehr oft bis in die Uebergangsfalte, so dass sie mit Sonden nicht umgangen werden kann. Das *Symb.* kann Veranlassung zum *Strabismus* geben. Als aetiologische Momente kommen Wunden mit Substanzverlust, *Caries*, üble Eiterungen, langwierige Verschwärungen, besonders aber Explosionen und Aetzwunden am Häufigsten vor.

Cur: nur operativ.

Lagophthalmos,

Hasenaugen, d. h. ein solches Auge, an dem ein Lid oder beide Lider zu kurz sind, um sich beim Versuche des Schliessens zu berühren. Das Auge bleibt also mehr oder weniger unbedeckt und ist verderblichen Entzündungen ausgesetzt. Ueber angeborenes wirkliches Hasenaugen gibt es wenig zuverlässige Nachrichten. Das erworbene kommt häufig vor nach *Gangraena*, *Anthrax*, Verletzung und Narbencontraction¹⁾, langwieriger Entzündung und Eiterung der Lider, *Periorbitis*, *Caries* u. s. f. und muss als *Lag. organicus* unterschieden werden von *Lag. paralyticus*, mit welchem Namen man die aus Lähmung des *N. facialis* entstandene Unfähigkeit, die Lider zu schliessen, bezeichnet. Ist das untere Lid gelähmt und gesenkt, so gewinnt oft das obere Kraft, durch tiefere Senkung das untere noch zu erreichen.

Lag. spasticus, durch Krampf des *M. levator palp. sup.* hervorgebracht, ist noch nicht zur Evidenz erwiesen. (Uebrigens s. Nervenkrankheiten.)

Lag. organicus complicirt sich leicht mit *Ectropium*.

Cur: operativ, da erschlaffende und ausdehnende äussere Mittel nie mit Erfolg angewendet worden sind.

Blepharoptosis s. Lapsus palp. sup.

Herabhängen des oberen Lides über den ganzen Bulbus oder einen Theil desselben. Das Aufheben des Lides mit den Fingern ist möglich, dem Willen des Patienten ist es unmöglich.

a. Bleph. organica. Durch gänzlich oder theilweises Fehlen des *M. levat. palp. sup.* (*Caffe*), durch Zellgewebsschwund im höheren Alter oder nach Krankheiten (*Oedema chronicum*, *Blepharitis phlegmonosa*, *erysipelatos*, *Ophthalmia granulosa*, *Tylosis*, *Ecchymosis* und *Abscessus palp.* —) und dann oft mit Lähmung complicirt. Ebenso können *Hypertrophie*

¹⁾ v. Ammon. l. c. Taf. V. Fig. 12—14, nach einem Hufschlage.

des Zellgewebes, *Lidtumoren*, *Caries* der *Orbita*, unpassende örtliche Mittel und Verbände Ursache sein. Bei *Ptoſis* nach *Phlegmone* ist oft der Lidknorpel degenerirt (*Rosas, Desmarres*). — *Entropium* und *Trichiasis* gesellen sich gern hinzu. Der Bulbus und die Pupille bleiben normal beweglich. v. Ammon beschreibt (Bd. III, Taf. I. Fig. 8 und 9) zwei Fälle von angeborener bilateraler *Ptoſis*, die Lider waren zu lang und konnten im ersten Falle gar nicht, im zweiten nur theilweise, zugleich mit der Stirn, emporgehoben werden. Er zählt diese Art zu den Hemmungsbildungen, da die Lider des Foetus länger als nöthig wären. (*Seiler, v. Ammon*.)

Cur: Bei hochgradiger *Ptoſis* operativ. Bei leichteren Formen muss die Contractilität des Zell- und Muskelgewebes normirt werden durch aromatische Waschungen (Rep. 1) adstringirende Bähungen (Rep. 2) oder Reizmittel, *Empl. Cantharid.*, — 14 Tage auf dem Lide die Eiterung erhaltend, *Acid. sulph.* vorsichtig nach Bedarf auf das Lid gepinselt, *Ol. Crot.* in Salbenform auf das Lid gebracht (Rep. 3).

b. Bleph. paralytica s. Blepharoplegie ist Folge der Lähmung einzelner Theile oder des Stammes des *N. oculomotorius*. Der *M. orbicularis* bleibt dabei in Kraft, die Pupille ist dilatirt, weil auch die motorischen Ciliarzweige gelähmt sind, der Bulbus wird durch den *M. obliquus super.* oder häufiger durch den stärkeren *M. rect. ext.* in unbeweglichem *Strabismus* festgestellt. Die Sehkraft ist schwächer, besonders für nahe Objecte wegen beschränkter Coaptation. Contractur der antagonistischen Muskeln, Entzündung und Trübung der *Cornea* und *Entropium* können im Verlauf dieses Zustandes eintreten.

c. Bleph. spastica nennen Einige den Zustand, wo sich zu der Lähmung des *M. levator* Krampf des *M. orbicularis* hinzugesellt. (S. Nervenkrankheiten.)

Epicanthus (v. Ammon.)

Halbmondförmige, nach Aussen concave Hautfalte, nach Innen zu von den beiden innern Augenwinkeln an der Nasenwurzel sich erhebend, oben in die Brauen, unten in die obere Wangenhaut übergehend. Kommt angeboren ¹⁾ und erworben, uni — und bilateral, aber selten vor. Der angeborene ist oft complicirt mit *Blepharoplegie*, *Strabismus* u. d. m. (v. Ammon), der erworbene geht mit acuten Leiden, die ihn bedingten (Entzündung, Krampf etc.), vorüber, muss aber durch Operation entfernt werden, wenn *Caries*, Blattern, Brandwunden, Narbencontractur etc. die Veranlassung waren. (*Desmarres*). — Der angeborene hat Analogie mit *Phimosis penis congenita* und besteht oft gleichzeitig mit *Blepharophimosis congenita* und *Microphthalmos*. Bei den *Eskimos* endemisch. (*Edwards*.)

¹⁾ v. Ammon. Bd. III. Taf. I. Fig. 1—6 u. Taf. II. 12. —

Die Gesichtsstörung hängt von dem Grade ab, beim weiten Oeffnen der Augen verzerrt sich das Gesicht.

Cur: operativ bei angeborenem und permanentem Epicanthus. Der temporäre bei acuten Krankheiten weicht mit der Beseitigung dieser Leiden; auch geringe Grade des angeborenen verstreichen bei weiterer Ausbildung des Gesichtes von selbst.

Entropium s. *Inversio palpebrarum*.

Einwärtskehrung der Augenlider, partiell oder total, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, geringer Grad, wo nur der Ciliarboden nach Innen gestülpt ist, hoher, wo die äussere Hautfläche dem Bulbus aufliegt.

a. *Entropium congenitum*, äusserst selten und nur als Complication vorkommend¹⁾. Scheinbare *Entr. congen.* verschwinden mit dem Auswachsen des Kindes.

b *Entropium acquisitum* hat ein häufiges Vorkommen und ist bald temporär und heilt als begleitender Zustand mit der Grundkrankheit oder permanent und erheischt dann operative Hilfe. Unter den ätiologischen Momenten gehört

1) Verkürzung der eingeschrumpften Bindehaut zu den häufigsten. Diese Verkürzung kann auf alle chronischen Formen der *Conjunctivitis* folgen, auf Verletzungen, besonders durch Feuer, Aetzmittel, also auch nach unvorsichtiger Anwendung des Messers (z. B. bei Operation des *Ectropiums*) und des Höllensteins.

2) Degeneration der äussern Haut, besonders Erschlaffung, wie sie bei Greisen vorkommt (*Entr. senile*), bei Hypertrophie des Lidzellgewebes, Tylosis, auch durch Narbenwirkung. Gewöhnlich gesellt sich dieser Entstehung bei

3) Regelwidrigkeit oder Krampf des *M. orbicularis*, vorübergehend, aber auch permanent, so dass die Muskelfasern sich verkürzen und der Lidknorpel sich verbiegt. (*Rosas.*) Oft liegen Fasern des *M. orbicularis*²⁾ der Lidspalte so nahe, dass von einer dadurch gegebenen Prädisposition zum *Entropium* gesprochen werden darf.

4) Einwärtsrollung und Muldenform des Lidknorpels, herbeigeführt durch chron. Entzündung und Degeneration der verschiedenen Liddrüsen, *Tylosis*, *Chalazion* und andere Lidtumoren, besonders, wenn gleichzeitig Lichtscheu und Krampf vorhanden ist. Oft folgt auf chron. Excoriationen zuerst *Ankyloblepharon* mit Verkrümmung des Knorpels und dann *Entropium*.

¹⁾ v. Ammon l. c. Bd. III. Tab. II. Fig. 14, complicirt mit Epicanthus, Ectropium, Blepharophimosis und Microphthalmus. — Derselbe: Die angeb. Kkht. Tab. II. Fig. 15 mit Ectropium und Dyskorie.

²⁾ Albinus und Sömmering gaben diesen Fasern den besondern Namen *Musc. ciliaris*.

5) Kleinheit und Atrophie des Bulbus, der wegen dieser Beschaffenheit dem *M. orbicul.* keinen hinreichenden Widerstand leistet, prädisponirt endlich ebenfalls zu *Entropium*.

Entropium ist nicht so entstellend, als *Ectropium*, aber lästiger und gefährlicher, indem es die Entzündung unterhält und im weiteren Verlaufe *Pannus*, *Ulceration*, Perforation der Hornhaut und Verlust des Auges herbeiführen kann. Der höchste Grad, wo die äussere Haut dem Bulbus aufliegt, ist nicht so empfindlich, als wenn die Cilien allein ihn berühren; desshalb ist auch das Oeffnen schmerzhafter, als das Geschlossenhalten, selbst wenn die Cilien erweicht und von Secret überzogen sind.

Die Prognose ist bei acutem *Entropium* günstig, da dasselbe nach der Grundkrankheit auf einfache *topica* schwindet. Je nach der Ursache und der Dauer kann die Prognose aber auch ungünstig sein, sogar in dem Grade, dass auch der Operation nur theilweise Beseitigung möglich ist.

Cur: hauptsächlich operativ. — Leichtere Formen kann man durch *Adstring.*; *Zinc. sulph. Cupr. acet. Alumen etc.* in Lösung, besonders durch *Collodium* zu heben suchen und zugleich durch Pflasterstreifen deren Wirkung unterstützen. Die Finger des mit einem Spiegel bewaffneten Patienten sollen allein das Uebel in einigen Tagen beseitigt haben (*Demours, Benedict*), eine passende Klammer würde dieselben Dienste thun. Auch sind angemessene Brillengestelle (*Middlemoore, Lawrence*) und Fadenschlingen (*Wardrop*) empfohlen worden.

Ectropium s. Eversio palpebrarum, Plärrauge.

Auswärtskehrung der Lider, partiell oder total, so, dass nicht mehr die Haut-, nur die Bindehautfläche des Lides sichtbar ist, an einem, zwei, drei oder allen vier Lidern, häufiger an den untern Lidern.

a. *Ectr. congenitum*, äusserst selten, als Complication von foetalem Symblepharon (*Lawrence, Rognetta, v. Ammon*).

b. *Ectr. acquisitum*, häufig, temporär als Symptom acuter Leiden, z. B. der *Ophthalmia neonatorum etc.*, und permanent aus verschiedenen Ursachen, als

1) Verdickung der Bindehaut (*Ectr. sarcomatosum s. luxurians*) nach allen Formen der Conjunctivitis, deren Heilung es oft überdauert, und nach Geschwülsten, die in der Bindehaut oder ihr nahe liegen.

2) Degeneration und Substanzverlust der äussern Haut besonders Narbencontraction nach Verletzungen durch Feuer, Aetzmittel, Operationsmesser (z. B. bei zu ausgedehnter Excision zur Entfernung von *Entropium*, Geschwülsten u. d. a.); auch oft bei und nach *Caries, Blepharitis gland. erysipelata, phlegmonosa, Gangraena, Pustula maligna*.

3) Regelwidrigkeit des *M. orbicularis*, Paralyse des untern Lides macht, dass dasselbe durch eigne Schwere herab-

sinkt und sich umstülpt, Krampf, fehlerhafte Lage, ganze oder theilweise Zerstörung, abnorme Insertion, besonders Zerstörung einer oder beider Commissuren.

4) Erweichung des Lidknorpels nach chron. Entzündungen und Blennorrhöen mit nachfolgender Verlängerung und Verkrümmung, oft der Art, dass der Knorpel nach Aussen concav ist. (Häufige Ursache des *Ectr. senile*.)

5) Vergrößerung und Hervortreten des Bulbus. Besonders bei gleichzeitiger Infiltration und Wulstung der Bindehaut.

Ectropium ist ein in hohem Grade entstellendes Uebel, selbst bei der leichtesten Form ist die rothe Bindehaut sichtbar, die Thränen laufen über die Wange, weil die Thränenpunkte sich nicht mehr in den Thränensee tauchen. Bei längerer Dauer wird es aber auch gefährlich, die Bindehaut degenerirt zu einer Art *Cutis* oder wird sarcomatös, die Hornhaut wird nicht hinreichend von den Thränen bespült, sie trübt, verdickt sich und wird geschwürig; Irisvorfall und Verlust des Auges können folgen.

Die Prognose richtet sich nach der Ursache und dem Grade.

Cur: hauptsächlich operativ. Ist das *Ectropium* nur Symptom eines acuten Leidens (*Ophthalm. neonat. Chemosis, Blepharitis* u. d.), so lässt es sich wohl durch einfache Reposition beseitigen. — Ist geringe Hautverkürzung Ursache, so nützen örtlich *Oleosa* und *Cataplasmata emollientia*. Auch wird häufiges Ziehen an den Lidern empfohlen (*Richter, Beer, Scarpa*).

Gegen Schwäche und Lähmung des *M. orbicul.* nützen örtlich *Spirituosa* (Rep. 1). Ist Krampf Ursache, so sind *Antispasmodica* dienlich, örtlich *Belladonna* in Salbenform, *Morphium*, endermatisch mit der in concentrirte Lösung getauchten Lancette applicirt. *Fronmüller* und *Hasner* gaben es innerlich mit günstigem Erfolge. (Rep. 4.)

Trichiasis, Distichiasis und Tristichiasis.

Richtung der Wimperhaare nach Innen und Duplication derselben. *Celsus* lehrte schon den Unterschied zwischen *Trichiasis*, wo nur die Wimpern, und *Entropium*, wo das Lid selbst dem Bulbus zugewandt ist. *Trichiasis* kommt selten total, meist partiell vor und besonders am untern Lide, indem die Haare entweder fehlerhaft implantirt oder nur fehlerhaft gerichtet sind. Mehrfache unvollständige Cilienreihen nennt man *Distichiasis, Tristichiasis* u. s. f., doch sind dieselben nicht immer Anomalien (*Winslow, Albinus, Quadri*), indem selbst vierfache Cilienreihe an gesunden Augen keine Seltenheit sind. Regelwidrig müssen sie genannt werden, wenn sie wie supernumeräre Zähne hervorbrechen (*Vidal, Wardrop*), oder wenn sie sich nach dem Verluste der Normalwimpern zeigen

bei *Tylosis*, Fisteln des Lidrandes, Degeneration und Verdrängung der Haarzwiebeln und der Haarzwiebeldrüsen, Erweichung des Knorpels u. d. m. Die Pseudocilien sind meistens sehr dünn und farblos, deshalb meistens schwer zu finden, oft nur mit Hülfe der an ihnen haftenden glänzenden Schleimstreifen (*Sanson*) und der Loupe. Oft stehen diese Härchen büschelweise und keimen aus der Carunkel oder degenerirter Scleralbindehaut (*Tylosis bulbi*). Nach *Scarpa's* Beobachtung gibt die Bemühung der im Sehen gehinderten Patienten, doch scharf zu sehen, Veranlassung zu schiefer Halse, hohen Schultern etc. —

Der Reiz der Haare auf dem Bulbus veranlasst Schmerz, Thränenfließen, Lichtscheu, weiterhin chronische Conjunctivitis mit gleichzeitiger Trübung des Cornealepitheliums, endlich *Keratitis pannosa* und *ulcerosa*, Iritis und Verlust des Auges.

Die Prognose ist bei leichtem Grade günstig und wird nur bei hochgradigen, complicirten, vernachlässigten Fällen ungünstig.

Cur: operativ.

Madarosis.

Schwund der Wimpern und Brauen, wohl stets erworben, erfolgt selten mit der Kahlköpfigkeit der Greise, im Gegentheil werden die Augenhaare häufig im Alter buschig. Die Ursachen sind zahlreich: syphilitische Exantheme der Gesichtshaut, *Eczema*, *Blepharitis glandul.*, *variolosa*, *Exulceratio*, Wunden mit Substanzdefect, *Tylosis*, *Phthiriasis* u. s. f. Bildung von Pseudocilien, Lichtscheu, permanente Entzündlichkeit, Wulstung und Empfindlichkeit des Lidrandes sind die gewöhnlichen Epiphänomene. Stirnschweiss und Staub gelangen leicht in's Auge.

Prognose ist fast stets ungünstig, es sei denn, dass die Augenhaare nach einer schweren Erkrankung ausgefallen sind, in welchem Falle Aussicht ist, dass sie später wiederkehren.

Cur: palliativ, blaue Brillen, um das Licht zu dämpfen, *topica* gegen die Entzündlichkeit der Bindehaut und der Lider, besondere Vorsicht.

Phthiriasis.

Läusesucht der Cilien und Brauen ist nicht specifisch, kann aber bei vernachlässigter *Blepharitis ulcerosa* zu *Trichiasis* und *Tarsomalacie* Veranlassung geben. Ausser Kopfläusen kommen in den Augenhaaren Filzläuse und Milben vor, die durch *ung. Hydrarg. cin.* und *ung. Præcip. rubri* meistens leicht und schnell entfernt werden.

Hordeolum, Gerstenkorn.

Phlegmonöse Entzündung, deren Sitz in den Talgdrüsen des Lides, deren Form die eines Gerstenkornes ist und die mit Betheiligung des umgebenden Zellgewebes zur Eiterung inclinirt. Fälschlich ist ihre Entstehung in die Haarzwiebel-

drüsen (*Zeis*), in die Meibom'schen Drüsen (*Weller, Jüngken, Desmarres, Andreæ*), in das Zellgewebe (*v. Rosas, Lichel, Martini*) verlegt. *Ryba*¹⁾ hat das Verdienst, die Ansicht *Scarpa's*, dass die Talgdrüsen der Sitz seien, erwiesen zu haben. Ursächlich wirken kann jeder Reiz der Lider, Erkältung, Schmutz, Miasmen; gastrische und menstruelle Störungen sollen Veranlassung sein können. Eine gewisse Anlage zur Entstehung von Gerstenkorn bei gewissen Individuen ist ausser Zweifel.

Die Beschwerden sind nicht immer gering, oft gesellt sich entzündliches Oedem, stärkere Secretion aller Liddrüsen, selbst Conjunctivitis mit *Chemosis serosa* hinzu. Nach der Bildung und Entleerung des Eiters endet das Leiden in 1—3 Tagen.

Cur: Das Bemühen zu zertheilen ist nachtheiliger, als die Eiterung, die nur eben nicht zu stören ist. Gegen Indigestionen und Dysmenorrhoe muss angemessen gewirkt werden.

Ein nicht zur baldigen Eiterung gekommenes Gerstenkorn wird deshalb doch niemals Hagelkorn.

Chalazion, Hagelkorn.

Eine Balggeschwulst, deren ursprünglicher Sitz der Lidknorpel ist, die hanfkorn- bis erbsengross, härtlich und unempfindlich ist und nur durch Complicationen in Eiterprocesse gezogen werden kann, ohne durch dieselben auch beseitigt zu werden. Oft sind mehrere gleichzeitig vorhanden, nebeneinander oder nach Innen und Aussen stehend. Das innere wird durch den Druck des Bulbus abgeplattet. Oft drängt dasselbe *Chalazion* nach Innen und Aussen vor, so dass der Tarsalboden perforirt ist und degenerirt. Auf dem Ciliarboden selbst zeigt es sich selten, es basirt immer im Knorpel und unterscheidet sich dadurch von einfachen, verschiebbaren Balggeschwülsten. Nach der Entfernung des meist breiigen, aber auch dünnen und härtlichen Inhalts entsteht es wieder, wenn nicht auch der Balg entfernt worden ist. Bei der Richtung nach Innen röthet sich wohl die Bindehaut, der *M. orbicul.* und die Haut bleiben bei der Richtung nach Aussen gesund und über der Geschwulst verschiebbar. — *Ryba* hat zuerst (l. c.) die vielen irrigen Ansichten über die Entstehung und das Wesen des *Chalazion* widerlegt; dass ein obliterirter *Meib.* Drüsenschlauch die erste Veranlassung sei, wird vielseitig angenommen. —

Die Prognose ist günstig.

Cur: am schnellsten, sichersten und leichtesten operativ. *Topica* können zu Degenerationen führen, doch kann man beim Entstehen, so lange der Balg noch zart und dünnwandig ist, Jod (Tra.) und Mercur (Ung.) versuchen. Auch aromatische Tincturen sollen genützt haben, wohl dadurch, dass Entzündung mit nachfolgender Eiterung eintrat. Ein so geöffnetes *Chalazion*

¹⁾Prager Vierteljahrsschrift. Bd. II.

thut man gut, mit zugespitztem Höllenstein tüchtig und wiederholt auszuätzen.

Milium, Hirsekorn.

Hirsekorngrösse, rundliche, aber auch spitzige und längliche, hellgelbe Knötchen, aus Talgdrüsen der Haut entstehend, eine Hülle mit atheromatösen oder kalkartigen Inhalt bildend und zwischen Corion und Epidermis der äussern Lidfläche und bis $\frac{1}{2}$ Zoll in deren Nähe oft zahlreich aufsitzend. Die Meibom'schen Drüsen (*Chelius*) sind bei der Entstehung der *Milium* unbetheiligt.

Cur: Man schneide das *Milium* mit der Scheere gründlich fort und ätze allenfalls den Grund, um die Hülle zu zerstören.

Laesiones palpebrarum, Verletzungen der Lider. **Corpora aliena.**

Die Lidverletzungen sind der mannichfachsten Art und bedürfen in jedem Falle einer vorsichtigen Behandlung, da sowohl die Verletzung als besonders die Narbenwirkung durch Erzeugung von *Ectopien* (*Coloboma, Ptosis, En- und Ectropium* u. d. m.) dem Auge Gefahr droht. Nach sorgfältiger Reinigung muss sofort eine ganz genaue Vereinigung der Wundränder durch blutige Heftung bewirkt werden. Pflaster löst der Lidschlag zu leicht und es könnte zu Substanzverlust durch langwierige Eiterung führen. Nirgendwo ist desshalb Heilung per prim. intent. so indicirt, wie hier; die Naht muss desshalb ganz genau die normale Form herstellen und sofort antiphlogistisch jeder übermässigen Entzündung vorgebeugt werden. Dabei ist es oft nöthig, eine breite Narbe zu erzielen, was indess nicht immer ohne Implantation möglich ist.

Zu den fremden Körpern, die möglichst schnell entfernt werden müssen, gehören Insectenstacheln, deren Verbleiben leicht zu *Erysipelas* und Brand führen könnte.

Bluterguss in das am Auge sehr weiche und lockere Zellgewebe stellt sich fast jedesmal ein, bedarf aber nur in exquisiten Fällen einer besondern Behandlung. Die Entleerung des Blutes durch Incision ist selten indicirt. Meist reichen Fomentationen mit Bleiwasser aus, sonst kann man durch Seifenspiritus, Salmiaklösung, Arnica u. dgl. die Vertheilung beschleunigen.

Blepharitis phlegmonosa,

Entzündung des Lidzellgewebes kommt am obern Lide gern in der Nähe des Orbitalrandes, am untern in der Nähe des Thränensackes vor und hat entweder einen acuten oder einen chronischen Verlauf. Sie beginnt bald total, die Röthe ist erst schwach, wird aber schnell dunkel, sogar livide, die Falten verstreichen und eine bis baumnuss- und taubeneidicke, glänzende, heisse und schmerzhaft Geschwulst schliesst das Auge. Bald beginnt sie begränzt und breitet sich erst allmählig über das ganze Lid aus. Die Bewegung des Lides

ist sofort beschränkt und bald ganz aufgehoben. Das andere Lid und die Bindehaut participiren an der Entzündung, reichliches Secret setzt sich in Krusten an, die Thränen dringen zwischen den geschlossenen Lidern vor, Spannung und Schmerz belästigen den Patienten sehr, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber mit Frostschauern treten hinzu.

Aetiologisch wirksam können alle Arten von Reiz sein: Contusionen, Insectenstiche, operative Eingriffe, durch scharfe Dämpfe und Schmutz verunreinigte Atmosphäre, caustische Mittel, Phlegmone und Erysipelas der Nachbartheile u. s. f.

Der gewöhnliche Ausgang ist in Eiterung, der oft bald eintritt; Zertheilung, Verhärtung, Brand sind seltner. Bei chronischem Verlaufe wird die Geschwulst welk, die Oberhaut schuppt sich ab, es entsteht *Ptosia*, die nicht immer von selbst schwindet, weil bei längerer Dauer der *M. levator* erschlafft und die *Cutis* nebst dem Zellgewebe hypertrophisch wird.

Cur: So lange auf Zertheilung zu hoffen ist, strenge Antiphlogose: örtliche, sogar allgem. Blutentziehungen, Laxanzen, Kälte, Ung. ciner., später Cataplasmata emollientia. Bei *Chemosis* der Bindehaut nützt Excision eines Stückes. Zur Beförderung der Zertheilung ist loses Ueberstreichen des Lides mit befeuchtem Höllenstein oft dienlich (*Desmarres*). Beginnt die Zertheilung, so würden Emollientia die Erschlaffung und *Ptosia* begünstigen, wesshalb man dann Adstringentia örtlich anwendet (*Aq. plumb.-Sol. Zinc. sulph. Aluminis etc.*)

Eiterung wird durch Cataplasma unterstützt, der *Abscess* nicht zu spät durch einen Querschnitt entleert, um die Narbe möglichst wenig sichtbar zu machen; nach gehöriger Reinigung mit Cataplasmen fortgefahren, bis alle Härten geschmolzen sind. Ist Grund zu der Besorgniss, man könne mit der Lancette den Bulbus verletzen, so schiebe man *Jäger's* Hornplatte vorher unter das Lid.

Beginnender Brand wird durch Scarrificationen, Blutegel und warme Fomente oft noch bekämpft, schreitet er vor, so sind Infus. Chamomill. und Arnicae, Dec. Chin. angezeigt, zerstört er, so muss der Hautverkürzung durch erschlaffende Mittel vorgebeugt werden.

Bleibt Infiltration des Zellgewebes und *Ptosia*, so greife man zu geistigen Tincturen (Spirit. Lavandulae, Rorismar. saponat. Aq. Menth. pip. u. d.). *Desmarres* empfiehlt fliegende Vesicatores mit Recht, um die Zertheilung zu beschleunigen.

Blepharitis erysipelatosä, Lidrose.

Entzündung der äussern Lidhaut, gleichzeitig mit Gesichtsrose oder für sich, auf beiden Augen oder einem oder wechselnd, besonders auf dem obern Lide entstehend. Die Haut ist zuerst diffus hellroth, später dunkler, glänzend, die Querfalten verstreichen, die Geschwulst schliesst das Auge bald

so, dass nur schwer der Bulbus auf Blennorrhoe, mit der das Leiden wegen der gesteigerten Secretion Aehnlichkeit hat, untersucht werden kann. Fingerdruck macht die Röthe momentan verschwinden und hinterlässt einen Eindruck. Oedem, Blasen und Phycänen mit Bildung von Krusten, die, ohne Narben zu hinterlassen, abfallen, treten oft hinzu. Die Patienten klagen mehr über Spannung, Jucken, Stechen und Wärme, als Schmerz.

Von der idiopathischen Lidrose, die epidemisch und aus denselben Ursachen, wie die Phlegmone entsteht, unterscheidet man die sympathische, die auf Gemüthsaffecte, gastrische Störungen, Conjunctivitis, Periorbitis und andere Localkrankheiten folgt. Gastricismen gesellen sich leicht hinzu.

Erfolgt die gewöhnliche Zertheilung unter Abschilferung der Haut nicht, so achte man auf die Complication mit *Bleph. phlegmonosa*, die allerdings selten, aber schlimmer als die primäre Phlegmone ist und sich durch matsche Erweichung und weitgreifende Zellgewebszerstörung von dieser unterscheidet (*Mackenzie*). Bei frühzeitiger Oeffnung entleert sich eine dünne, milchige Flüssigkeit (*Lawrence*). Ueberhaupt sei man vor Complicationen auf der Hut, Sclerose und kaltes Oedem des Zellgewebs sind hartnäckige, aber nicht die schlimmsten. Der Erguss des Eiters durch oft tiefgehende Fistelgänge in den Thränensack, die Nasenhöhle, des *antrum Highmori*, den hintern Theil der Schädelhöhle kann selbstredend die lästigsten Uebel und Todherbeiführen. (*Lawrence, Mackenzie, Benedict* u. A.) Ebenso kann Conjunctivitis mit heftiger und sich hervorquetschender *Chemosis* Folge sein und das Auge in grösste Gefahr bringen.

Cur: in einfachen Fällen das bekannte Verfahren gegen Rose: trockne Wärme, Emeticum, gelindes Laxanz oder Solvens. Locale Blutentleerungen werden selten nöthig werden. *Richard Dobson* und *Desmarres* empfehlen 10—15 Einstiche in das Lid, um Blut und Wasser zu entleeren, sodann lauwarme Wassercompressen. Hinterher Aq. saturnina, welches Mittel *Seitz* sofort anwenden will. Bei tiefer Eiterung Sorge man nicht furchtsam für Oeffnung und Offenbleiben. Gegen *Sclerose* Ung. Hydr. ciner., gegen kaltes Oedem Aromatica (Kräutersäcke mit Kampher und dergleichen). Sogenanntes *Pladaroma*, sackartiger Lidwulst, wird abgetragen in gewöhnlicher Weise.

Blepharadenitis ciliaris,

Entzündung der Haarzwiebeldrüsen, sehr häufig und wegen seiner Folgezustände verschiedentlich definirt und benannt, sitzt mehr im oberen, als im untern Lidrande, meistens bilateral, selten total, springt gern von einer Stelle zur andern über, wenigstens bezüglich des Intensitätsgrades und ist im Allgemeinen characterisirt durch Röthe, Geschwulst, Neigung zu punktförmiger Abscedirung im Lidrande und chroni-

schem Verlauf. Meist erst im Bestehen der Entzündung setzt sich plastisches Exsudat in dem die Drüsen einhüllenden Zellgewebe ab, indurirt und gibt dem Lidrande eine selten gleichförmige, häufiger höckerig-knotige Gestalt und Derbheit, die zu bleiben pflegt, wenn die Entzündung theilweise zurückgeht, und um so mehr sichtbar wird, je mehr stellenweise das Zellgewebe zerstört und der Rand verschrumpft, eingezogen und wie zerfressen erscheint. — Anfänglich zeigen sich nur leichte Schüppchen um den Grund der einzelnen Wimpern, von stärkerer Secretion der sehr wenig Jucken verursachenden Haarzwiebeldrüsenentzündung herstammend, das Haar ringförmig umgebend und abgelöst nicht selten als Ringschüppchen auf demselben hängend zu sehen. Nach der Ablösung ist der Grund um die Wimper leicht excoriirt und sogar blutig, von sehr feinen Gefässen umgeben. In diesem Zustande kann bei oft unverhältnissmässig heftiger Störung des Gesichtsgebrauches die Entzündung lange Zeit beharren, bis Zertheilung eintritt oder innigere Betheiligung des Zellgewebes und der Palpebralbindehaut. Dieser Fortschritt deutet sich an durch intensivere Röthung der ganzen Lidkante und ein excoriirtes Dreieck, dessen Basis im äussern Augenwinkel und dessen Spitze oft durch das erste Drittheil der obersten Hautfalte des untern Lides verläuft. Nun beginnt die Abscedirung, nicht in den Haarzwiebeldrüsen, sondern in dem sie einhüllenden Zellgewebe. Die Haarbälge bleiben intact, bis sie durch oft recidivirende Entzündung, Eiterung und Vernarbung ihrer Drüsen und des Nachbargewebes verdrängt, der ihnen zustehenden Ernährung beraubt werden, degeneriren, absterben und ausfallen. So entsteht *Trichiasis*, *Madarosis* und bei weiterer Absetzung plastischen, bald erhärtenden Exsudates *Tylosis*, Lidschwiele, im untern Lide *Ectropium*. Der stärkeren Secretion der Schleimfollikel und Meibom'schen Drüsen gesellt sich Hyperämie der Lidbindehaut, Lichtscheu und Lidkrampf bei; auf die von Krusten befreiten wunden Stellen wirken die reichlicheren Thränen ätzend ein; hinter dem ectropischen und hypertrophischen untern Lide angesammelt, lassen sie das Auge in Thränen schwimmend erscheinen. Die Thränenpunkte schliessen sich oder tauchen, nach Aussen gelagert, nicht mehr in den Thränensee, so dass die Thränen über die Wange abfliessen (*Epiphora*). Weiterhin tritt *Tarsomalacie* und Knorpelverkrümmung, *Ectropium* und *Epidermoidaldegeneration* der Lidbindehaut hinzu. Nicht selten findet man Fistelgänge von den Geschwüren nach den oft obliterirten Meibom'schen Drüsen. In letzteren finden sich wohl hellgelbliche, hirsekorn-grosse, steinige Concremente. Eine sehr üble Complication ist die oben angedeutete *Asthenopie* die in verringerter, oft auch gesteigerter Erregbarkeit der Ciliarnerven ihren Grund hat. Ursächlich ist unverkennbar, dass blonde Kinder mit sogenannter scrophulöser Diathese

prädisponirt sind, Erwachsene mit *Tuberculose* und vielleicht *Syphilis*. Durch Rauch und Staub verunreinigte Atmosphäre, Feuerarbeiten, Exantheme u. d. werden ebenfalls beschuldigt. Die Ansicht *Beer's*, dass Augencatarrh Veranlassung sein könne, ist jedenfalls irrig. Er kann allerdings vorausgehen und periodisch hinzutreten. Ebensowenig lässt sich *Begin's* Ansicht, scharfes Sehen bei feinen Arbeiten verhalte sich ursächlich, als richtig erweisen. Nachtheilig muss es beim Bestande der Krankheit und gleichzeitiger *Ciliarirritation* jedenfalls sein.

Cur: je nach den Ursachen und dem Irritationsgrade einzurichten. Desshalb müssen nachtheilige Aussenverhältnisse beseitigt und entsprechende Mittel für das Allgemeinbefinden verordnet werden: Reinlichkeit, frische Luft, Bäder, Climawechsel, auch die s. g. *Antiscrophulosa*. — Oertlich dienen *Adstringentia* (Zinc. sulph. Plumb. acet. in solut.-Cupr. sulph. Arg. nitr. c. Nitro in subt.), wenn Excoriationen oder Granulationszustand der Lidbindehaut es erfordern. Vor der Application müssen Krusten und Schüppchen consequent und vorsichtig entfernt werden, zu welchem Behuf *Emollientia* und *Mucilaginosas* zu empfehlen sind, denen man, um der Reizung gleichzeitig zu begegnen, *Narcotica* zusetzen darf. Solche *topica*, auch Nachts angewendet, nützen oft erst spät, aber sie nützen mehr als Blutegel, die *Demours* empfahl. Durch ungesalzene Butter, Mandelöl, milde Salben unterstützt man diese Wirkung und gibt den Partien zugleich grössere Geschmeidigkeit. Ist der Reizzustand vollständig geschwunden und nur Infiltration zurück, so gehe man vorsichtig zu Reizmitteln über, um die Resorption zu bethätigen: *Sublimat.* (Rcp. 5), rother (Rcp. 6) und weisser *Præcipitat*, nach jedesmaliger vorsichtiger Reinigung von Schuppen und Krusten und nach Bedarf mit Opium verbunden.

Besteht *Tylosis* mit Fisteln in die Meibom'sche Drüsen und Geschwürbildung, so ätze man mit einem spitzen Höllenstein, mache wöchentlich einige Male Scarrificationen und kleine Einstiche. Einwärts gekehrte Cilien werden extrahirt, gegen Geschwulst Ung. Hydrarg. ciner., gegen Complicationen und Folgekrankheiten die zuständigen Mittel und Operationen.

Blepharadenitis Meibomiana,

Entzündung der Meibom'schen Drüsen, bei spontaner und primärer Entstehung meist nur einzelne Drüsen befallend, die dann roth und hirsekorngross vorragen und deren Schläuche ebenfalls abwärts laufend sichtbar werden. Geht die Entzündung über alle Drüsen, so zeigt sich ein halbmondförmiger, rother Wulst, der der Innenfläche des Knorpels aufliegt. Dieses Auftreten ist sehr selten. Er geht in Zertheilung über oder infarcirt die Drüsen mit einem gelbkäsigen oder kalkartigen Contentum. Die complicative Form, besonders bei

Conjunctivitis, ist dagegen häufig und zeigt sich durch das zu gelben Krusten am Lidrande erhärtende Secret an. Im Verlaufe kann Abscedirung, Entstehung von Balggeschwülsten (nicht *Hordeolum*, vielleicht *Chalazion*), sogar von *Tarsomalacie* Folge sein. Verschwärungen sollen mit Chankern Aehnlichkeit haben (*Hasner*).

Cur: schliesst sich der Behandlung der entzündeten Lidbindehaut an.

Crusta lactea palpebrarum, Lideczem, erscheint für sich oder gewöhnlicher mit Eczem der Gesichtshaut. Die kleinen, gelblich gefüllten Bläschen platzen, das Secret excoriirt die Nachbarschaft, es bilden sich Krusten und oft erscheint das ganze Lid als Geschwürsfläche. Es kommt wie das Eczem vor und macht nur wegen möglicher Complication mit Entzündung der Lidrüsen, der Bindehaut und Hornhaut Vorsicht nöthig.

Cur: Reinlichkeit, erweichende Fomente und Waschungen, vielleicht weisser Präcipitat (Rep. 7), innerlich leichte Abführung und Stiefmütterchenthee reichen aus.

Furunculus, Carbunculus simplex und contagiosus (s. Anthrax).

Der Furunkel (Blutschwäre), diese bekannte phlegmonöse Entzündung einer Hautdrüse in oder unter der Lederhaut, bewirkt an den Lidern heftige Geschwulst, Schmerz, Fieber und kann zur Verwechslung mit *Dacryocystis* führen. — Gewöhnlich geht er in Eiterung über, die man zu unterstützen hat, um baldigst eröffnen zu können. Durch energische Anwendung der Kälte, durch festes Aufbinden von Charpiebäuschen, die mehrere Male täglich in aq. saturn. getränkt werden müssen, kann man versuchen, das Zurückgehen zu bewerkstelligen.

Der Carbunkel am Auge ist wegen seiner grösseren Ausdehnung und seiner entschiedenen Neigung in Brand überzugehen und viel Substanz zu zerstören, noch gefährlicher. Dasselbe gilt in noch höherem Grade von dem Milzbrandcarbunkel, der durch Insecten, die auf milzbrandkrankem Vieh gesogen haben, bei Menschen entwickelt wird und ansteckend ist.

Neben energischer innerer Behandlung bei drohender Blutdissolution (durch aq. oxymur., Säuren u. dgl.) ist sofort örtlich einzuschreiten, um die Eiterung, Jauchebildung und Substanzerstörung zu verhüten. Gelingt dies nicht durch strenge Antiphlogose, so muss incidirt und cataplasmiert werden. Die Anwendung von Cauterien dürfte nur in verzweifelten Fällen indicirt sein, doch darf man nicht zögern, bei dem contagiösen *Anthrax* (auch *Pustula maligna* genannt) durch Aetzkali, Salz- oder Schwefels., liq. *Bellostii* oder butgr. *Antimonii* den Kern der Pustel und damit den *virus* zu vernichten.

Warzen, Krebsleiden, Muttermäler, erectile Gefässgeschwülste, Balggeschwülste und andere, der speciellen Chirurgie angehörige Uebel werden, wenn sie am Auge begegnen, in derselben Weise, nur mit der Modification und Behutsamkeit, welche der leichtzuverletzende Bulbus erheischt, behandelt. Cauterisation, Ligatur, Compression u. dgl. Methoden sind in der Regel der Exstirpation nachzusetzen, von deren besonderer Ausführung im operat. Theile die Rede ist.

Primäre und secundäre Syphilis an den Lidern, im Allgemeinen selten und desshalb leicht verkannt, erfordert dieselbe Behandlungsweise, wie an andern Körpertheilen, und muss nur mit der grössten Vorsicht ausgeführt werden.

II.

Die Bindehäute.

Conjunctivitis simplex,

Einfache Entzündung der Bindehaut, durch mittelbare oder unmittelbare, mechanische und chemische Reize hervorgerufen, durch graduell verschiedene Injection, bes. der Scleralbindehaut characterisirt und häufig schon im ersten hyperämischen Stadium sich zertheilend. Die Anastomosirung der ausgedehnten Gefässe kann so dicht werden, dass die Röthe als gleichmässige erscheint. Wird der Reiz, gewöhnlich ein eingedrungener fremder Körper, bald entfernt, so hört die Hyperämie oft sofort auf. Bei dauernder Reizung vermehrt sich die schleimige Secretion; es kann sogar Oedem und Bluterguss in die Bindehaut folgen (*Chemosis* und *Taraxis*). Das Gefühl nach Entfernung des fr. Körpers, als wäre derselbe noch im Auge, rührt von dem Reizzustande der verletzten Bindehaut her.

Von der durch unmittelbare Reize hervorgerufenen primären *Conj. simpl.* unterscheidet man die secundäre, welche sich zu fast jeder andern Entzündung am Auge gesellt und besonders in der dem Bulbus näheren und verwandteren Scleralbindehaut sitzt.

Diese *Conj. simpl. secundaria* gesellt sich zu dem *Retinal-erethismus*, der auf übermässiges Sehen bei übler Beleuchtung, auf die Gewöhnung an den Lichteinfluss nach Staaroperationen u. s. w. folgt, activ hinzu. Bei partieller *Chorioiditis* (z. B. nach Dislocation des Staares) entspricht die Injection der Bindehaut stets der entzündeten Partie der *Chorioidea*. Die Injection liegt in solchem Falle nicht in der *Sclera*, wie man früher glaubte, und würde auch, wenn sie in ihr läge, wegen der Mächtigkeit der Tenon'schen Capsel kaum sichtbar sein. (*Hasner.*)

Passiv zeigt sich diese *Conj. simpl. secundaria* als conjunctivaler Gefässkranz bei *Iritis*, *Kyklitis*, *Keratitis*, als secundäre Hyperämie bei Exanthemen der äussern Haut und der Hornhaut, besonders aber bei Circulationsstörungen in der *Chorioidea* durch Exsudate in oder an derselben. Die geschlängelten Gefässe, gern als abdominelle bezeichnet, haben meistens nur den Werth einer Collateralcirculation an der Oberfläche des Auges und laufen nur bis zum Cornealrande. Die subject. Symptome beschränken sich auf das Gefühl erhöhter Wärme und Trockenheit, Lichtscheu und Störung der Sehkraft ist fast stets Symptom der Complicationen.

Cur: Die Heilung erfolgt meist auf die Entfernung der veranlassenden Reize ohne weiteres Zuthun, doch thut man gut, bei Verletzung kalte Fomente zur Abwehr eines höheren Entzündungsgrades anzuwenden.

Conjunctivitis exanthematica,

Bindehautentzündung als Nebensymptom acuter Exantheme hat keinen specifischen Character und wird nur der Uebersichtlichkeit halber von der *Conj. simpl.* getrennt abgehandelt. *Seitz* verwirft mit Fug und Recht die Behauptung von *Desmarres*, diese *conj. exanthem.* sei identisch mit der *granulosa* (s. *trachomatosa*), da sich die häufigen Granulationen nur zufällig gleichzeitig finden. Ebenso falsch ist es, Bindehautentzündungen, die nach dem Verlauf acuter Exantheme auftreten, hieher zu rechnen, indem sie nur Aeusserung der nach Exanthemen so oft ausbrechenden *Scrophulosis* sind, also mit der *Conj. lymphatica* zusammenfallen.

Erysipelas soll nach *Mackenzie* und *Middlemore* eine Erhebung mit gelblich-rothen Bläschen am Cornealrande hervorrufen. Diese Erhebung gehört der *Chemosis serosa* an.

Morbilli und *Scarlatina* erregen neben Catarrh und anginösen Beschwerden meist nur eine vorübergehende Hyperämie, doch kommt es bei Vernachlässigung auch zur Entzündung mit heftigen Reflexsymptomen und jener Retinalirritation, die gern als eine Art s. g. *Amblyopie* zurückbleibt. Verläuft das Exanthem normal, so ist die *Conjunctivitis* ohne Erheblichkeit.

Die Cur beschränkt sich auf Verdunkelung, örtliches Reinhalten und — Behandlung der durch Nachlässigkeit verschuldeten Folgeübel.

Variola hat oft, besonders vor Beginn ihrer Involutionsperiode, Blindheit veranlasst, doch ist der Beweis, dass die Pusteln im Auge Pocken waren, dadurch, dass aus ihnen mit Erfolg geimpft wurde, unseres Wissens noch nicht geführt. Die entstehenden Pusteln in der *Conj. sclerae* machen zwar Geschwüre, welche aber ohne bleibenden Nachtheil heilen. (*Andraë*.) Uebrigens siehe *Keratitis*.

Conjunctivitis catarrhalis, Bindehautcatarrh.

Oberflächlicher, bei gesunden und vorsichtigen Individuen gelinde verlaufende Entzündung der Bindehaut, besonders des Lides, durch Röthe, Lockerung, Geschwulst und das sogen. catarrhalische Secret characterisirt und meistens in den Schleimfollikeln beginnend¹⁾. Die Röthe ist graduell und nach dem Sitze verschieden, punkt-, netzförmig und ganz dicht, so dass die weisse Scleralfläche nicht mehr hindurch gesehen werden kann. In den meisten Fällen kann man sich durch Verschieben der *Conj.* leicht überzeugen, dass die Injection nur in der *Conj.* sitzt. Gelockert und wulstig ist die *Conj.* besonders in der halbmondförmigen und der Uebergangsfalte und entspricht stets dem Grade der Hyperämie. Das qualitativ und bald auch quantitativ veränderte Follikelsecret ist lichtgrau oder graugelb, flockig oder durch den Lidschlag in Fäden geschlagen; in den Winkeln und an den Cilien erhärtet es zu gelblichen, brüchigen, fettig anzufühlenden Krusten, die besonders während des Schlafes das Auge verkleben. Durch steten Abfluss kann es die Lidränder, ohne ätzend zu sein, excoriiren. Es enthält nicht bloss zerstörte Epithelien (wie die Thränen), sondern auch unzerstörte und unentwickelte (als runde, einkörnige Zellen) und Fettkugeln. Die stets implicirten Follikel erscheinen als sehr feine hellgelblich infiltrirte oder dunkelgeröthete Bläschen und Punkte, besonders an den Uebergangsfalten und sind meist nur kurze Zeit sichtbar. Unter dem Oberlide ähneln sie, von netzartiger Injection umgeben, kleinen Geschwürchen, in die sie auch übergehen können. Secundär erkranken die Meibom'schen Drüsen oft, was aus der Absetzung der Fettkugeln schon bewiesen wird, nicht primär. Auf der *Conj. sclerae* kommt es meist nur zur stärkeren Hyperämie. Die *Cornea* trübt sich höchstens in der Peripherie, doch zeigte sie nicht selten bei längerer Dauer des Katarrhs Erosionsfacetten, die mit dem Rückgange des Katarrhs von selbst ohne Spur verschwinden.

Subjective Symptome sind das Gefühl von Druck und Brennen, mechanisch durch die Gefässerweiterung herbeigeführt (*Jüngken*), aber nicht charakteristisch, ebenso Schwere der Lider. Trockenheit, Thränenschiessen und Lichtscheu als Reflexwirkung. Trübes und farbiges Sehen rührt meist von Schleimschichten auf der *Cornea*, seltner von den Facetten her, da der Lidschlag es verringert. Die Exacerbation mit Beginn der Dunkelheit ist nicht selten, es tritt das Gefühl ein, als befände sich feiner Sand im Auge. Ebenso erhöhen starke Mahlzeiten (*Beer*) und künstliches Licht (*Arlt*) die Empfindlichkeit.

¹⁾ Hasner führt den Augencatarrh desshalb als Follicularentzündung der Bindehaut auf.

Der Katarrh erscheint für sich oder mit anderen Schleimhautleiden gleichzeitig, bei beiden Geschlechtern, jeder Constitution, in jedem Alter, fast stets auf beiden Augen, zu jeder Jahreszeit, besonders leicht nach plötzlich unterdrückter Transpiration und in unreinen Räumen, oft wie epidemisch und contagiös, ohne dass künstliche Impfungen Erfolg hätten (*Arlt*).

Zu den Complicationen gehören die Pusteln und Geschwüre, die an der *Cornea* zu der Bezeichnung *Ophthalmia catarrh. pustul.* verführten, das Triefauge, Lippitudo, wenn die Krankheit Monate auf der Lidbindehaut fortbesteht, die Lockerung, Erweichung und Abstossung (Facettenbildung) im Corneal-epithelium, blutige und seröse Ergüsse in oder unter der Bindehaut und Oedem der Lider.

In einfacher Form verläuft der Catarrh günstig in 8—14 Tagen und zertheilt sich vollständig. Uebler schon ist es, wenn Relaxation des Gewebes und Gefässerweiterung und fortwährende Secretion zurückbleiben; auf langwierige Formen stellt sich *Phimosis*, bei Vernachlässigung s. g. *Amblyopie* (Cfr. *Anaesthesia cil.*), *Keratitis*, *Kyklitis* und besonders leicht *Iritis* ein.

Cur: im Zustande der Reizung sind besonders alle Schädlichkeiten zu entfernen, zu denen übrigens der vorsichtige Gebrauch der freien Luft nicht gehört. Ist Katarrh der Luftröhre gleichzeitig vorhanden, so nützt mässige Diaphorese. Verstopfung muss vorgebeugt werden. Oft ist ein Brechmittel dienlich. Gegen Lichtscheu u. d. Einreibung von Ung. cin. mit *Belladonna* in die Stirn und Schläfe und ein einfacher Papierschirm. — Nach begonnenem Rückgange, wenn die Theile schlaff sind, Augentropfwässer aus *Arg. nitr.* (Rep. 12) oder *Sublimat* (Rep. 13), nur nicht zur Zeit der Exacerbationen. Hinterbleibt ein Lockereungszustand und excoriirende Secretion, so müssen stärkere Adstringentien angewandt werden (Rep. 14). Werden Wässer nicht vertragen, so gibt man die Mittel in Salbenform (Rep. 15 und 16). Gegen zurückbleibende Empfindlichkeit Bähungen mit verdünnter *Aq. lauroceras.*, gegen Trockenheit Bestreichen der Lider mit reinem Speichel oder Abends mit etwas Mandelöl.

Conjunctivitis trachomatosa, Trachom.

Trachom ist eine unter graduell verschiedener Entzündung und in Form von Bläschen oder Wärzchen verlaufende Auflagerung und Einlagerung eines flüssigen, später gallertartigen, organisirungsfähigen Exsudates unter das Epithelium und in das Parenchym der Palpebralconjunctiva. Knorpel und Zellstoffe können bei ausgebildeten Formen mit in Anspruch genommen und in den späteren Schrumpfungsprocess mithineingezogen werden. Die baldige Zertheilung ist selten, der chronische Verlauf wird durch Nachschübe, die auf constitutioneller Grundlage beruhen, unterstützt. Die Krankheit setzt wenig oder gar kein

Secret, das überhaupt unwesentlich ist und muss als nicht ansteckend bezeichnet werden. Man unterscheidet drei Stadien:

1) Der Auflagerung. Ein mehr flüssiges Exsudat setzt sich unter dem Epithel und in den oberen Schichten des Schleimhautgewebes, besonders am Tarsaltheile des unteren Lides, ab; es entstehen mohnkorn-grosse, graugelbliche, glatte, oft durchsichtige Körnchen, allmählig und einzeln, so dass der Grund nur wenig schlaffer und entfärbt, selten injicirt erscheint und die Patienten selbst von dem Leiden keine Wahrnehmung haben, oder in grösserer Ausbreitung und unter stärkerer Entzündung, so dass die ganze Bindehaut gelockert, rauh und schmutzig roth erscheint, die Lider wenig geschwollen und in der Bewegung, besonders nach dem Schlafe, behindert sind, das Auge empfindlicher ist, leicht ermüdet und dem Patienten das Gefühl eines eingedrungenen fremden Körpers gibt. Mit der Loupe erkennt man sogar Ecchymosen und nach den Körnern vorlaufende Gefässe in dem gering hypertrophischen Papillarkörper. Etwas vermehrte und veränderte Secretion pflegt sich ebenfalls einzustellen, eine sichere differentielle Diagnose ist bis zu dieser Ausbildungsstufe indess noch nicht möglich, da ganz ähnliche (seröse) Exsudate bei Katarrh und Blennorrhöen vorkommen können. Wenn in diesem Zustande die Geschwulst die Ränder auch etwas vom Bulbus abdrängt, so dass die oft reichlicheren Thränen weniger gut abfliessen und das Auge wie in Thränen schwimmend erscheint, so ist doch noch vollkommene Resorption möglich.

2) Der Einlagerung. Ein consistenteres Exsudat lagert sich unter stärkerer entzündlicher Reaction in den tieferen Schichten der Lidbindehaut ein, besonders in den Uebergangsfalten, wo ausserdem geringerer Bulbusdruck der Exsudation freieren Spielraum gewährt. Die Körner liegen einzeln, gruppweise oder bilden eine mehr gleichmässig filzige Aufwulstung, an denen der Knorpel participirt. Das Secret unterscheidet sich von dem blennorrhöischen durch seine wasserklare Beschaffenheit; zu Zeiten ist es mit gelblichen Flecken durchsetzt. Bei Blennorrhoe ist das Secret consistenter, die Geschwulst überhaupt ist stärker, das Exsudat tiefer eingebettet, der Verlauf im Allgemeinen ein durchaus anderer. Das Exsudat des Trachoms in diesem Stadium besteht aus geschwänzten und runden, granulirten Zellen (*Hasner*). Dabei organisirt es sich nun mehrweniger vollständig, bald weich bleibend, bald mehr erhärtend, bald gleichmässig verbreitet, bald stellenweise rapidere Fortschritte machend. Diesem letzteren Umstande der ungleichmässigen Entwicklung ist der Fortbestand der Schleimsecretion zuzuschreiben, indess ganze Partien schon die Metamorphose in zellstoffiges Narbengewebe begonnen haben. Diese Narbenwirkung kann so bedeutend sein, dass nicht bloss die Uebergangsfalten verstreichen, sondern dass die taschenartige Tiefe

zwischen der Bulbus- und Palpebralconjunctiva gänzlich zu existiren aufhört und die Conjunctiva vom Tarsalrande sich direct auf den Bulbus überschlägt. Dieses *Symblepharon posticum* darf nicht wie durch Zusammenwachsen beider Conjunctiven entstanden betrachtet werden.

Auf diesem Höhepunkte steht die Krankheit oft lange; neben geschwellten, hyperämischen Partien, deren normale Functionsäusserung unheilbar verloren ist, befinden sich relativ gesunde, die von Nachschüben heimgesucht werden. Bereits ist aber die Untersuchung schwer, indem das narbige, verdickte Lid kaum noch umgestülpt werden kann. Nun gesellt sich gern *Keratitis pannosa* hinzu, allmählig schleichend oder unter stürmischer Inflammation, sich anzeigend durch Trübung der Epithelialschicht in der *Cornea*, in welche kleine Gefässe von der *Conj. sclerae* vorlaufen, wie oft beobachtet werden kann, oder auch Zweige der vordern Ciliargefässe (*Arlt*). Grauliche Exsudate geben der *Cornea* ein griesiges Ansehen (*Pannus teruis*), oder deutliche Gefässe verästeln sich in der degenerirten obern Schicht, die fleischroth erscheint und bald fast alle Durchsichtigkeit verliert (*P. vasculosus s. carnosus*).

Arlt sieht diesen *P. trachomatosus* keineswegs als Folgezustand, sondern als Theilerscheinung des Trachomes an und schreibt beiden Uebeln dieselbe Grundursache und dieselbe nur durch die Beschaffenheit des Gewebes alienirte Entstehung zu.

Zu den Symptomen dieses Stad. gehören ausserdem sehnige Punkte und Streifen, die besonders am obern Lide gern der Richtung des Knorpels folgen (*Arlt*), während die Uebergangsfalte, wenn sie nicht verzehrt ist, als glattes, fibroides Gewebe erscheint. Natürlich, dass bei solcher Metamorphose die Bindehaut auch aufhört, zu der Augenfeuchtigkeit ihren Tribut herzugeben, die Thränen fliessen über den mattglänzenden, rauhen Bulbus und es entsteht der Zustand, der als totaler *Xerophthalmus* beschrieben wird und fast nur auf Trachom folgt. Andere Folgen sind *Trichiasis* und *Distichiasis*, *Entropium* und *Tylosis*, *Blepharophimosis* etc.

3) Der Rückbildung; als Endstadium darf sie nur als nach dem ersten möglich zugegeben werden und characterisirt sich durch Erweichung, Abflachung und Resorption der Granulation. Von dem Grade und der Dauer hängt es ab, ob die Bindehaut aus einem nun folgenden Zustande der Auflockerung in ganz normalen zurückkehren kann. Meist hinterbleibt ein sehniger Glanz in der Oberfläche der mehr weniger verkürzten *Conjunctiva*. — *Hasner*¹⁾ macht auf die *Ruete*'sche Bemerkung mit Recht aufmerksam, dass alle Bindehautentzündungen mit Neigung zu Granulation die Schleimdrüsen mehr weniger verschonten und hauptsächlich im Pupillarkörper Platz griffen.

¹⁾ Hasner. S. 41. Ruete's Lehrbuch. S. 370.

Die Lehre von den ursächlichen Bedingungen zur Entstehung und Entwicklung des Tr. ist noch sehr dunkel. *Arlt* bezeichnet die scrophulöse Diathese wohl mit Recht als Grundursache, dann war aber, wenn auch mancher Patient tuberculös starb, bei vielen andern nur das Tr. Aeusserung der Scrophulose. Unreine, feuchte Luft, Armuth waren oft im Spiele, aber die begüterte Classe besitzt keine Immunität. Die kräftigen Jahre scheinen zu prädisponiren, Menstruationsanomalieen und das climacterische Alter haben oft ohne Zweifel Einfluss. Erblichkeit und Contagiosität lässt sich nicht zur Evidenz darthun oder läugnen. — *Arlt*¹⁾ ist geneigt, die Stelle im Celsus²⁾ über *Asperitudo* als Lehre unseres *Trachoma* in nuce zu verstehen. —

Die Prognose ist unter allen Umständen eine ungünstige, da man bei gelungener Rückbildung nie vor Nachschüben oder Pannusbildung sicher ist. —

Cur: zugleich allgemein und örtlich. Unter Berücksichtigung der äussern Einflüsse sind Luftveränderung, Aufheiterung des Gemüthes und angemessene Mittel gegen die Allgemeinkrankheit erforderlich. *Gulz*, der eine trachomatöse Dyskrasie aufstellt, empfiehlt bei acutem Auftreten Antiphlogosis (?), bei chronischem günstige Aussenverhältnisse des Patienten, beschränkter Gebrauch der Augen und je nach der scorbutischen, scrophulösen, tuberculösen, gichtischen Disposition — Säuren, Leberthran, Antimonialpräparate (mit Ausschluss des Brechweinsteins), Jodwasser, Bäder. Waschungen und passende Mineralwasser (*Seitz*). Die örtliche Behandlung ist verschieden nach dem Grade und dem Stadium. Die Entzündlichkeit durch leichte Purganzen und Calomel, Ung. cin. c. Bellad. oder Hyosc. in die Stirn, vielleicht örtliche, wohl im Allgemeinen Blutentziehung. Kalte Aufschläge nützen nur in seltenen Fällen, gegen heftigen Supraorbitalschmerz Opium in Salbenform oder örtliche Anwendung von Anaestheticis (*Wutzer*). Gegen Auflockerung Adstringentia (Plumb. acet. Alaun in solut.), zur Resorption bedient man sich am Passendsten des Nitrargent. in sol. unter gleichzeitiger Anwendung in Substanz, doch nur jeden zweiten oder dritten Tag und abgeschwächt durch Zusammenschmelzung mit Kali nitric. dep. — Auch Cupr. sulph. kann man zu letzterem Zweck dem reinen Höllenstein vorziehen, da es milder wirkt und weniger durch das Aetzmittel zerstört als nur gelinde gereizt werden soll. Bedient man sich des reinen Höllensteins, so versäume man nicht, um etwa zurückgebliebene kleine Partikel zu entfernen und die Wirkung auf die *Cornea* zu beseitigen, hinterher kaltes Wasser aufzuspritzen oder mildes Oel einzuträufeln. Statt dieses Mittels oder abwechselnd mit ihm kann man eine Salbe aus weissem Präcipitat

¹⁾ Arlt. S. 137.

²⁾ De re medica, L. VI.

(gr. III—VI auf unc. 1 Adip. suill.) mit einem Malerpinsel einstreichen und auch linsengross in das äussere Lid einreiben lassen. Das Einstreuen von Calomel oder Pulv. Baldingeri (Crem. tart. Bol. und Sacch. pts. aequal.), ebenso Scarrificationen empfehlen sich nicht, Ebenso verdient *Pieringers* Versuch, die Exsudate durch Einimpfung blennorrhoeischen Secretes zum Rückgange zu bringen, nur sehr vorsichtige Nachfolge.

Alle Folgeübel (siehe diese) werden nach entsprechenden Indicationen behandelt.

Conjunctivitis lymphatica, Pustularophthalmie,

Exanthematische Entzündung der Bindehaut, wegen ihres häufigen Vorkommens bei scrophulösen Kindern *Conj. scrophulosa* genannt (*Arlt*), kommt ausserdem bei lymphatischen Subjecten, dysmennorrhoeischen Mädchen, selten bei kräftigen Individuen vor und verläuft oft mit der analogen *Keratitis pustulosa* gleichzeitig als Krankheitseinheit. Der Sitz ist sehr selten in der Palpebralconjunctiva, in der der Sclera am liebsten in der Nachbargegend der Cornea, um welche herum das Exanthem oft rosenkranzartig erscheint. Das Entstehen ist folgendes. Zuerst zeigte sich eine circumscripte, dichte Gefässinjection, höchstens linsengross, in deren Centrum meistens schnell plastisches Exsudat wahrzunehmen ist, das bald einer Pustel, bald einem Knötchen ähnlich ist und nach dem hin eine Gefässverzweigung von dreieckiger Form, mit der Basis der Orbita zugekehrt, früher oder später sich ausbildet. Entwickeln sich mehrere Pusteln gleichzeitig, so erscheint die ganze Bindehaut entzündet, bei einer einzigen stellt sich das Uebel als ein partielles dar und liegt dann gern in der Richtung der *M. rect. ext.* oder *intern.* (*Desmarres*). Liegt das Exsudat sehr oberflächlich, so entleert es sich bald mit Hinterlassung seichter, meist unreinlicher Geschwürchen nach Anssen; liegt es tiefer, so ist auch das Geschwür tiefer und hartnäckiger. (Wird es gleichmässig über die *Cornea* hinaus deponirt, so bricht es nicht so leicht aus und gibt mehr zu dem *Pannus* Veranlassung.) Die Gefässe liegen ebenfalls bald sehr oberflächlich, so dass sie mit der *Conjunctiva* verschieblich sind, bald liegen sie fest und tief in der Tenon'schen Capsel. In der Lidbindehaut entwickeln sie sich nur bei längerem, intensiven Bestande stärker und exsudiren hier noch seltener. Wird das Exsudat frühzeitig (als s. g. *Phlyctäne*) resorbirt, so bleibt keine Spur, aber Neigung zu Recidiven. Selten wird nur ein Auge befallen, oft wechselt das Uebel den Sitz oder verschwindet während eines analogen Leidens am Körper für eine Zeitlang gänzlich, die Reflexsymptome ¹⁾ Lichtscheu, Lidkrampf, Thränen-

¹⁾ *Arlt* bezeichnet sie (l. c. p. 94) als Folgen des Reflexes, welchen die Reizung der im Tarsaltheile verzweigten sensitiven Aeste des Trigeminus auf die Ciliar- und den Thränendrüsenerven und auf den Nervus facialis ausüben.

schiessen sind von dem Grade des *Erethismus*, nicht von dem Sitze und der Ausdehnung des Uebels abhängig und zeigen deutliche Morgenexacerbationen und Abendremissionen. Oft ist weder Schmerz noch Lichtscheu etc. vorhanden.

Die Gesamtkrankheit verläuft oft erst nach Monaten oder Jahren, das Gesicht wird nur gefährdet durch Mitleiden der Hornhaut. Die Retina ist stets unbetheiligt. Das einzelne Exsudat kann durch Resorption (abortiv) in einigen Tagen vergehen, Geschwüre erfordern zur Heilung oft eben so viele Wochen.

Ursächlich ist nicht zu läugnen, dass scrophulöse Diathese als Hauptmoment des Entstehens gelten muss. Bei ihrem Vorhandensein können leichte Verletzungen, Anstrengung beim Sehen, Exantheme, Katarrh, Dentition, Pubertät u. d. m. den Ausbruch hervorrufen.

Complicationen können das Uebel gefährlich machen; weniger Augenkatarrh, *crusta lactea* u. d., als Hornhautleiden, *Blepharoadenitis* und *Trachoma*.

Prognostisch wichtig ist, dass die äussern Bedingungen passend geregelt werden können. Dann ist die Prognose günstig. Ebenso geben Nähe des Zahnwechsels, der Pubertät, der ersten Schwangerschaft Aussicht auf baldige Besserung.

Cur: allgemeine und örtliche. Ist *Scrophulosis* das Grundübel, so muss nach den bekannten Regeln verfahren werden. Besonders Sorge man für gute Luft, gute Nahrung, gute Bekleidung, Reinlichkeit durch angemessene Bäder u. s. f. Licht ist zuträglich und darf nicht durch Schirme gedämpft werden. Kindern wasche man zwanzigmal täglich das Gesicht und lasse sie auf freien Plätzen sich beschäftigen. Man überlasse sie sich selbst, bis sie ausgeschrien haben und zu sehen anfangen. Uebrigens behandle man sie gütig, so dass sie möglichst willig und vertrauensvoll bleiben, indem sie sonst das Auge vielleicht nie zeigen. Erkältung und geistige Ueberreizung muss natürlich vermieden werden.

Oertlich hat man gegen den Reizzustand und die Pusteln, resp. Geschwüre, anzukämpfen. Um ersteren zu beseitigen, leitet man die Cur zweckmässig durch ein Purganz, ein Emeticum, vielleicht auch durch Blutegelapplication (am proc. mastoid) ein. Zugleich kann man Belladonna (Rep. 8) mit Præcipitat. alb. oder Belladonna allein in Stirn und Schläfe einreiben. Abwechselnd damit Brechweinsteinsalbe zwischen die Schulterblätter (mit Cort. Metzer. — *Artt.* [Rep. 9]), innerlich täglich 2—3 Mal $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ Gran Coniin, bei vorwaltender Säure mit Magnes. carbon. (Rep. 10 und 11.)

Gegen die Pusteln empfehlen sich adstring. Topica (Sublimat. Borax etc.), von denen bei der *Keratitis pustulosa* die Rede sein wird.

Fontanellen, Haarseile, Vesicatores etc. sind hier so wenig, wie bei andern Uebeln, denen Scrophul. zum Grunde liegt, am Platze.

Conjunctivitis blennorrhoea, Bindehautblennorrhoe.

Entzündung der Bindehautsubstanz mit entschiedener Neigung zu unverweilter Eiterbildung und serös-plastischer Infiltration. Der häufigere Sitz ist die Lidbindehaut (*Blepharoblennorrhoea*), seltner, aber auch gefährlicher wird das Leiden, wenn es gleichzeitig die *Conjunctiva bulbi* befällt (*Ophthalmoblennorrhoea*). Das Secret ist ansteckend und ätzend und durchläuft die von Einigen als Stadien oder Grade aufgeführten Momente oft sehr schnell:

1) Der Hydrorrhoe, wo ein trübwässeriges Secret mit den Thränen ausgeschieden wird,

2) Der Phlegmatorrhoe, wo das Secret aus reichlichen Schleimflocken und Eiterkörperchen besteht, und

3) Der Pyorrhoe, wo genuiner Eiter den vorwiegenden Bestandtheil des Secretes bildet, — wo die Entwicklung des Eiters aus flüssigem Blasteme unter unsern Augen an einer oberflächlichen Schleimmembran vor sich geht. (*Rokitansky, Hasner.*)

Oft lassen sich der synochale, erethische und torpide Character dieses Entzündungsprocesses deutlich nachweisen. Die erste Form verläuft sehr rasch unter Fieber, örtlichen Schmerzen von grosser Heftigkeit, Funkensehen u. d. Dabei zeigen die Lider eine rothe, feste, heisse Geschwulst, die sich auch auf die Nachbartheile im Gesichte erstreckt. Die *Chemosis* ist sehr stark, das Secret sehr reichlich. Der Verlauf der erethischen Form ist ähnlich, nur ist der Patient empfindlicher, unruhiger, die Geschwulst ist weniger bedeutend, mehr blassroth, das Secret fliesst wegen seiner dünneren Beschaffenheit schneller ab, ist aber ebenso reichlich. Langsam verläuft die torpide Entzündung, Fieber, Lichtscheu, Schmerz sind gering oder gar nicht vorhanden, die Geschwulst ist weich und wenig empfindlich, aber das Secret massenhaft oder spärlich.

Nach diesem verschiedenen Character, der übrigens durch Einwirkung äusserer Umstände wechseln kann, ist der Verlauf ein verschiedener. Die beiden ersteren Formen endigen meist acut, mit Rückgang oder Zerstörung. Die torpide verläuft fast regelmässig chronisch, ist mehr auf die Lidbindehaut beschränkt, in der sich reichliches faserstoffiges Exsudat absetzt, so dass sie nicht bloss (von einem dichten Gefässnetze) geröthet, gelockert und gewulstet erscheint, sondern auch mit wärzchenartigen Erhebungen¹⁾ besetzt ist, die oft zur Verwechselung mit *Trachoma* Veranlassung gegeben haben.

¹⁾ Arlt (l. c. p. 25) unterscheidet richtig 4 verschiedene Zustände dieses Symptomes, der Asperitudo vieler älteren Autoren, von denen er 2 als Vergrösserung normaler Elemente bezeichnet, nämlich 1) die geschwollenen Follikel (so bei Hasner's Conjunctivitis follicularis) und 2) die vergrösserten, infiltrirten Papillen des Tarsaltheils der Binde-

Nach den drei verschiedenen und sehr charakteristischen Ursachen wird von den meisten Autoren, besonders der grösseren Klarheit halber, diese Krankheit in dreifacher Weise abgehandelt, obgleich dem Wesen nach ihre Identität feststeht, und zwar als:

- A. *Ophthalmia neonatorum*,
- B. *Ophthalmia gonorrhoeica*,
- C. *Ophthalmia aegyptiaca*.

Wir halten diese Unterabtheilung nicht für unangemessen, wesshalb wir ihr folgen.

A. *Ophthalmia neonatorum*, eitrige Bindehautentzündung der Neugeborenen.

Sie tritt gewöhnlich einige Tage nach der Geburt, selten nach Wochen oder Monaten auf und erscheint sporadisch, endemisch und epidemisch. Schwächliche Kinder unter übler Pflege, viel Kinder in unreinen Räumen, in denen Puerperalkrankheiten herrschen, (Gebäranstalten und Findelhäusern) zusammengehäuft, werden gern ergriffen. Grelles Licht, plötzlicher Temperaturwechsel, Verunreinigung der Augen durch das Secret blennorrhoeischer Vaginen sind nicht ohne Einfluss als gelegentliche Reize, rufen aber keineswegs immer diese Blennorrhoe hervor. Die bei weitem häufigste Ursache der Entstehung ist die durch Ansteckung, wesshalb auch unvorsichtige Mütter und Ammen sehr oft befallen worden sind. Die Impfversuche *Piringers* gelangen um so sicherer und ausgesprochener, je purulenter das Secret war. Flüchtig wirkt das Contagium fast nur auf die zarten Augen von Säuglingen und wohl nie auf die von Erwachsenen.

Die ersten Zeichen sind kleine Krusten an den Wimpern und ein rother Längsstreifen über das wenig geschwollene Oberlid, dann wird die Geschwulst stärker, der Lidrand röthet sich, die Lidbindehaut erscheint sammtartig gelockert (durch Infiltration der Pupillen) und beim Oeffnen ergiesst sich zuerst nur ein Tropfen molkigen, mit gelblichen Flecken untermischten Secretes. Weiterhin wird das Oberlid intensiv roth, oft bläulich, gespannt, glänzend und schwillt der Art auf, dass die Oeffnung sehr erschwert ist und das Oberlid oft gänzlich über das untere herabgedrückt wird (*Oedema calidum*). Dabei stellt sich *Chemosis serosa* ein, die in üblen Fällen durch plastische Infiltration in *Chemosis phlegmonosa* übergeht. Wenn das

haut, die der in Rede stehenden Blennorrhoe angehören. Als reine Neubildung betrachtet er 3) die sehr kleinen, fast krystallhellen Bläschen, Erhebungen des Epitheliums durch serösen Erguss, bei acuten Processen schnell verlaufend, und 4) Erguss von eiweiss-, faserstoffigem Blastem in Form rundlicher Körner, theils unter das Epithelium, theils in das Parenchym der Bindehaut oder selbst in die tieferen Gebilde (Trachoma).

Secret schon jetzt blutwasserähnlich wird, so ist das Auge meist in Gefahr. Die Untersuchung ist desshalb nothwendig. Entsteht bei derselben *Ectropium*, so muss alsbald die Reposition gemacht werden. Nicht selten erfolgt auch bei der Umstülpung Einklemmung des chemotischen Wulstes, die *Desmarres* sogar sehr häufig beobachtet haben will.

Schliesslich wird das Secret rein eitrig, sehr gelb, sogar grünlich und zeigt oft Blutspuren, von der verletzten Bindehaut herrührend.

Die Hornhaut leidet durch eine parenchymatöse Folgentzündung, die selten auf die Circumferenz beschränkt bleibt, sie trübt sich und geht in Eiterung, Abscedirung, Perforation u. s. w. über, oder sie wird durch Malacie zerstört, die eine Folge des durch den Druck der *Chemosis phlegmonosa* entstandenen Compression der ernährenden Gefässe ist und mit Erweichung und Abstossung des Epitheliums und dann zuerst der oberen Hornhautschichte beginnt.

Die subjectiven Symptome hängen von dem Character ab, ebenso wird die Prognose durch die Intensität und das Stadium bestimmt. Bei acutem Verlaufe wird durch Mitaffection der Hornhaut die Gefahr für das Sehvermögen gesteigert. Enge Lidspalte, schwüle Witterung, epidemisches Auftreten, unfleissige oder unzweckmässige Behandlung sind üble Momente für den Ausgang.

Vollständige Zertheilung gelingt in den spätern Stadien nur selten, Lockerung und Infiltration hinterbleibt oft noch längere Zeit. Geht die ergriffene *Cornea* nicht gänzlich verloren, wobei die Linse ausfällt und *Phthisis bulbi* eintritt, so zeigen sie meist Trübungen, Narben, oft auch *Synechia anterior* mit Prolaps. und Verziehung der Pupille. *Pseudocornea* und nach theilweiser Erweichung *Kerectasia*, *Kerato - Iritis* und s. g. *Amblyopie* durch einen begleitenden Irritationszustand der *Retina* gehören ebenfalls zu den Folgen. — *Arlt* bemerkt (S. 37) das Eigenthümliche, dass bei diesen Hornhautgeschwüren nie eine Eitersenkung zwischen den Faserschichten der *Cornea* (*Unguis*) vorkäme.

Dr. *Mildner*¹⁾ trennt zuerst von den Bindehautentzündungen der Neugeborenen, die nur als Reflex gewisser Allgemeinleiden auf das Auge oder als Theilnahme der Bindehaut an allgemeinen catarrhalischen und croupösen Entzündungen anderer Schleimhautpartieen zu betrachten seien, diese Blennorrhoe als Localkrankheit, der er eine fehlerhafte Blutmischung zum Grunde legt, theils *Albuminosis*, krankhaftes Ueberwiegen des Eiweissstoffes, welches besonders durch das Einathmen sauerstoffarmer Luft, daher durch das Zusammenhäufen vieler Menschen in einem Locale begünstigt werde, theils *Pyämie*, die bei Neu-

¹⁾ Prager Vtljsschrift. Bd. 13. Vgl. auch *Arlt* p. 53.

geborenen häufig durch Entzündung der Nabelgefäße eingeleitet werde.

Cur: Entfernung aller möglichen Schädlichkeiten, gewissenhafteste Reinigung der Luft, des Locales, der Kleider, des ganzen Körpers, der Augen insbesondere. Letztere müssen vorsichtig ausgespritzt werden, und zwar stündlich mit milchwarmem Wasser, 3—4 stündlich mit einer Lösung von Höllenstein (5, 10, sogar 15 Gran auf die Unze Aq. dest.). Die Wasserausspritzungen müssen auch Nachts einige Male vorgenommen werden und zwar in intensiven Fällen ebenfalls stündlich. Leichte Formen heilen allerdings bei blosser regelmässigen Ausspritzen mit Wasser (*Bednar*), doch kommt man mit Arg. nitric. schneller zum Ziele. Wird wegen der Infiltration die Anwendung in Substanz nöthig, so lasse man sofort einen Strahl mit Acid. muriat. angesäuerten Wassers folgen (2 Theelöffel auf 2 Glas Wasser. *Desmarres*), wodurch sich das überschüssige Arg. nitr. in Gestalt weisslicher Flöckchen abstösst. — Innere Mittel sind höchstens symptomastisch indicirt. (Bei robusten Kindern ist ein Blutegel oft von Nutzen, *Desmarres* will die *Chemosis* scarrificiren oder selbst excidiren.) Ebenso wird man in den meisten Fällen kalte Aufschläge (*Gulx*) entbehren können. — Sobald die *Cornea* mitafficirt ist, gehe man von Arg. vitric. ab und wähle als Adstring. des Cupr. sulphur., damit nicht der Höllenstein als Hornsilber bleibende Verdunkelung in der Hornhaut zu Wege bringe.

Zur Zeit des begonnenen Rückgangs fahre man noch eine Zeitlang mit Einträufelungen von Laudanum (rein oder verdünnt) oder von Cupr. sulph. (gr. 1—2 f. unc. 1 aq. dert, vielleicht mit etwas Laudanum) fort.

B. Ophthalmia gonorrhoeica, Tripperblennorrhoe.

Die Ursache ist einzig die directe Uebertragung des Trippersecretes auf die Bindehaut. Die Lehre der Entstehung durch Metastase, zuerst von *St. Yves*, dann auch von *Beer* aufgestellt, gehört in das Gebiet der Fabel. *Ricord*¹⁾ sah niemals die Krankheit auf blosser Stopfung des Trippers folgen oder nach Beginn der Krankheit den Tripper aufhören. Ebenso wenig stichhaltig ist die andere Behauptung (*Scarpa*, *v. Walther*, *Swediaur*, *Sanson* u. A.) der Entstehung durch Sympathie der Conjunctival- und Urethralschleimhaut. *Hasner* fragt mit Recht, wesshalb die *Ophth. gonorrh.* dann nicht häufiger vorkäme?

Die Symptome sind die angegebenen, doch ist der Verlauf mit Ausgang zum Verlust des Auges meist sehr rasch und oft schon in 8—12 Stunden vollendet. Gewöhnlich ist zuerst ein

¹⁾ Ricord soll in neuester Zeit die Möglichkeit einer Trippermetastase bei rheumatischen Personen zugegeben haben (?)

Auge allein afficirt, das zweite wird durch das Secret des ersten angesteckt. Bei langsamerem Verlaufe können einige Tage Röthe, Lidgeschwulst, sammtartige Lockerung der Bindehaut und reichliche eitrige Secretion vorhergehen. Sehr heftiger Schmerz deutet in der Regel auf phlegmonöse *Chemosis*, Ulceration der Hornhaut oder eintretende Iritis (*Desmarres*), mit der Zerstörung der Hornhaut hört der Schmerz, mit der Entzündung der innern Augenhäute die Lichtscheu auf. — Das Fieber ist oft sehr heftig. Dem Secrete ist oft Blut beigemischt.

Geht die Krankheit zurück, so fällt die Geschwulst, die Röthe verringert sich, das Secret wird wässerig. — Bei üblem Ausgange bleibt wenigstens Trübung der Hornhaut zurück, es kann das Auge aber auch gänzlich zerstört werden.

Cur: Die Behandlung des Trippers wird bis zur Beseitigung des Augenleidens ausgesetzt. Energische Antiphlogose ist unvermeidlich, Aderlässe und zahlreiche Blutegel müssen, oft wiederholt, angewendet, 3 stündlich 2—4 gr. Calomel mit $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ gr. Extr. Belladon. gereicht werden, die Diät ist sehr mager, der Patient liegt still im Bett im verdunkelten Zimmer. — Die örtliche Behandlung ist wie bei *Ophthalmia neonatorum* und muss Tag und Nacht pedantisch streng durchgeführt werden. — Die Genitalkrankheit von Neuem oder stärker hervorzurufen, ist früher gerathen worden. Man darf von diesem Experimente getrost Abstand nehmen.

C. *Ophthalmia aegyptiaca*, Aegyptische Augenentzündung. (*Omodei*.)

Wir behalten diesen vielverschiedenen Namen bei, weil man und mit Recht einen concreten Begriff mit demselben verbindet. Die Contagiosität, die früher geläugnet wurde (*Assalini*, *Mackenzie*), ist ausser Zweifel gesetzt (*Pieringer*, *Cunier*, *Jäger* und die meisten Aut.). Die Ophthalmie kann unter begünstigenden Umständen spontan sich erzeugen, ist auch nach *Arlt's* Nachweise schon im 17. und 18. Jahrhundert beobachtet, entwickelte sich nach *Larrey* in bedeutender und erschreckender Weise zuerst nach der ersten Invasion der Franzosen in Aegypten, wo sie einheimisch ist, (2. Juli 1798). Fast das ganze Heer, 32000 Mann, wurde ergriffen. Durch die zurückkehrenden 13000 Mann wurde die Krankheit beim Militär und Civil fortgepflanzt und wüthete besonders in der s. g. italienischen Armee, wesshalb *Omodei* ihr den Namen *Ophthalmia aegyptiaca* beilegte. Seit die Engländer 1800 bei Abukir landeten, brach sie auch bei ihnen aus und war periodisch sehr verheerend. In dem preussischen Heere wüthete sie seit 1813, so dass bei dem Marsche nach Frankreich viele Blennorrhoeische in Münster, Mainz, Coblenz, Düsseldorf, Wesel, Aachen, Lüttich, Namur und Maastricht zurückbleiben mussten, die in die Behandlung von *v. Gräfe* sen. kamen. Nach der Schlacht

bei Waterloo grassirte sie am stärksten. Von 1813—17 sollen an 25000 Mann befallen worden sein (*Eble*). Von 1813—1821 sollen im Ganzen 30000 preussische Soldaten ergriffen und 1100 erblindet sein, doch hält *Baltz* die erstere Zahl für zu hoch, die letztere für zu niedrig angesetzt.

Es ist nicht zu läugnen, dass sehr oft epidemisch auftretender Katarrh und Trachom ebenfalls für *Ophthalmia aegyptiaca* gehalten worden sind. *Gulz* stellt desshalb auf, die *Ophthalmia aegyptiaca* sei „ein Gemisch von Krankheiten, welche in ihrem reinen Vorkommen manche Aehnlichkeit darbieten, die sich nicht nur nicht ausschliessen, sondern in bestimmten Perioden des Verlaufes sich mannichfach verbinden und dadurch eine Art Zwitterform hervorbringen können, welche über die Natur der Epidemie leicht zu unrichtigen Ansichten Anlass giebt.“

In allen wesentlichen Symptomen stimmt die *Ophthalmia aegyptiaca* mit der bereits geschilderten *Ophthalmia neonatorum* überein. Wir heben die folgenden Punkte als charakteristisch hervor. 1) Der Sitz ist die Bindehaut. 2) Infiltration und Secretion sind wesentliche Eigenschaften, doch pflegt die eine vor der andern vorzuherrschen. 3) Neben der Papillarvergrößerung setzt sich das Exsudat in graugelblichen Bläschen ab, die bald zurückgehen können (s. g. graue Granulationen). 4. Verschrumpfung der Bindehaut (wenn nicht als Folge operativer Eingriffe), oder des Knorpels, *Trichiasis*, *Entropium* und *Ectropium* gehören nicht in die Reihe der secundären Krankheiten. 5) Schwächlichkeit und dyskrasische Diathese (wie bei *Trachoma*) prädisponiren nicht, vielmehr werden robuste Individuen um so intensiver ergriffen, — Beweis, dass das Leiden als eine substantive Lokalkrankheit angesprochen werden muss. 6) Das Secret ist ansteckend und um so mehr, je purulenter es ist. 7) Die Krankheit kommt auch unter dem Civil, vorzüglich aber bei dem Militär vor. 8) Zu den begünstigenden Momenten gehören atmosphärische Beschaffenheit, Kasernenleben und Feldstrapazen, schwere Kopf- und enge Halsbekleidung, Staub, Rauch und scharfe Dünste, plötzlicher Wechsel des Lichtes und der Temperatur, die unvermeidliche Unreinlichkeit, wo viele Menschen, besonders niederen Standes in engen Räumen (Kasernen und Kasematten) längere Zeit zusammengepfercht sind. 9) Die Contagiosität kann potenzirt und sogar flüchtig werden. 10) Gewisse Personen scheinen sich einer Art von Immunität zu erfreuen, (— doch würde ihr Auge der Inoculation schwerlich Widerstand leisten.)

Die Prognose, im Allgemeinen ungünstig, hängt von dem Stadium und der Intensität der Erscheinungen ab. — Bei richtiger Diagnose und Behandlung ist sie anfänglich günstig. *Blepharoblennorrhoe* setzt das Sehvermögen nicht in Gefahr, droht aber mit Chronicität. — Phlegmonöse *Chemosis* beweist, dass die *Cornea* in grosser Gefahr ist.

Cur: Möglichste Beseitigung der begünstigenden Momente, Anwendung der Antiphlogosis von geringem bis zum höchsten Grade je nach Alter und Constitution des Patienten und der Intensität der Entzündung. Einreibung von Ung. cin. in Stirn und Schläfe, je nach dem Grade der Lichtscheu mit Opium oder Extr. Bellad. Bei torpiden Individuen zieht *Arlt* weissen Präcipitat vor (3—6 gr. auf unc. 1 Fett.), die er bei heftigen Formen auch auf die Lider streicht. — Kalte Aufschläge, besonders wenn die Hornhaut in Gefahr geräth, die *Chemosis* wird scarificirt oder besser excidirt. Das Secret muss durch laues Wasser, das vom innern nach dem äussern Winkel strömt, fleissig entfernt werden. Das beste örtliche Mittel ist Arg. nitr. (1—6 gr. auf unc. 1 aq. destill.), da es zugleich reinigt, die Secretion und die Neigung zu Wucherungen mässigt. Höllenstein in Substanz nur bedingungsweise. Plumb. acet. Cupr. u. Zinc. sulph. Alaun, Sublimat u. s. w. sind nicht so zuverlässig. — Gegen heftigen Schmerz dienen innerlich Opium, Pulv. Dower. und Chinin mit Morphinum. — (Uebr. s. *Keratitis*.)

Conjunctivitis membranacea, (Jäger, Arlt.)

Croupöse Bindehautentzündung gehört zu den grössten Seltenheiten. *Bouisson* und *Guersant* theilten extreme Fälle mit, wo sich grauliche Membranen auf der *Conj. bulbi* wiederholt bildeten und abgenommen werden konnten. Sie erscheinen wie festgewordenes Fibrin und enthielten in den Maschen der unteren Fläche Eiter. Ich beobachtete einen, wie es scheint, hierher gehörigen Fall von Bildung pseudomembranöser Platten bei einem an *Exophthalmos* und *Aneurysma cordis* leidenden Greise. Diese Platten bestanden vorwiegend aus Faserstoffschollen und bildeten sich seit Jahren alle 2—4 Wochen neu. Kurz vor dem Tode waren beide Augen xerotisch und erblindet.

Hier sei der Ort, um über die v. *Gräfe'sche Conjunctivitis diphtheritica* zu berichten, die er aus praktischen Rücksichten nicht als gesonderte Krankheitsform aufgestellt sehen will, weil sie nach seiner Auffassung besonders als Vorstadium anderer Conjunctivitiden auftritt und zu beachten ist. Sie kann aber ohne Zweifel auch derartigen Verlauf haben, um als eigenartiger Process genommen werden zu dürfen. — Gallertige Faserstoffmembranen bedecken Schleimhäute mit florider Blennorrhoe, wenn man das Lid einige Minuten der Luft durch Ectropionirung aussetzt. Sie sind dichter, elastischer und liegen fester auf, als die losen, an sich lockeren Schleimschichte und bestehen nicht wie Schleimeiter aus Convoluten junger Zellen, sondern aus amorpher, körniger Masse, die erst allmählig reinem Schleimeiter Platz macht. Bei Blennorrhoe ist die Schleimhaut selbst locker, succulent und mit flüssigem Exsudate durchtränkt, bei *Diphtheritis* resistent steif, mit starrem Exsudate durchsetzt, das Lid desshalb prall und un-

beweglich. Bei jener ist sie sehr blutreich und die Circulation insofern frei, als wenigstens in der Mehrzahl der Gefässe ungeronnenes Blut sich vorfindet, bei dieser ist sie arm an circulirendem Blute. Jene producirt ziemlich homogenen Eiter von strohgelber Farbe, bei dieser zeigt das Secret eine dünnflüssige, schmutzig-grauliche, halbdurchscheinende Grundlage, in der gelbliche Fetzen umherschwimmen; es geräth schneller in Gährung und corrodirt desshalb eher. Die Wärme ist bei *Diphtheritis* subjectiv und objectiv auffallend höher, der Schmerz stärker, die Geschwulst beträchtlicher, die Röthe indess geringer, als bei Blennorrhoe.

Der Verlauf ist, dass unter Wärme, Thränen und Schmerz das Oberlid schwillt, die Falten verstreichen, glänzende Röthe des unbeweglichen Lides, weitmaschige *Chemosis* und Steifheit des Oberlides sich einstellt. Dabei ist die *Conjunctiva* glatt und wenig geröthet, mehr gelblich und zwar zufolge eines dichten Faserstoffexsudates, welches die *Conjunctiva* durchsetzt, die Circulation derselben beinahe vollständig aufhebt und mit der Zerstörung der Membran und des ganzen Auges droht. Dies Exsudat ist nicht abzuziehen, da es in dem Schleimhautparenchym sitzt, das gefässarm und von kleinen apoplectischen Heerden punctirt ist. Auch die Meibom'schen Drüsen werden vermisst. Das grauliche Secret besteht aus reichlichen Thränen mit Epithelialdetritus, zersetztem Blutfarbstoff und gelblichen Faserstoffcoagulis. — Allmählig ändert sich der Zustand in einen entgegengesetzten, die Steifheit hört auf, die *Conjunctivitis* erhält ein schwammiges Ansehen, die diphtherit. Membran stösst sich bis auf einzelne inselförmige, weisse Plaques ab, die blossgelegten Gefässe bluten leicht und viel. Statt der s. g. Granulationen entstehen einzelne, grössere Knöpfe auf resistenter Basis, die spät erweichen und mit der gleichzeitigen Entstehung einer weichwulstigen *Chemosis* den Beginn des zweiten Stadiums bezeichnen, des blennorrhoeischen, das sich nur durch seinen baldigen Uebergang in das dritte Stadium, das der Schrumpfung, von chron. Blennorrhoe unterscheiden lässt. — Die Dauer des ersten Stadiums ist oft kurz, so dass sie leicht übersehen wird, kann aber bis 10 Tage dauern, was eben von der mehrweniger reichlichen Faserstoffdurchsetzung der Schleimhaut abhängig ist. Das zweite Stadium kann als heftige Blennorrhoe oder als nur mässige Succulenz der Schleimhaut auftreten, das dritte Stadium bei tiefer und massenhafter Durchsetzung bis zur Verkümmern der *Conjunctiva* führen, nachdem „täglich mehrere Male Faserstoffschwarten von $\frac{3}{4}$ “ Dicke zusammenhängend aus dem ganzen Bereich der *Conjunctiva* hinweggezogen worden waren, so dass sie einen treuen Abdruck der Membran, in der Mitte mit einem runden Hornhautfenster, lieferten.“ — Die Gefahr entsteht durch die concomitirende Cornealaffection, die als leichte exsudative Trübung beginnt, sehr bald

zu Epithelialzerstörung und tieferem Substanzverluste führt, der deshalb leicht übersehen wird, weil der Geschwürsgrund sich stetig in das Hornhautniveau zu heben pflegt. Perforationen schliessen sich bei der hohen Plasticität des abgesetzten Exsudates meist schnell wieder.

Ursache und Wesen betreffend gilt, das die *Conjunctivitis diphtherit.* sowohl contagiös, als stets Allgemeinkrankheit ist, letzteres im Gegensatz zur Blennorrhoe, die stets örtlich verläuft. Sie erscheint fast nur an durch Krankheit prädisponirten Individuen (Croup, Pneumonie, Hydrocephalus, Syphil. congen. etc.) und unter Fieber, Hitze, Appetitlosigkeit u. d. m. — Dabei tritt sie epidemisch auf, besonders im Frühjahr und Herbst, gesellt sich auch gern zu anderen Epidemien (*Diphth.* der Respirationsorgane, Puerperalkrankheiten etc.) und ist bei *Neonatis* wegen der ungeeigneten Blutmischung seltner, häufig von $2\frac{1}{2}$ —4 Jahre, später wieder seltner. — Die Contagiosität ist auf der Höhe im diphtheritischen Stadium, wo sie bei einiger Prädisposition nach Inoculation sich wieder erzeugt, während später Mischformen oder nur genuine Blennorrhoe erfolgen, indem das specifische Contagium, wie auch sonst, nur als einfacher Reiz sich verhält.

Die Prognose ist gegen andere Ophthalmieen eine auffallend üble, zumal bei der Schwerzugänglichkeit der *Conjunctiva*, dem oft rapiden Verlaufe des deletärsten ersten Stadiums und in so höherem Grade, je massenhafter die Einlagerung in's Parenchym gewesen war. Blosser Auflagerung ist unerheblicher. Je steifer das Lid, je gelber, glatter, trockner die Oberfläche der *Conjunctiva* ist, je plötzlicher und zahlreicher die *Ecchymosen*, als Gradmesser der Stagnation, auftreten, je rapider der Verlauf im ersten Stadium, um so übler ist die Prognose. Tritt Succulenz bald ein, so schwindet die Einlagerung eher; dasselbe gilt von dem Trockenwerden der *Chemosis*. Für die *Cornea* ist um so grössere Gefahr, je früher dieselbe afficirt war, also im ersten Stadium. Im zweiten und zumal im dritten ist sie unbedeutend. Im Beginn von Epidemien und nach Uebertragung entstanden, pflegt der Verlauf ungünstiger zu sein.

Caustische Behandlung ist bei Blennorrhoe unzweifelhaft die beste, richtig angewendet von den glücklichsten Erfolgen und keineswegs gefährlich, wie noch vielfach behauptet wird. Sie kann es nur durch zweckwidrige Anwendungsart, ohne Beachtung methodischer Wiederholung und bei diagnostischen Irrthümern werden. Das Causticum muss in einer dem Grade der Injection und Schwellung proportionalen Energie applicirt werden, um nicht bloss Reizung, sondern Remission der inflammatorischen Symptome zu bewirken, also lapis cum nitro in Substanz (1: 1 oder 1: 2, 3) oder gr. 10 in unc. 1 aq. dest. Das Auge wird hernach mit Wasser ausgewaschen. Nach

der Aetzung mit lapis wird zuerst mit dünner Salzlösung ausgespült, um Lapisreste als weisse, käsige Flocken, aus Chlorsilber bestehend, entfernen zu können, dann mit Wasser. Bei der Aetzung Sorge man, nach dem Grade der Affection intensiver oder schwächer einzuwirken und die Uebergangsfalten nicht zu vernachlässigen. Um die durch Blut intumescirte Schleimhaut zu senken, entleere man das Blut bald nach der Aetzung durch leichte Scarrificationen, durch die auch der Schmerz gemässigt wird. Oedematöse Chemosis excidire man nicht, sondern incidire sie radial, um nachtheiliger Narbenwirkung vorzubeugen. Kalte Ueberschläge sind unentbehrlich, um die Reaction herabzusetzen, dürfen aber nicht zu lange angewendet werden, weil sie dann den Entzündungszustand verschleppen. „Wenn die der Aetzung folgende Reaction gesunken, bei Besichtigung der Schleimhaut die letzten Eschara oder das mit derselben gleichbedeutende Exsudat abgestossen, das weissliche, der Aetzung folgende Secret auf ein Minimum reducirt und möglicher Collapsus eingetreten, aber noch kein Vorbote blennorrhöischer Recrudescenz (dünnes Secret, erneuertes Unvermögen, die Lider zu öffnen, mehr Geschwulst und Wärme) vorhanden ist, — dann darf die Aetzung wiederholt werden.“ Meist täglich einmal, selten zweimal, auch wohl nur jeden zweiten oder dritten Tag.

Consecutive Hornhautaffection, selbst Perforation verbieten das Causticum nicht; es ist um so dringender vielmehr erforderlich, muss aber auch mit um so grösserer Vorsicht und mit recht vollständiger Neutralisation angewendet werden. Um den Spannungsgrad bei drohender Perforation zu verringern, erweist sich die Instillation einer Atropinesolution dienlich, weil auch auf die Augenmuskeln, nicht bloss auf die Iris, gewirkt wird. Ebenso kann die Paracentase ein oder mehrere Male zur Druckverringering ausgeführt werden.

Im Gegensatz zur Blennorrhoe verbietet genuine Diphtheritis das Causticum durchaus, weil es bei derselben nicht bloss keine Remission und rasche Entleerung seröser Flüssigkeit bewirkt, sondern zur Congestion von Blut führt, das alsbald an der diphtheritischen Stase participirt, d. h. im Parenchym selbst und als membranöse Faserstoffauflagerung sich absetzt. Hier sind Kälte und besonders tiefgehende Scarrificationen am Platze, auf die man, um möglichst viel Blut zu entleeren und den Wiedereintritt stärkerer Circulation zu befördern, laue Schwämmchen mit gelinde reibendem Drucke applicirt. Zu dem Causticum greife man nur bei Mischformen, oder wo das zweite Stadium, also das blennorrhöische, bereits sich einstellt; sonst verschiebe man dessen Anwendung, zumal vom 2—4 Lebensjahre. Neugeborene ertragen das Causticum besser, weil ihr Blut zu Faserstoffausschwitzungen weniger geeignet ist. — Ist die Einlagerung derartig massenhaft, dass Incisionen zur Blut-

entleerung nicht hinreichen und nur die locale Entzündung steigern würden, so muss durch nacheinander applicirte Blutegel eine continuirliche Blutströmung unterhalten werden. Die kalten Aufschläge sind besonders bei floridem Verlaufe sehr häufig zu erneuen, die Reinigung, am besten mit lauwarmer Milch, möglichst oft zu wiederholen.

Die Allgemeinbehandlung ist gegen das Grundübel zu richten, ausserdem Calomel, zweistündlich 1 gr., Kindern $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ gr. Tag und Nacht oder Einreibung grauer Salbe, um die Schmelzung des faserstoffigen Exsudates und den Uebergang in das zweite Stadium zu befördern. — Dazu angemessene Diät und bei Integrität des einen Auges hermetischer Schutzverband desselben durch leichte Charpiepolster, die mit Bleiweisspflaster und Collodium gegen die Luft abgeschlossen werden.

Chemosis, Oedem der Bindehaut.

1) Chemosis serosa, Erguss seröser Flüssigkeit in die Bindehaut und das subconjunctivale Zellgewebe, zeigt sich als gelbliche, elastische, durchsichtige, mehr oder weniger bedeutende, kalte, unschmerzhaftige Geschwulst, die häufiger acut als chronisch verläuft und sich meist als ein ringförmiger Wulst um die Cornea legt, so dass dieselbe vertieft und kleiner als normal erscheint, ohne dass das Sehvermögen wesentlich beeinträchtigt wird. Die Conjunctivagefässe verlaufen auf der Höhe der Geschwulst. Die Lider sind meist gleichzeitig ödematös. — Idiopathisch kommt die *Chemosis* nicht vor, sie begleitet entweder Allgemeinkrankheiten, (*Hydrops Anasarca* u. d.) oder Augenleiden verschiedener Art (Entzündungen, Eiterungen u. d.). Hohes Alter, in dem die Gewebe schlaffer sind, prädisponirt.

Die Prognose richtet sich nach dem Grundleiden, dessen Symptom die *Chemosis* ist.

Die Cur ist gegen das Grundleiden gerichtet. Das Infiltrat kann man durch Scarrificationen oder Excisionen und nachfolgenden leisen Druck auf das Lid entfernen. Augewässer und Salben sind nie am Platze. Man decke das Auge mit einfach gewärmten, trocknen Tüchern.

2) Chemosis phlegmonosa, phlegmonöse Entzündung der Bindehaut und des subconjunctivalen Zellgewebes, zeigt sich als dunkelrothe, harte, festaufsitzende, empfindliche Geschwulst, die $1\frac{1}{2}$ —2'' breit und verschieden hoch wie ein Wall die Cornea umgibt und dieselbe in grosse Gefahr bringt. Lichtscheu und Schmerz sind meist bedeutend. Beim Einschnitt entleert sich wenig röthliches Serum. — Sie kommt als Symptom bei intensiver *Conjunctivitis blennorrh.* etc., *Keratitis, Iritis, Panophthalmitis* vor und führt leicht zur Erweichung der Hornhaut und zum Brande. — Directe Heilungsversuche bleiben ohne Erfolg.

Xerosis conjunctivae, Dürrsucht der Bindehaut.

Partielle oder totale Atrophie, Vertrocknung und Verhornung der Bindehaut, ein Krankheitszustand, der noch nicht hinreichend in seiner Entstehung und seinem Wesen bekannt ist, folgt auf verschiedene Processe, besonders auf *Trachoma*, meist mit Degeneration der Thränenorgane gleichzeitig. Das Epithel wird nicht abgestossen, weggespült und erneuert, sondern vertrocknet, verliert Glanz und Glätte, wird endlich rauh, der *Cutis* ähnlich (*Cutisation*, *Duprez*) und fast unempfindlich. Es stösst sich das degenerirte Gewebe in Schuppen ab, wie bei *Exophthalmus*, *Conj. membranacea*, *Staphyloma*, der Papillarkörper und Follikelapparat werden atrophisch und mit der weiteren Schrumpfung der Bindehaut entsteht Hasenauge und totales *Symblepharon*. Werden die Thränen noch secernirt, so fliessen sie über, ohne das degenerirte Gewebe dauernd feucht zu erhalten. Da das Leiden sich immer auch über die *Cornea* erstreckt, so erblindet der Patient mehr oder weniger. *Desmarres* berichtet, dass eine Dame etwas besser mit dem xerotischen Auge gesehen habe, wenn sie es mit Speichel befeuchtet. *Wernher* fand die abgeschabte *Cornea* aus normalem Pflasterepithelium und die Scleralbindehaut aus Bindegewebsfasern mit starken Epithelialschichten bestehend. *Mackenzie* sucht die Ursache in chronischer Entzündung, noch weniger richtig suchten sie *Guerin*, *O'Beirn* u. A. im Verluste der Thränensecretion.

Die Prognose ist sehr übel. Es sind keine geheilten Fälle bekannt. Abschaben nützt höchstens für einige Stunden (*Wernher*), Kochsalzlösungen, ölige Einträufelungen u. d. verfingen Nichts, Cauterisation und Excision der Bindehaut wurden ohne Nutzen verrichtet. *Gräfe* jun. empfiehlt vorzugsweise Milch.

Pterygium, Flügelfell.

Ein unschmerzhaftes, aus Bindegewebsfalten und organisirtem Exsudat bestehendes Gebilde der *Conj. bulbi* von der Gestalt eines Dreiecks, dessen Basis der Uebergangsfalte und dessen Spitze dem Centrum der Hornhaut zugewandt ist. *Desmarres* sagte noch 1847, die Ursachen desselben seien so gut wie unbekannt, nachdem *Arlt* schon zwei Jahre früher¹⁾ richtig dargethan, dass es als eine Herbeiziehung oder Heranzerrung der Bindehaut auf die *Cornea* zu betrachten sei. Seine Entstehung setzt zunächst seichte Geschwürchen auf dem Rande der *Cornea* und Herbeiziehung des *Limbus conj.* zur Vernarbung, weiterhin eine gesteigerte Nachgiebigkeit der Bindehaut (Erschlaffung), anhaltende und doch nie über einen gewissen Grad gesteigerte

¹⁾ Anm. d. Prager Vtljsschrift. 1845. 8. Bd. S. 73.

Reizung derselben und dadurch bedingte Durchtränkung der Bindehaut mit Exsudat, Verdrängung ihres Gewebes und endliche Schrumpfung der also erkrankten Partie voraus. Anfänglich sitzt es immer in der Bindehaut, weiter entwickelt in der Zellgewebskapsel und sogar auf der Scheide der *musc. rect.*, deren Thätigkeit die Entstehung begünstigt. Wenigstens entspricht fast regelmässig der Sitz der Richtung eines geraden Augenmuskels. *Hasner*¹⁾ erklärt den Sitz in dem horizontalen Durchmesser daraus, dass Erweichung und Verschwärung der Bindehaut am häufigsten an derjenigen Stelle vorkommen, welche in der Augenlidspalte liegt. Das häufigste Vorkommen ist im innern, danach im äussern Winkel, weil diese Partien äusseren Schädlichkeiten zumeist ausgesetzt sind, oben und unten ist es seltener. Man hat membranöse, vasculäre, carnöse und fettige unterschieden (*Cunier, Pétrequin*), *Desmarres* streicht das vasculäre, deutsche Autoren nehmen nur ein *tenue* und *crassum* s. *carnosum* an, Unterschiede, die nur den verschiedenen Grad der Entwicklung und den verschiedenen Reichthum an Gefässen und Exsudat bezeichnen. Anfänglich ist es ungefärbt und erscheint nur durch die Faltung dunkler, später wird es roth, dick und breitet sich über die Hornhaut in dem Grade aus, dass es das Sehevermögen wesentlich beeinträchtigen kann. Bei genauer Betrachtung und bei Bewegungen des Bulbus erkennt man unschwer, dass es nach den Gesetzen des Faltenwurfes entstanden ist; Modificationen der Form finden ihre Erklärung in der Beschaffenheit und Adhaerenz der Bindehaut, äusseren Reizen u. d. m. Entzündung ist nicht, wie *Arll* anzunehmen scheint, bei der Entstehung thätig, wohl aber Narbenwirkung, welche die benachbarte *Conjunct.* zusammenfaltet und in der nun Exsudation, Organisation desselben und beim Fortgange auch weitere entzündliche Processe stattfinden.

Das Uebel kommt besonders bei Personen vor, deren Arbeit zu mechanischen und chemischen Reizungen der *Conj.* Anlass gibt. Entfernt man diese Reize, so geht das Flügelfell oft ohne anderweitige Mittel zurück.

Cur: Man wird in den meisten Fällen zur Operation seine Zuflucht nehmen müssen. Einfache oder frisch entstandene gehen durch Fernhalten der veranlassenden Reize oft zurück, man kann die Rückbildung durch wiederholtes Ueberpinseln mit Laud. liquid. Sydenh. oder durch Anwendung von Arg. nitr. oder Cupr. sulph. in Substanz oder Lösung, von weissem und rothem Präcipitat wirksam unterstützen. — Innerliche Curen gegen abdominelle Complication, wie vielfach gerathen ist, kann man, so lange man es nur mit dem Flügelfelle zu thun hat, dem Patienten getrost ersparen.

¹⁾ 1. c. S. 76.

Pinguecula, Fettfleck.

Rundliche oder dreieckige Wucherung, höchstens linsengross und von gelblicher Farbe, meist nach Aussen von der Cornea in die Bindehaut eingelagert, besonders bei älteren Individuen oft vorkommend, erregt keinerlei Unbequemlichkeit und wird selten von den Patienten selbst wahrgenommen. Der Inhalt ist nicht Fett, sondern besteht nach *Weller's* Untersuchung aus Eiweissstoff und Gallerte. —

Verlangt Jemand aus Eitelkeit die Exstirpation, so kann man ihm den Gefallen erzeugen.

Laesiones Conjunctivae, Verletzungen der Bindehaut durch fremde Körper, die entweder zurückgeblieben sind und entfernt werden müssen, oder nur auf mechanische oder chemische Weise gereizt haben. Staub, Sand, Steinchen, Glas-, Kohlen-, Stroh-, Holzsplitter u. d. müssen aufgesucht und weggenommen werden. Dasselbe gilt von Insecten oder Insectentheilen, wobei zu bemerken ist, dass oft, wenn das Thier auch nur Momente im Auge verweilt hat, doch Eier zurückgelassen worden sind. Die sich entwickelnden Würmer entfernt man am besten durch Oeleinträufeln. Kann man viele kleine Partikel mit dem Daviel'schen Löffel, spitz gefaltetem Papier u. d. nicht wohl entfernen, so hilft oft ein kräftiger Wasserstrahl, von einem Winkel her eingespritzt. Aetzende Substanzen, Pfeffer, Salz, Asche, Pulver, Kalk, Höllenstein u. d. wird nicht gern mit Wasser, welches z. B. Kalk und Aehnliches auflöst, weggespritzt, lieber mit Oel, Milch u. d., welche die Substanzen einhüllen und dadurch weniger schädlich machen. — Das Nähere über die Entfernung wird in der Operationslehre besprochen.

Lidkrampf und Lichtscheu müssen oft vor der Operation durch Wirkung der Kälte oder narkotische Bähungen beseitigt werden. Haften fr. K. sehr fest, so stösst sie meist die Eiterung los. Oft verweilen sie so lange, dass *Conj. simplex* folgt, die aber nach gelungener Entfernung bei antiphlogistischer Behandlung bald wieder weicht.

Genaue Untersuchung ist immer nothwendig, da die Theile sich oft tief hinter der halbmondförmigen und in der Uebergangsfalte verstecken und wochenlange Entzündung und grosse Gefahr für das Auge herbeiführen können, bis der Zufall sie entfernt oder ein geübtes Auge sie auffindet.

Eingespritzte Mineralsäuren und geschmolzene Metalle erfordern deshalb die aufmerksamste Behandlung, weil sie gern *Symblepharon* und *Ankyloblepharon* bewirken. Antiphlog. Mittel und ölige Einträufelungen genügen selten. Selbst künstliches *Ectropium*, durch Pflasterstreifen und Collodium bewirkt, verhindern die Verwachsung nicht immer, so dass oft die Operation schliesslich nothwendig wird.

Leichte Schnitt- und Risswunden der *Conjunctiva* heilen bald bei einfacher Schonung und Bedeckung des Auges.

Haemorrhagia Conj., Bluterguss unter die Bindehaut,

vorzüglich des Bulbus, ist ein häufig vorkommender Zustand und scheint bedenklicher, als er ist. Der Erguss liegt meist zwischen Sclera und Bindehaut, ist scharf begränzt und hört an der Hornhaut wie abgeschnitten auf. Besteht das Uebel für sich, so stört es weder die Sehkraft noch droht es mit Gefahr. Nach den Ursachen unterscheidet man füglich:

1) Haemorrh. Conj. mechanica, die durch Fall, Stoss u. d., direct auf das Auge und in die Umgebung zu Stande kommt, indem ein kleineres Gefäss zerreisst und Blut unter die Bindehaut austritt. Derselbe Zustand kann durch allgemeine Körperanstrengungen, bei denen das Blut gewaltsam nach dem Kopfe gedrängt wird, erzeugt werden, so durch heftigen Hustenparoxysmus, beschwerliches Erbrechen, durch den Gebäract, Heben schwerer Lasten, starkes Drängen beim Stuhlgang u. d. Meist ist der Erguss auf den tiefer gelegenen Theil beschränkt, kann aber auch, wo die Bindehaut aus Alter nur locker aufliegt und wo ein dissoluter Zustand des Blutes vorhanden ist, sich über die ganze Sclera verbreiten, so dass er sich am Tarsaltheile der Bindehaut abgränzt und wie ein chemotischer Wulst die Cornea umgibt. Bei Schädelfracturen kommt diese *Ecchymosis* mit der Lider gern vor.

2) Haemorrh. Conj. spontanea tritt ohne äussere Veranlassung bei älteren Individuen auf, deren Blut durch *Arthritis*, *Scorbut* zur Dissolution hinneigt oder die an heftigem Blutandrang nach dem Kopfe leiden, in welchem Falle der Erguss als Vorläufer von *Haemorrh. cerebri* nicht ohne Bedenklichkeit ist und zur Regulirung der Lebensweise Anlass sein muss.

So lange der Erguss währt, nützt Kälte und Ruhe. Die Resorption, die sich nach 2—4 Wochen einstellt und die man am Schmutzigwerden der Ränder erkennt, kann man getrost der Natur überlassen und nur, wo es verlangt wird, durch Fomentationen mit herbem Rothwein oder Inf. Arnicae unterstützen. Bedeutende Quantitäten entleert man durch einen Einstich.

Neoplasmata Conjunctivae, Neubildungen der Bindehaut,

haben ihren Sitz entweder in der Bindehaut oder in dem unterliegenden Zellgewebe. Hieher gehören

1) Die einfache seröse Cyste (*Arlt*), die in Folge von Stössen auf den Bulbus, aber selten, eintritt¹⁾ und einfach aus ihrer Lage zwischen Bindehaut und Sclera loszuschälen ist.

¹⁾ Arlt. l. c. p. 169.

2) Fasergeschwülste (*Wardrop, Gräfe*), verschieden an Form, Grösse, Farbe und Consistenz, sitzen fest auf, so dass sie nicht verschiebbar sind und sind meist angeboren.

3) Schleimpolyp (*Hasner*), gestielt oder mit breiter Basis, wuchernd von der halbmondförmigen Falte ausgehend, aus zellig fächrigem Gewebe, collabirt nach Entleerung des Blutes und zeigt sich dann bloss aus Bindegewebe und zahlreichen Gefässen zusammengesetzt.

4) Fettgeschwulst, nicht zu verwechseln mit Fettfleck, (*Himly*) ist beweglich, weich, oft mit Haaren bewachsen und erscheint angeboren und acquirirt.

5) Markschwamm der Bindehaut (*Chelius*) erscheint meist zuerst an der Uebergangsfalte und haftet bald fest an der Sclera. Im Jahre 1852 beobachtete ich diese Form in der Klinik des Herrn Geheimrath *Wutzer*. Schwarzblaue, fest-sitzende, maulbeerartige, flache Geschwülste drängten sich aus der Uebergangsfalte und sassen bis nahe am Cornealrande auf; sie waren wiederholt vergeblich exstirpirt, wesshalb der ungeduldige Patient, obwohl er mit dem Auge noch fast normal gut sah, die Exstirpation verlangte. Wenige Wochen nach derselben zeigte sich Infiltration der Halsdrüsen u. s. w.

6) Warzen, analog den Warzen der *Cutis*. *Arlt* exstirpirte eine solche von der Sclera und Cornea, die angeboren war, aus *Epidermis, Corium* und *Panniculus adiposus* bestand und zahlreich mit Haaren besetzt war.

7) Steinartige Concremente, die besonders aus den Thränen niedergeschlagen zu werden scheinen, sind von *Lachmund, Emery, Ph. v. Walther* u. A. beobachtet worden.

8) Lebende Thiere, die auf der *Conj.* vorkommen, sind:

a. Läuse, die sich bei vernachlässigten Schwerkranken oft so festsetzen, dass sie exstirpirt werden müssen, sodann Fliegenlarven, deren Eier in kranke Lider gelegt und die dort ausgekrochen waren,

b. Entozoen und zwar *Filaria medinensis*, Fadenwurm, den *Lallemant* an einem Neger beobachtete und glücklich extrahirte (*Larrey*) und *Cysticercus cellulos.*, Finnenwurm, in erbsengrosser, durchsichtiger, verschiebbarer Blase, über der die *Conj.* nur geringe entzündliche Reizung zeigte. (*Arlt, Baum, Sichel.*)

III.

Hornhaut und Kammersystem.**Keratitis pustulosa, Pustularophthalmie,**

wegen ihres Vorkommens bei scrophul. Individuen auch *Kerat. scrophul.* genannt, verläuft entweder für sich oder gleichzeitig mit der *Conjunctivitis lymphatica*. Die Entstehung der Bläschen ist ziemlich dieselbe wie dort. Unter bald stärkeren, bald geringeren Erscheinungen von Lichtscheu, Thränenfluss und Conjunctivalinjection zeigt sich eine geröthete Partie in der Cornea, deren Gefässe mit denen der Conjunctivitis communiciren und in der sich nach einigen Tagen ein Bläschen von schmutzig grauer Farbe, hirsekorngross entwickelt, über der das Epithelium aufgelockert erscheint. Entstehen mehrere gleichzeitig, so bilden sie keine deutlichen Bläschen, sondern nur punktförmige, auch wohl ineinanderfliessende Exsudate und weisen auf die Verwandtschaft dieses Uebels mit dem scrophul. Pannus hin. Von dem Grade ist die Gefässentwicklung in der Scleralbindehaut abhängig, die oft wie ein rother Kranz um die Hornhaut herum injicirt ist. Ist nur ein Bläschen vorhanden, so wird es wohl hanfkorngross durch Absetzung einer grösseren Quantität plastischen Exsudates, welches zuerst klar erscheint, später trüb und dicklich wird und je nach seiner seichterem oder tieferen Einbettung früher oder später durchbricht. War nur das Epithel zu durchbrechen, so entsteht ein reines, oberflächliches Geschwür mit Neigung zu baldiger und vollständiger Heilung. Lag das Exsudat aber tiefer, so entsteht ein schmutzig graues Geschwürchen, in dessen speckähnlichem Rande und Grunde mit der Loupe feine Gefässverästelung wahrzunehmen ist. Bei günstigem Verlaufe können diese Geschwüre gut heilen; war es aber nicht bloss zur Verdrängung, sondern auch zur Zerstörung von Hornhautfasern gekommen, so gelingt die Heilung nur unter Bildung von Narbengewebe, die eine unvergängliche Trübung bedingen. Verharren die Geschwüre längere Zeit im Zustande der Eitersecretion, so greifen sie nicht bloss weiter in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Die Folgen sind dann partielle Erweichung und Hervortreibung durch das Kammerwasser (*Keratoconus*) oder Perforation und deren Ergebnisse: Abfluss des Kammerwassers, Irisvorfall u. s. w. *Hasner* will mit *Seydel* und *Kanka* diese Pustularophthalmie mit *Blepharadenitis* abwechseln gesehen haben, der Art, dass mit der Abnahme des einen Uebels das andere sich steigerte.

Die subjectiven Symptome sind von dem Grade des Erethismus abhängig. Der Lidkrampf wird von *Hasner* als gün-

stige Erscheinung bezeichnet, da er die Patienten zur Schliessung des Auges zwingt, wodurch der nachtheilige atmosphärische Einfluss beschränkt werde. Richtig ist es jedenfalls, dass bei torpidem Verlaufe das Exsudat oft nicht so reizt, dass es die vordere Wand durchbricht. Dann verkalkt es und bleibt als Trübung liegen, deren Beseitigung oft erst nach Jahren gelingt oder, abhängig von der mehr weniger günstigen Körperentwicklung, noch später von selbst sich einstellt. Der Eintritt der zweiten Zähne, der Pubertät, Schwangerschaft begünstigen die Rückbildung.

Die Prognose ist von der Intensität und dem Stadium abhängig.

Cur: Allgemein und örtlich. Gegen die Scrophulose die bekannten Mittel (siehe Conj. lymphat.), aber mit steter Beachtung des Reizzustandes. Bei vollsaftigen Individuen und hochgradiger Entzündung ist das antiphlogistische Regime am Platze, von der man aber Abstand nehme, sobald es möglich ist, da leicht Schwächezustände eintreten können, welche die Resorption beeinträchtigen. Einige Gran Calomel, bei starker Reizung, mit $\frac{1}{10}$ gr. Coniin pro dosi, ebenso umgekehrt Rorborantia (Chinin, Ferr. carbon,) bei cachectischen Individuen und Aloe, Myrrha u. d. bei Amenorrhoe gewähren classische Hülfe. — Narcotica in der Umgebung des Auges mässigen die Lichtscheu u. s. w., das Auge muss geschützt werden, doch darf man Licht und Luft nicht absolut abhalten. Ableitungen auf die Haut sind nicht anzurathen. Dem Platzen der Bläschen ist es vergeblich entgegenzuwirken, die Heilung der Geschwüre kann man nach Beseitigung der Reizung durch Sublimat (gr. $\frac{1}{8}$ auf unc. 1 aq. dest.) oder Borax befördern. Die Resorption torpider Exsudate wird durch sol. Arg. nitric. (gr. 1—2 auf unc. 2 aq. dest.) und Bepinselung mit Tinct. Opii angeregt. — Das Einstreuen von Calomelpulver kann nicht wohl gebilligt werden, es sei denn ein hoher Grad von Torpor zu bekämpfen.

Keratitis pannosa, Pannus, Augenfell,

eine durch Entzündung bedingte, mehr weniger plastische Exsudation unter das Epithelium der Hornhaut. Sie entsteht partiell oder total je nach den ursächlichen Momenten und verläuft acut, in welchem Falle die Gefässausbildung und Injection, oder chronisch, wo dann die Ausschwitzung vorwiegt. Die Gefässe, die bald deutlich sichtbar werden, sind theils die normalen *Vasa serosa*, deren Lumen unter dem heftigen Blutandrang sich erweitert und auch für die Blutkörperchen durchgängig wird (?), theils bei dem Zustandekommen der Entzündung sich neu entwickelnde. Oft sind sie so zahlreich vorhanden und enthalten so viel stagnirendes Blut, dass die Cornea von einem scharlachrothen Tuche überzogen zu sein scheint, woher der Name *Pannus*. Nach dem

äussern Ansehen und dem Injections- und Infiltrationsgrade hat man unpassend einen *P. tenuis*, *P. vasculosus*, *P. crassus* s. *carnosus* u. s. w. unterschieden. Lehrreicher würde man die Unterarten nach den Ursachen trennen und von einem *Pannus scrophulosus*, *P. trachomatosus*, *P. menostaticus*, *P. traumaticus* u. s. f. sprechen. Ist das Exsudat mehr serös, so ist das Epithelium bald gelockert, gewulstet und etwas getrübt, so dass es wie ein angehauchtes Uhrglas erscheint und das Sehvermögen nur wenig beschränkt. Ist es aber plastischer Natur, so ist das Epithelium verdickt, schmutzig gelb oder grau und verhindert oft sehr bald alles deutliche Sehen. Die Gefässentwicklung pflegt bedeutender zu sein, je geringer die Exsudation ist und umgekehrt. Je nach dem Grade und den Ursachen participirt die Conj. sclerae, deren Gefässe leichtwahrnehmbar in die pannöse Hornhaut übergehen. Liegen viel varicöse Gefässe durch die noch ziemlich durchsichtige Hornhaut, so erscheinen dem Patienten alle Gegenstände wie mit einem rothen Schleier bedeckt. Dabei klagt er über das Gefühl eines fremden Körpers im Auge. Bei acutem Auftreten sind die Reflexsymptome (Lichtscheu, Lidkrampf, Thränenfliessen u. s. w.) oft sehr erheblich, bei torpidem fehlen sie oft gänzlich. Bei partiellem Pannus ist das Sehevermögen natürlich nur nach Massgabe der Ausbreitung beschränkt.

Auf die Ursachen wurde bereits hingewiesen. Von deren zeitweiliger oder hartnäckiger Einwirkung hängt die Prognose ab. Oft kommen Fortpflanzungen chronischer Bindehautentzündung auf die Cornea vor, wo sie sich dann als *Pannus* manifestiren. Ist *Trachom* Ursache, so scheint dyscrasischer und mechanischer Grund zur Entstehung gleichzeitig zu wirken. Ganz gewiss hat sehr oft verkehrte Behandlung des entstehenden Uebels dasselbe verschlimmert.

Die Rückbildung kommt meist nur langsam zu Stande, weil die Gefässe dilatirt sind und bei geringer Entzündlichkeit am Auge wieder Blut führen, und weil die Resorption in der Hornhaut stets eine langsame ist und gern stille steht. Frische Fälle sind günstiger, als lange bestehende, nach welchen letzteren vollständige Heilung wohl kaum jemals gelungen ist. Ist die Ursache eine rein mechanische, z. B. *Entropium* oder *Trichiasis*, so schwindet fast stets mit der Beseitigung dieser Uebel die Folgekrankheit, der *Pannus*. Bei dyskrasischer Grundlage (*Syphilis* wird mit Unrecht beschuldigt) treten aber oberflächliche und tiefere Verschwärung, Erweichung und Abstossung auf, zugleich häuft sich das Kammerwasser an und treibt die erweichte Hornhaut vor (*Kerectasia*), bei gänzlicher Vernachlässigung kann Perforation, Verlust der Linse und Atrophie folgen.

Cur: Sie muss stets gegen das Grundleiden und die Localkrankheit zugleich gerichtet sein. Beseitigung von *Trichiasis*,

Entropium, *Trachoma* u. d. hebt oft frischen *Pannus* ohne directe Mittel. Heftige Entzündung wird durch Blutegel, Purganzen (Calomel) u. s. f. bekämpft. Die Lichtscheu und die übrigen Reflexsymptome werden durch narkotische Salben in der Umgebung des Auges bekämpft. Mucilaginöse Bähungen sind oft gleichzeitig von Nutzen. Gegen Lockerung des Gewebes werden die bekannten Adstringentia und die Tinct. Opii angewendet. Als Cardinalmittel zur Resorption ist das Arg. nitric. bewährt, in Salbenform (gr. 2 auf unc. 2 Salbe) täglich einmal mit einem Pinsel eingestrichen. *Guthrie* setzte noch gr. 2 Plumb. acet. hinzu. Bei der scrophulösen Form ist sein Effect oft ein überraschend erfreulicher. Es ist jedenfalls dem Sublimat, dem rothen und weissen Präcipitat, Jodwasser und Jodsalben vorzuziehen. Um torpide Formen anzuregen nützen die mechanisch wirkenden Mittel (Zucker, Calomel, Glaspulver, Pulv. Baldingeri [Crem. tart., Bolus, Sacch. aa.] und Aehnliches), doch nur so lange, bis die Resorption beginnt. — Scarrificationen und Einimpfung blennorrhöischen Secretes sind unzuverlässige Mittel. *Stout*, *Pieringer*, *Jäger* u. A. wollen von dem letzteren indess brillante Erfolge gesehen haben, doch bedürfen die Angaben noch der weiteren Bestätigung.

Keratitis parenchymatosa,

Entzündliche Ausschwitzung in die Hornhautsubstanz gehört zu den seltneren Cornealkrankheiten. Das seröse Exsudat trübt anfänglich, wenn es die Faserlage nur erst spärlich durchsetzt, nur wenig, doch steigert sich bei rasch und stürmisch verlaufender Ausschwitzung die Trübung oft schnell bis zur Erblindung, von der gewöhnlich Trübungen zurückbleiben. Das Exsudat durchdringt je nach der Intensität die Röhren der Hornhautsubstanz und die Zwischenräume so, dass Verdrängung stattfindet und die nachbleibende Trübung mehr dem entstandenen Narbengewebe als nicht resorbiertem Exsudate zuzuschreiben ist. Das Exsudat kann aber auch eitrig zerfallen und als Eiter resorbiert werden oder als solcher innerhalb der Interlamellarräume vertrocknen und liegen bleiben. Man sieht solche vertrocknete Hornhautabscesse, die von den alten Autoren wegen ihrer Aehnlichkeit mit der Matrix des Fingernagels *Unquis* oder *Onyx* genannt wurden, nicht selten bei ältern Individuen. Halbmondförmig erscheinen sie sowohl in der Hornhautsubstanz selbst, als wenn sie zwischen der Hornhaut und der Descemet'schen Haut liegen. Oft zeigen sie sich im Grunde der vordern Kammer, wo sie sich von einem geringen Grade des *Hypopyum* nur dadurch unterscheiden, dass sie eben die Descemet'sche Haut noch hinter sich haben und desshalb meistens bei der Seitenneigung des Kopfes unbeweglich bleiben. — Gefässe werden fast nur in den Fällen sichtbar, wo gleichzeitig *Pannus* zugegen ist. Der Gefässring in

der *Conj. sclerae* ist meistens bedeutend entwickelt. Die Reflexerscheinungen fehlen nie, oft wird über sehr heftigen Schmerz, der die ganze Kopfhälfte einnimmt, geklagt.

In günstigen Fällen gelingt die Heilung in 4—6 Wochen, doch hinterbleiben meist Trübungen. Die Prognose hängt von den Ursachen ab, unter denen Verletzungen und Liegenbleiben fremder Körper, besonders der Aehrengrannen, die oft die ganze Hornhautsubstanz durchdringen, an der Spitze stehen. Verletzungen, vorzüglich Contusionen, Trichiasis, Lidgranulationen, langwierige Blennorrhöen gehören auch hieher. Doch müssen wir gestehen, dass die Genese und das Wesen dieser Entzündungsform bis jetzt noch keineswegs zweifellos dasteht. Ohne Zweifel gehört die s. g. *Keratitis rheumatica* in diese Rubrik.

Cur: Aus letztgenanntem Grunde ist auch die Cur eine differente und desshalb vorwiegend eine symptomatische. Fremde Körper müssen entfernt, andere Grundübel beseitigt werden. Heftiger Entzündung wird angemessen antiphlogistisch entgegengewirkt. Blutegel und Schröpfköpfe (in den Nacken), salinische und drastische Abführmittel, bei traumatischer Veranlassung örtliche Kälte, gegen Schmerz und Lichtscheu narkotische Salben in Stirn und Schläfe, zur Resorption und antiphlogistisch Ung. einer. Auch innerlich Calomel (täglich einige Gran), um die Exsudation zu beschränken, mit $\frac{1}{10}$ gr. Coniin, wenn die Irritation erheblich ist. Dabei Ableitungen auf die äussere Haut durch Vesicatores und Ung. tart. stibiat. — Trübungen verschwinden am schnellsten, wenn es gelingt, den Vegetationszustand des ganzen Organismus zu steigern. — *Hasner* empfiehlt Laud. liq. Sydenh. örtlich und Tart. stib. innerlich, um die Resorption des Exsudates zu beschleunigen.

Keratitis rheumatica, Hornhautentzündung nach Erkältung.

Sehr viele Autoren fassen die Entzündung der Cornea nach Erkältungen noch unter dem Namen *Keratitis rheumatica* zusammen, die sich mit *Conjunctivitis*, *Scleritis* und *Iritis* zu compliciren pflege und nach der Beschaffenheit des Exsudates, das mehr serös oder mehr faserstoffig sei, ungefährlich oder gefährlich verlaufe.

Bei der *Keratitis rheumatica* mit a) serösem Exsudate trübe sich bald die Cornea in ihrer Totalität hellgrau, der Glanz verschwinde, es entstünden Phlyctänen, die leichte, seichte Facetten hinterliessen; Gefässe seien nicht in der Cornea, aber in deutlichem Saume um die Cornea herum sichtbar. Thränenfluss und Lichtscheu seien gesteigert, der charakteristische Schmerz trete Abends und Nachts, und nicht auf das Auge beschränkt, ein; keine Secretionsvermehrung.

Bei der *Keratitis rheumatica* mit b) faserstoffigem Exsudate sei der Uebergang in Eiterung charakteristisch, die übrigen Symptome seien dieselben. Diese Form ist mit der

Keratitis parenchymatosa identisch. Sie ist stets gefährlich und kehrt häufig wieder, ist aber sehr selten. Meist zeigt sie auf einer Seite eine höhere Intensität.

Zur Cur dienen Schonung, ruhiges Liegen im Bett, mässige Verdunkelung und eine den Umständen angemessene Antiphlogose. Gegen den abendlichen Schmerz dienen trockne Compressen und Einreibungen von Ung. ciner. mit Opium. Ein diaphoretisches Verfahren, Hautreize, Bäder u. d. sind erst nach dem Aufhören der heftigen Entzündung am Platze und zwingen den Patienten zu grosser Vorsicht, wenn er sich nicht der Gefahr, rückfällig zu werden, aussetzen will. Augewässer dürfen gar nicht in Anwendung gezogen werden. Ueberhaupt haben örtliche Mittel dieses Leiden oft sehr verschlimmert.

Hydromeningitis, Entzündung der Descemet'schen Haut, (?)

Entzündlicher Exsudationsprocess, der sich auf der hintern Hornhautfläche manifestirt, kommt sehr selten für sich bestehend zur Beobachtung und wird von den meisten Autoren zu den wissenschaftlichen Hypothesen gezählt. Wahrscheinlich existirt keine substantive Erkrankung dieser Art und die Erscheinungen gehören der *Iritis*, *Kyklitis*, *Kerato-Iritis* u. s. f. an, der Art, dass Exsudate dieser Krankheitsprocesse vom Kammerwasser fortgetragen und an der hintern Cornealwand, dieser Zellenmembran, die Descemet'sche Haut heisst, abgesetzt wird. Diese Absetzung geht in Körnerhaufen vor sich, die von vorn gesehen, die Retrocornealpartie ihrer Durchsichtigkeit beraubt, durch die Loupe deutlicher erkennbar ist; bei der Profilbetrachtung erkennt man sofort, dass die Substanz der Cornea normal ist. Irisentfärbung rührt von der Verunreinigung des Kammerwassers oder einer Iriskrankheit her. Anhäufung von Kammerwasser, Eitererguss in die Kammer werden mit grösserm Rechte als Symptome anderweitiger Krankheiten erklärt, die das *Corpus ciliare* oder die *Iris* befallen haben. — *Hasner* beschreibt (l. c. p. 112) eine *Hydrom. tuberculosa*, Absetzung tubercul. Stoffes an die Descemet'sche Haut unter den Erscheinungen der Reizung des Auges, die Absetzung soll mannichfache Nachschübe erfahren, das Exsudat eitrig zerfallen und zu *Hypopyon* Veranlassung geben können. Wir müssen noch weitere Bestätigungen dieser Prozeduren erwarten.

Ecchymosen der Descemet'schen Haut, die *Hasner* (l. c. p. 108) beschreibt, werden nach operativen Eingriffen und nach heftigem Blutandrang nach den Augen nicht selten beobachtet. Das Blut sieht wie aufgetüncht aus, ist dunkler oder heller roth, verändert seine Lage bei keiner Kopfbewegung und verschwindet erst sehr spät. *Hasner* will es meist halb-

mondförmig gesehen haben. Es liegt zwischen der Cornea und der Descem. Haut und erscheint in jeder Form, meist so, wie Flüssigkeit, die zwischen zwei Membranen auseinandergequetscht ist.

Ulcera corneae, Hornhautgeschwüre,

Hornhautgeschwüre sind die Folge von Zersetzung der Cornealsubstanz mit Defect, durch chemische oder entzündliche Einflüsse herbeigeführt. Bei der einfachsten Form fehlt nur ein Theil des Epitheliums, wesshalb solchen an und für sich auch kein anderer Werth zuzuschreiben ist als blossen Abschilferungen. Gewöhnlich dringen sie aber tief in die Substanz oder durchbohren sie gänzlich und sind deshalb für das Sehevermögen von der grössten Wichtigkeit. Man unterscheidet folgende Formen:

1) Das Erosionsgeschwür besteht nur in der Abstossung einer Epithelialpartie und verläuft selbst bei grösserer Ausdehnung ohne nennenswerthe Reaction. Der Epithelialdefect ersetzt sich in jedem Alter ohne Zuthun der Kunst. Sie entstehen nach mechanischen und chemischen Einflüssen, Katarrh u. d. und werden nur bei genauer Profilbetrachtung entdeckt, vorzüglich durch die Unterbrechung der spiegelnden Cornealwölbung.

2) Das Resorptionsgeschwür (die Facette) durchdringt das Epithelium und die oberen Schichten der Hornhaut und heilt deshalb nur unter Absetzung eines plastischen Exsudates, die als Trübung auftritt. Allmählig wird dasselbe klar und zwar, nachdem es in der Tiefe Fasern, an der Oberfläche Epithelium gebildet hat. Die Dauer dieser Geschwüre wird durch den Grad der Kraft, mit der der Stoffwechsel im Organismus zu Stande kommt, bedingt. Scrophulöse Individuen werden am häufigsten von ihnen befallen (s. Pustularophthalmie), doch können sie auch aus einfachen Phlyctänen, Erhebung des Epithels durch seröses Exsudat, indem dieses auch in die Tiefe wirkt, veranlasst werden. Durch Bepinseln mit verdünnter Tinct. Opii oder solut. Arg. nitric. bringt man sie meist bald zur Heilung, doch ist der Substanzdefect, die s. g. Facette, oft noch längere Zeit wahrzunehmen.

3) Das Eitergeschwür, die übelste Form, unterscheidet sich dadurch, dass es am zerstörendsten wirkt, weil es die Substanz in Eiter umwandelt und in die Tiefe zu dringen geneigt ist. Es kommt vorzüglich bei lymphatischen Kindern vor, wie das vorige, ist aber auch den Blennorrhöen, dem Trachom, den Abscedirungen in der Cornea etc. eigenthümlich, und heilt nur unter günstigen Umständen ohne Hinterlassung einer bleibenden Trübung. Während der entzündlichen Periode pflegen die Reflexsymptome erheblich zu sein, Lichtscheu und Lidkrampf sind oft so bedeutend, dass die Patienten das Auge zu zeigen sehr schwierig sind. Dabei ist oft bedeutende Con-

junctionalinjection und Lidödem vorhanden. Die Gefässe der Bindehaut verlaufen, besonders wenn die Geschwüre am Rande liegen, bis zu ihnen hin und verzweigen sich in einzelnen Fällen bis in den Grund des Geschwüres, der je nach dem Stadium rein oder speckig ist. Für die Integrität des Auges überhaupt sind die tieferen, die oft nur einen kleinen Umfang haben, die gefährlicheren, da sie eher zur Perforation und damit zu schlimmeren Folgezuständen führen. Vernarben sie unter starker Gefässentwicklung, so bleibt eine ausgedehntere und hartnäckigere Trübung, als wenn der Defect durch Absetzung von Lymphe unter geringerer Entzündlichkeit ersetzt wird. — Die grösseren Geschwüre mit gelockerten, geschwollenen und schmutzig verfärbtem Rande und entsprechendem Grunde sind in der Regel nicht die ungünstigen oder — sie zerstören die Hornhaut gänzlich.

Hornhautgeschwüre haben überhaupt folgende Veranlassungen:

1) Mechanische und chemische Verletzungen. Von dem Substanzdefecte der constitutionellen Energie und der Behandlung ist der Grad und Verlauf abhängig.

2) Augencatarrh. Erosions- und Resorptionsgeschwüre in der Peripherie der Hornhaut, die mit dem Grundübel und bei Gebrauch adstring. Collyrien bald und ohne Trübung heilen.

3) Pustularophthalmie. Resorptions- und Eitergeschwüre, mitten auf der Hornhaut, oder in der Randpartie und auf der *Conjunct. sclerae* sitzend, entstehen aus geborstenen Phlyctänen und Pusteln, sind bald rein und seicht, bald eitrig, schmutzig gelb und grau, mit tiefem Grunde und gelockerten, aufgeworfenen, auch steil abgeschnittenen Rändern, zerstören in die Breite und Tiefe und heilen mit Hinterlassung von vergänglichen oder bleibenden (narbigen) Trübungen, wenn sie nicht zur Perforation führen. (Siehe diese.)

4) Trachoma, Variola vera. Wie bei 3.

5) Blennorrhoeen können alle drei Geschwürsformen erzeugen oder auch durch Druckwirkung der phlegmonösen Chemosis partiell oder total die Hornhaut erweichen und zum Absterben bringen.

6) Entzündung der Hornhautsubstanz kann durch Zerfallen der gesetzten Exsudate Abscesse hervorrufen, deren Entleerung nach Aussen Geschwüre von verschiedener Tiefe erzeugt.

7) Typhus, Cholera, Puerperalfieber, perniciöse Masern und andere sehr schwere Erkrankungen, Lähmung des *N. quintus* u. d. führen zur Verschwärung der untern Cornealsegmente, vorzüglich wenn die Augen durch den periodischen Lidschlag nicht mehr vollständig geschlossen werden können und bei aufgehobenem Widerstande dem schädlichen Einflusse der Atmosphäre ausgesetzt sind.

Wie ein geschwächter, cachectischer Zustand des Organismus der Entstehung von Cornealulcerationen günstig ist, so ist eine totale Kräftigung auch der Verheilung günstig. Der Defect wird nämlich nur selten und immer nur theilweise durch Herbeiziehung der Nachbarsubstanz ergänzt, vielmehr wird er regenerirt durch langsam oder schnell erfolgende plastische Exsudation in der Tiefe, meist ohne hervorstechende Gefäßentwicklung. Dies Exsudat ist milchig trübe und wird von den Patienten, die nach seiner Entstehung schlechter sehen, meistens für einen neuen, schlimmern Krankheitszustand, nicht aber für das, was es ist, ein Ergebniss der begonnenen Heilung, gehalten. Je nach der Tiefe des Geschwürs füllt das Exsudat, wie provisorischer Callus (*Arlt*), dieselbe theilweise, ganz oder überschüssig aus. Es kann wieder eitrig zerfallen, es nimmt aber in günstigem Verlaufe früher oder später die Haupteigenschaften der zerstörten Epithelial- und Substanzpartieen an und bewirkt so vollständige Regenerirung. Für das Nachwachsen der Hornhaut nach dem Centrum scheint uns die ziemlich gesicherte Erfahrung zu sprechen, dass Keratonyxisnarben nach Verlauf von Jahren im Centrum erschienen, während die Nadel zwischen Centrum und Cornealrande eingeführt worden war. Wenn die Perforation bis zur Glashaut gedrungen war und diese mehrweniger und für relativ lange Zeit gestört hatte, so ist volle Herstellung der Cornea höchst selten. Jugendliches Alter, gute Gesundheit und hinreichende Reaction leisten in einzelnen Fällen allerdings Unglaubliches.

Malacia und Gangræna corneae, Hornhauterweichung und Brand.

Diese perniciosen Processe, die in ihrem verschiedenartigen Entstehen und Verlaufe noch nicht bis zur hinreichenden Einsicht beobachtet worden sind, treten nach der Einwirkung chemischer Substanzen, nach Verbrennungen, Blennorrhoeen auf und zerstören die Hornhaut in sehr kurzer Zeit vollständig. Es sind aber auch zahlreiche Fälle notirt, wo bei geringfügigen Entzündungen (*Erysipelas faciei*, *Sanston* in 11 Stunden) dies Absterben eintrat. Bei chemotischem Druck wird die gestörte Circulation und Ernährung Grund der Erweichung oder Nekrose, die gleich total oder schichtweise erfolgt, ähnlich, wie nach Durchschneidung des *Ganglion cervicale supremum* oder des *Trigeminus* diesseits des *Gangl. Gasseri* (*Szokalski*). *Arlt* erzählt hieher gehörige Fälle, die im Verlaufe von Scarlatina und Diarrhoe mit Aphthen eingetreten waren und erinnert dabei an *Magendie's* Versuche an Hunden, bei welchen, nachdem er sie bloss mit Zucker und destillirtem Wasser gefüttert hatte, vor dem Tode centrale durchbohrende Hornhautgeschwüre entstanden. Ein allgemein gültiges Curverfahren gibt es natürlich nicht. Chemotische Wülste thut man gut zu excidiren. Die

Hauptsache ist, die Vegetation des Gesamtorganismus zu steigern. *Dupuytren* räth, bei nur oberflächlichem Absterben den Grund mit Chlorwasser zu betupfen, wodurch derselbe härter werde, so, dass die tieferen Corneallagen Zeit behalten, zu vernarben und Irisvorfall vorzubeugen. — Ist Degeneration der trophischen Nerven Ursache, so geht das Auge phthisisch zu Grunde.

Obscuraciones corneae, Hornhauttrübungen.

Nach Entzündung, Verschwärung u. s. w. zurückgebliebene Störungen der Durchsichtigkeit der Hornhaut; zu unterscheiden von der Undurchsichtigkeit während der Entzündung oder Verschwärung. Wir trennen die Formen nach dem Sitze:

I. Antrocornealtrübungen. Diese Trübung, die im Epithelialblättchen allein ihren Sitz hat, ist rauchigt, nebligt und entweder punktförmig oder in der Fläche ausgedehnt. Sie pflegt Parenchymtrübungen zu begleiten, welche eine gänzliche Trübung bedingen, an und für sich ist sie halbdurchsichtig und hüllt die Sehobjecte gleichsam in Schleier. In seltenen Fällen erhebt sie sich über das normale Niveau der Cornea, eben so selten senkt sie sich in Vertiefungen der übrigens vollkommen reinen und glänzenden Cornealsubstanz (*Arlt*). In der Mitte sind solche Trübungen dichter, als an den Rändern, deutlich abgegränzt pflegen nur die punktförmigen zu sein. Sie können sich über die ganze Hornhaut gleichmässig ausdehnen. *Chelius* will bemerkt haben, dass zu den frisch entstandenen oft Gefässe vom Hornhautrande her verlaufen, was bei veralteten nicht der Fall ist.

Von der Dichtigkeit und der Lage hängt der Einfluss auf das Sehevermögen ab, wovon später.

Die Veranlassung sind anhaltender Reiz durch fremde Körper (z. B. durch Cilien bei *Trichiasis* und *Entropium*), wo das Epithelium schwielenartig verdickt wird, seidenartig und fest (cutisirt) ist, so dass die Zellen nicht mehr abgestossen und nicht mehr von den Thränen fortgespült werden. Bleibt nach der entzündlichen Periode des Pannus Trübung zurück, so will *Arlt* diese in einer neoplastischen Membran begründet gefunden haben, die er an der Leiche als unmittelbare Fortsetzung der Bindehaut abpräpariren konnte.

II. Retrocornealtrübungen. Diese Trübungen rühren von verschiedenen pathologischen Processen her, denen man erst in neuester Zeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die s. g. *Hydromeningitis* (*Wardrop*) existirt nicht, wie *Ruete* (Lehrbuch p. 442) zuerst entschieden ausgesprochen und bewiesen hat. Von der Existenz einer *Tuberculose* an der hintern Cornealwand (*Hasner* l. c. 112) habe ich mich ebenso nicht überzeugen können. Wohl aber

1) von einer ecchymotischen Trübung (S. p. 50.)

2) von einer ödematösen Erhebung der *Membr. Descemeti* bei *Kyklitis* und *Iritis* (bes. *syphilitica*). Sie hebt sich durch serösen Erguss an der Peripherie oder in ganzer Ausdehnung von der Hornhautsubstanz ab und lässt die Hornhaut in der Art getrübt erscheinen, wie ein an der concaven Seite angehauchtes Uhrglas. Zu merken ist, dass man hiebei keine punktförmige Exsudatauflagerung bemerkt und dass dies Leiden beim Schwinden des Grundübels sofort mit zurückgeht.

3) von exsudativer Auflagerung, mag dieselbe nun von *Iritis* u. s. f. herrühren oder von einem *Hydrops fibrinosus* (*Ruete*; der *Hydr.* beruht meist auf *Iritis*). Die Auflagerung geschieht punktförmig oder streifig und zeigt oft grosse Hartnäckigkeit. Sie wird beim Entstehen am leichtesten erkannt.

4) Ruptur der Descemet'schen Haut in Folge mechanischer Einwirkungen, denen die Cornea widersteht. (*Bochdaleck. Hasner* l. c. p. 122.)

III. Parenchymtrübungen. Diese sind sehr mannichfaltig. Es gehört hieher zuerst

a. Die angeborene Trübung, die entweder als Folge einer foetalen Entzündung oder als Hemmungsbildung zu betrachten ist, meistens erblich auftritt und innerhalb des ersten Lebensjahres gänzlich zu verschwinden pflegt. Die Trübung ist eine gefleckte, peripherische oder totale, meist beiderseitig und wird oft nicht bemerkt, weil sie in den ersten Lebenswochen, wo das Kind die Augen dem Lichte kaum öffnet, zurückgegangen ist. *Arlt, Schön, MacLagan, Taignot* beschreiben hieher gehörige Fälle, die indess noch nicht hinreichen, um definitiven Aufschluss über die Krankheit zu geben. Mir ist eine Familie bekannt, in der diese Trübung seit mehreren Generationen bei fast allen Neugeborenen beobachtet wurde und zwar in der Art, wie ein auf der concaven Seite gesplitterter Defect die Durchsichtigkeit eines Uhrglases trübt. Meist nach Verlauf eines halben Jahres war jede Spur verschwunden. Was blieb, war eine Art amblyopischer Schwäche, die bei mehreren Individuen durch das ganze Leben gleichmässig bestand und die ihren Grund darin findet, dass das Auge sich nicht von der Geburt an gewöhnte zu percipiren. Bei späterer vollkommener Durchsichtigkeit der Cornea bleiben solche Augen oft unthätig, wenn nicht das andere Auge geschlossen wird, und leiden an geringem Grade sensorieller und sensitiver Anästhasie.

b. Der Greisenbogen, *Arcus senilis*, *Gerontoxon*, eine grauweisse, sichelförmige Trübung in der Peripherie der Cornealsubstanz, die ohne congestive oder entzündliche Vorgänge unter denselben Bedingungen entsteht, wie graue Haare und *Cataracta senilis*. Er gehört dem höheren Alter an, kann aber auch Individuen von 30—40 Jahren ohne weitere Störung befallen, während 80jährige Augen noch von ihm verschont sind. Nach dem Centrum hin verliert er sich allmählig ohne deut-

liche Gränze, nach der Sclera hin ist er durch einen hellgebliebenen Streifen meistens sehr deutlich abgegränzt, wodurch er sich von dem blossen Uebergreifen der Sclera auf die Hornhaut unterscheidet. Er kann an der ganzen Hornhautcircumferenz vorkommen, pflegt aber im obern und untern Segmente breiter zu sein, so dass der durchsichtig gebliebene Theil die Form eines Ovales gewinnt. Wunden heilen in der durch den Altersring getrübten Partie ebenso, wie in der gesunden. Bei der Section ergeben sich das Epithelblättchen und die *Membr. Descem.* vollkommen normal, die Cornealfaser erscheint schärfer in ihren Contouren, breiter und dichter verfilzt, sclerosirt, d. h. dem Scleragewebe ähnlich geworden. Augen mit dieser Trübung sind stets weitsichtig, selbst in den seltenen Fällen, wo nur ein Auge ergriffen ist, ohne anderweitig gestört zu sein. *Ammon* fand zwei Ringe übereinander, er will analoge Trübungen gleichzeitig auch auf der vordern und hintern Kapsel gefunden haben. *Meyr* erklärt den Zustand aus einer Fettentartung der Fasern und will zahlreiche Oeltröpfchen in der Substanz des Hornhautgewebes gefunden haben. Mir schien der Grund vielmehr in beschränktem Stoffwechsel und daher rührender Induration zu liegen; *Stellwag* identificirt das Gerontoxon geradezu mit Cornealatrophie. Spätere mikroskopische Untersuchungen nöthigten mich für die untersuchten Fälle zu der Annahme einer Fettmetamorphose mich zu entscheiden.

c. Exsudative Trübungen sind die häufigsten und wurden nach ihrem Aussehen mit zahllosen bildlichen Namen belegt; *Macula* (*Nephelium*, *Nebula*, *Nubecula*) ist nach *Beer* eine grössere, halbdurchsichtige, oberflächliche Trübung, entstanden „durch Gerinnung des die Zellen der Hornhaut anfüllenden Halitus“ (!); *Aegis* (*Aegias*, *Achlys*, *Macula nubosa*) ein undurchsichtiger, erhabener Fleck; *Leucoma* erhabene, undurchsichtige, callös harte, gegen die Peripherie hin verwachsene Trübung, die bald kreideweiss ist (*Albugo*, *Paralampsis*, *Leuc. cretaceum*), bald von perlmutterartigem Glanze (*Leucoma margaritaceum*, *Margarita*, *Perla*). *Beer* meinte, der Dunst habe bei dieser Form schon den Character einer Pseudomembran angenommen. Man nimmt heutzutage füglich von diesen bildlichen Bezeichnungen Abstand, da sie nur verwirren können, und hält sich einzig an die pathologisch anatomischen Befunde.

Exsudative Trübungen erfolgen auf alle Entzündungen der Hornhaut mit oder ohne Verschwärung, besonders auf Keratitis pustulosa, und sind bei acutem Entstehen und sofortiger Behandlung in der Regel heilbar, indem entweder das zwischen die unversehrten Cornealfasern abgelagerte Exsudat zur Resorption gelangt oder indem es, wenn es an die Stelle der durch Aetzung oder Eiterung zu Grunde gegangenen Fasern getreten ist, die vollständige Umwandlung in diese Fasern eingeht. (Provisorischer Callus.)

d. Von der eitrigen Trübung und deren Folgen, dem *Unguis*, war bereits bei der parenchym. Kerat. die Rede. *Hasner* u. A. stellen die Existenz dieser Form mit Unrecht in Abrede. *Szokalski* sagt¹⁾, das Eiterserum würde resorbirt, die Eiterkörperchen verschmelzen zu einer gelblichen Masse und verbinden sich organisch mit der Hornhautsubstanz, in deren Mitte sie einen äusserst schwer heilbaren Flecken bilden.

e. Narbige Trübungen. Diese Trübungen sind die wohl ohne Ausnahme bleibenden, unheilbaren. Sie entstehen auf doppelte Weise, indem nämlich entweder die Fasern durch den Druck des um sie abgelagerten reichlichen Exsudates, besonders wenn dieser Druck längere Zeit besteht, ihre Durchsichtigkeit verlieren, atrophirt und sclerosirt werden, oder indem Exsudat, welches an die Stelle zerstörter Fasern getreten ist, die Metamorphose in normales durchsichtiges Fasergewebe nicht vollendet und Narbengewebe bleibt; oft hat dasselbe normale Structur, aber ohne Durchsichtigkeit (*Ruete*).

All diese Trübungen compliciren sich mannichfach untereinander und mit Entzündungsergebnissen benachbarter Organe, z. B. der Iris (durch *Synechie*, *Prolapsus* u. d.) und erhalten dadurch für Prognose und Therapie eine um so ungünstigere Geltung.

f. Metallische Niederschläge und Incrustationen wirken wie fremde Körper und können periodische Entzündungen und Eiterungen herbeiführen. Sie sind von unerfahrenen Augenärzten zum grössten Nachtheile ihrer Patienten oft genug dadurch herbeigeführt, dass bei geschwüriger Cornea Collyrien mit Plumbum aceticum u. d. versetzt verordnet wurden. *Cunier* hat nachgewiesen, dass Laudanum mit Plumb. acet. und Argent. nitric. einen reichlichen Niederschlag bewirkt, mit Cadmium sulph. Cupr. sulph. Lap. divin. und Zinc. sulph. einen spärlichen. Derselbe erscheint anfänglich weiss, später, wenn plastisches Exsudat ihn wie mit einer Pseudomembran umgibt, unregelmässig höckerig und schmutzig gelb. — Die gänzliche Entfernung mit der Staarnadel oder einem Messer (s. g. Abrasio) ist ausserordentlich schwierig und gelingt selten nach Wunsch.

Der Effect der Trübungen ist theilweise noch Problem. Denn während wir beobachten, dass auf kleine durchgreifende und auf ausgedehntere Centraltrübungen oft keinerlei anderweitige Störungen eintreten, sind diese andere Male sehr erheblich. Die Patienten sehen gut, indem theils durch Gewöhnung von der wirklich vorhandenen Trübung der Art abstrahirt wird, dass sie als Störung nicht zum Bewusstsein kommt oder indem unwillkürliche Accommodationen in den brechenden Medien eintreten. *Wardrop*, *Himly* u. A. haben beobachtet, dass sich sogar die Pupille in solchen Fällen allmählig hinter

¹⁾ Roser und Wunderlich's Archiv. 1846. p. 227.

der verdunkelten Stelle wegzieht und dadurch schief wird. In den meisten Fällen sind die Gesichtsstörungen der Lage und Dichtigkeit der Trübung angemessen. Marginale hindern in der Regel ebensowenig wie Greisenbogen, centrale nach dem Grade ihrer Durchsichtigkeit. Ist das kranke Auge überhaupt thätig, so verschleiert es beim Sehen mit beiden Augen den Gegenstand, der mit dem gesunden allein gesehen rein erscheint. Uebrigens liegt vor dem kranken Auge, wenn das gesunde geschlossen ist, ein deutlicher Flecken, wie ein fremder Körper zwischen Auge und Object. Ist scharf abgegränzt die Hälfte der Cornea undurchsichtig, so sehen die Kranken die Gegenstände mit diesem Auge oft nur theilweise, oft wie Myopische weil die Accommodationskraft unwillkürlich den Fehler auszugleichen sucht. Bei Dilatation der Pupille durch Mydriatica oder in der Dunkelheit sehen die Patienten besser, weil mehr Lichtstrahlen von dem Objecte auf die Retina fallen.

1) Was die wahrnehmbaren Folgen betrifft, so gewöhnen sich Patienten, um das Trübsehen zu vermeiden, welches durch das Ineinanderfallen des klaren und des unklaren Netzhautbildes auf den bekannten identischen Punkten entsteht, bei scharfem Sehen das kranke Auge mit der Hand zu schliessen oder es zuzukneifen. In diesem Umstande hat das periodische Zukneifen meistens seinen Grund, besonders wenn die Trübung nicht in der Kindheit schon erfolgte.

2) Hieher gehört ferner das Schielen, welches beim scharfen Sehen aus demselben Grunde geschieht und zwar bei Kindern nach Innen, bei Erwachsenen nach Aussen, anfänglich nur zeitweilig, später permanent. *Walther* irrt sehr, wenn er meint, das Auge würde abgelenkt, damit mehr Lichtstrahlen auf die Retina fielen. Es wird abgelenkt, wie beim Zukneifen, damit das undeutliche zweite Bild in dem kranken Auge überhaupt nicht gesehen werde, sondern nur das deutliche in dem gesunden. — Bei Schielen aus anderem Grunde tritt umgekehrt undeutliches Sehen mit dem schielenden Auge ein, weil die von ihm gesehenen Objecte nicht auch psychisch percipirt werden.

3) Es tritt *Nystagmus* ein, die Augen oscilliren unaufhörlich von beiden Seiten her und machen ein sicheres Sehen unmöglich. Dieser Folgezustand tritt nur ein, wenn die Trübung aus der ersten Kindheit datirte.

4) Baldige Ermüdung des gesunden Auges hat darin ihren Grund, dass bei längerem scharfen Sehen auf kleine Objecte das gesunde Auge sich übermässig anstrengt, um das undeutliche Bild des kranken Auges gewissermassen zu überbieten und um den Fehler auszugleichen. — Längerer Gebrauch in solchen Fällen gelingt besser, wenn das kranke Auge ganz geschlossen wird.

5) Einseitige oder beiderseitige Kurzsichtigkeit verschiedenen Grades pflegt besonders dann sich einzustellen,

wenn die Augen viel zum Nahesehen gebraucht werden und wenn die Trübung nur sehr kleine Dimensionen hat. Die Patienten bringen auch schon wegen der Trübung die Gegenstände dem Auge näher, weil dann die Lichtstrahlen von dem Gegenstande mehr divergirend in's Auge gelangen und deutlicheres Sehen möglich wird. Indem sich die Augen hieran gewöhnen, ändert sich die Refraction bleibend auch für die spätere Zeit, wo der Hornhautfleck längst verschwunden ist.

Eine sichere Prognose und Therapie ist meist sehr schwierig, oft unmöglich. Aus dem Vorstehenden leuchtet ein, dass manche Trübungen von selbst, ohne Zuthun der Kunst zurückgehen, dass andere unheilbar sind. *Hasner* u. A. sind aber entschieden im Unrecht, wenn sie desshalb auf jeden Beseitigungsversuch zu verzichten rathen. Besonders in jüngeren Jahren, selbst bis zum 40. Jahre hin, kommen Aufhellungen in überraschender Weise zu Stande. Ist das Individuum kräftig und wird gut genährt, so gehen bedeutende und prominirende Trübungen (s. g. *Leucomata*) oft ganz zurück oder werden wieder durchsichtig, indem die Exsudate resorbirt und neues Gewebe von grösserer oder geringerer Durchsichtigkeit an die Stelle tritt. Im Allgemeinen gilt, dass oberflächliche, frische, beschränkte Trübungen heilbar, tiefe, veraltete, besonders narbige unheilbar sind. Letzteres ist um so mehr der Fall, wenn Verwachsungen (mit der Iris), Abflachungen, bedeutende Hervorwölbungen u. d. zugegen sind und wenn sich bereits Secundärerscheinungen ausgebildet haben.

Beer behauptete, dass man sogleich die s. g. mischungsändernden Mittel nur in Gebrauch nehmen dürfe, wenn die Trübung dunkelgrau und ohne deutliche Gränzen sei, wenn sie nur einen matten Glanz habe und Spuren von Gefässverzweigung zeige. Sei dies nicht der Fall, sei also die Trübung undurchsichtig und kreideweiss, glänzend, gewölbt und ohne alle Gefässe, so müsse zur Vorbereitung zuerst die Anwendung von öligen (schleimigen, erweichenden) Mitteln vorgenommen werden. Zu diesen gehören Wasserdämpfe, die mittelst eines Trichters auf den Bulbus geleitet werden, warmer Quittenschleim, Malvenaufguss u. d., 10—12 mal täglich eingeträufelt, Leberthran, Nussöl, Papieröl, 2—3 mal aufgepinselt. Man mag mit diesen Mitteln die Cur einleiten, für uns steht fest, dass *Desmarres* Recht hat, wenn er dieselbe Wirkung jedem Mittel zuspricht, welches circa $\frac{1}{4}$ stündliche Reizung der Cornea zur Folge hat, z. B. Bepinseln mit Bimsteinsalbe, Bestreichen mit einem Federbarte u. d. Es kommt nämlich einzig darauf an, so viel Reiz in der Cornea zu erregen, dass der Blutzufluss nicht bloss vermehrt wird, sondern dass auch seröse Ausschwitzung die trübende Exsudate durchfeuchte und zur Resorption geschickt mache. Zur zweckmässigen Benutzung dieses Processes kommt es weniger auf die Art des Mittels, als auf

die Art der Anwendung des Mittels an, die der Arzt nach Umständen zu bemessen hat. Er muss von Zeit zu Zeit genau untersuchen und Sehversuche anstellen und sich nicht täuschen lassen, wenn periodisch die Trübung vergrößert erscheint. Zuführende Gefässe darf er durchschneiden und durch genaue Aetzung zur Resorption zu bringen suchen. Ableitende Mittel (Hautreize wie Purganzen) nützen nicht, vielmehr ist eine kräftige Ernährungsweise am Platze. Dabei muss natürlich jede Art schädlichen Einflusses (Zugluft, Diätfehler u. s. f.) vermieden werden.

Oberflächliche Trübungen schwinden allein bei solcher Cur nicht selten; nachträglich kann man leichte Adstringentien (Lap. divin.) folgen lassen und von Zeit zu Zeit Laud. liq. Sydenh. verdünnt einträufeln.

Ist die Trübung bedeutender oder tiefgehend, so hat man zwischen den vielen empfohlenen Mitteln die Wahl. *Artt* bringt sie nach der Intensität der Wirkung in folgende Reihe:

Extr. Cicut. Scr. 1 auf Dr. 2 aq. dest.

Extr. Chelidonii maj. } Scr. $\frac{1}{2}$ auf Dr. 2 aq.
— Aloës aquos. }

Laud. liq. Sydenh., rein oder verdünnt.

Hydrarg. muriat. corros. gr. $\frac{1}{4}$ auf Laud. liq. Sydenh. gtts. 4—8.

Argent. nitric. gr. $\frac{1}{2}$ —2 auf unc. 1 aq. dest.

Cadmii sulphur. gr. 1—2 auf unc. 1 aq. dest.

Salis ammon. et sacch. albi aa Scr. 1 in aq. Menth. unc. 1.

Borac. venet. et sacch. albi aa gr. 15 cum Extr. aloës aq. et Extr. opii aq. aa gr. 3 in aq. destill. unc. 1.

Baryt. muriat. gr. 5 in aq. lauroceras. unc. 1, 2 st. 1 Tropfen.

Kali caustic. gr. 2 in aq. destill. unc. 1.

Die übrigen Mittel siehe im Formulare, wobei zu beachten ist, dass die Unguenta exactissime mixta verschrieben, das Vehikel der Temperatur angemessen sein muss und dass nie zu viel verschrieben werde, damit die Salbe nicht durch Ranzigwerden ihren Character verliere und zu reizend wirke. Man thut gut, weil die Augen sich an stets dasselbe Mittel gewöhnen würden, beim Gebrauche zu wechseln und von dem schwächeren zu dem stärkern überzugehen, ebenso wechsele man die Form, in Bezug übrigens auf die Jahreszeit, indem Wasser mehr im Sommer, Salben mehr im Winter passen, und die individuelle Disposition des Patienten entscheiden muss, ob die eine Form besser als die andere vertragen wird. Der individuelle Fall muss überhaupt vorschreiben, ob man die Wirkung steigern, ob man häufiger das Mittel anwenden darf, oder ob man es schwächen muss, wenn der Reiz zu lange (nach *Rosas* über eine Stunde) andauert oder ob man es schwächer, seltner geben oder für eine Zeitlang ganz aussetzen müsse. Ist es nur alle 24 Stunden anzuwenden, so geschieht es vor Schlafengehen,

bei widerspenstigen Kindern öffnet man die Lider im ersten Schlafe zur Application. Flüssige Mittel werden in der Rückenlage mittelst eines Tropfglases, einer Federspule oder eines Pinsels in einen Augenwinkel geträufelt, Salben mit einem Haarpinsel vom äussern Winkel her linsengross unter das Oberlid gestrichen und durch gelinden Druck vertheilt, Pulver durch eine dünne Spule eingeblasen. Ueberhaupt gelten zwei Regeln: Vorsicht, um nicht zu schaden und Ausdauer, um nicht vorzeitig die Geduld zu verlieren. — In wiefern Schutzbrillen, ähnlich den s. g. durchlöcherten Nusschaalen, die früher gegen Strabismus empfohlen wurden, nützen, muss weiter bestätigt werden. Sie bringen künstlich *Myosis*, d. h. eine kleine Pupille hervor, daher myotische Brillen, und blenden die Cornealtrübung vor der Pupille der Art ab, dass gewissermassen durch eine neue Pupille vor dem Auge dem Lichte wieder ein freier Zugang gestattet und die Entstehung von Zerstreuungskreisen auf der Retina vermieden wird. (Vergleiche meinen Aufsatz über die myotische Brille in der Deutschen Klinik 1854.)

Die operativen Eingriffe, Haarseil, Electropunctur, Excision, Abrasio s. Kerectomia und Keratoplastik, von denen im operativen Theile gesprochen werden wird, sind nur in verzweifelten Fällen angezeigt und nützen selten. Ein Anderes gilt von der Bildung einer künstlichen Pupille (s. diese).

Perforatio corneae, Durchbruch der Hornhaut.

Zerstört ein Geschwür der Hornhaut auch die hinterste Schicht oder platzt schliesslich die *Membr. Descem.*, so hört an dieser Stelle der Widerstand auf, welchen die Bulbushülle dem Druck der Augenmedien und der Augenmuskeln entgegensetzt, das Kammerwasser wird aus der perforirten Stelle herausgedrängt und die nicht flüssigen Augenmedien ändern ihre Lage. Der Glaskörper, das Linsensystem und die Iris rücken vor in die Stelle, die das Kammerwasser bisher eingenommen hatte, und der Bulbus erhält durch die Wirkung der Muskeln eine mehr ovale Form (die Durchmesser im Aequator werden relativ kürzer, *Arlt*). Ist die Perforationsstelle so gelagert, dass sie durch die Iris oder die Kapsel der Linse sofort vollständig geschlossen wird, so sammelt sich das Kammerwasser wieder an und drängt die hinter ihr liegenden Theile zurück. Hat indess plastisches Exsudat die Oeffnung geschlossen, so ist ein relativ normaler Zustand wieder hergestellt und es hängt einzig von der Lage und dem Durchsichtigkeitsgrade der Narbe ab, wieweit das Sehevermögen beeinträchtigt wird.

Schliessen die vorgerückten Augenmedien die Oeffnung nur theilweise, so sickert das sich neubildende Kammerwasser unausgesetzt ab. Es entsteht der Zustand, der *Fistula corneae* genannt wird, Wochen und Monate bestehen kann und endlich zur Abplattung der Cornea, Verkleinerung des Bulbus und

durch hinzutretende Entzündung zur Zerstörung des Auges führt.

Legt sich die Linsencapsel an die Oeffnung, so kann eine Trübung auf derselben zurückbleiben (siehe *Cataracta capsularis centralis*), legt sich Iris an oder in die Oeffnung, so entstehen leicht die Zustände, von denen unter *Synechia anterior* und *Prolapsus Iridis* die Rede sein wird. Nach erfolgter Perforation kommt es für den Arzt hauptsächlich darauf an, zu verhüten, dass ein Irisvorfall zu Stande komme. Liegt das Geschwür dem Ciliarbande nahe, so dass sich allein der Ciliarteil der Iris vorlegen könnte, so hat man sich nur auf Ruhe, Rückenlage, Schliessung der Augen und Antiphlogose zu beschränken. Sobald aber der Pupillarteil der Iris mit in die Oeffnung gezogen zu werden droht, muss man so verfahren, als wenn das Geschwür mehr central liegt und die Pupille direct gefährdet ist. Man lagert dann den Patienten mit dem Kopfe etwas tiefer und unbeweglich auf den Rücken, legt leichte, kalte Compressen eines Belladonnainfusum auf die geschlossenen Augen und träufelt zugleich von Zeit zu Zeit von derselben Flüssigkeit in's Auge, bis die Pupille sich von der Perforationsstelle zurückgezogen hat. In diesem Zustande erhält man die Iris, bis sich die Perforationsöffnung theils durch Collapsus bulbi und Annäherung ihrer Ränder, theils durch plastisches Exsudat geschlossen hat.

Keratocele, Hornhautbruch,

derjenige Geschwürsausgang, bei dem die verdünnte Hornhaut durch den Druck der Augenmedien bläschenartig hervorgetrieben wird. *Desmarres* unterscheidet drei Formen nach dem Theile, der vorgetrieben ist, 1) wenn die tiefsten Schichten der Cornealsubstanz und die Wasserhaut vorliegen, 2) wenn nur die Wasserhaut vorliegt, 3) wenn die tieferen Schichten zerstört sind und die vorderen den Bruch (besser den Vorfall) bilden. Letztgenannte ist die seltenste, aber von *Jüngken* u. A. beobachtet und beschrieben worden. Ein häufiger und meist baldiger Ausgang des *Keratocele* ist der in *Perforatio corneae* durch Platzen der vorgetriebenen, oft sehr dünnen Partie. Die blosse Wasserhaut platzt meist sehr bald, kann aber auch dem Drucke so lange Widerstand leisten, bis Exsudate das Bläschen, das von punktförmiger Kleinheit bis zur Erbsengrösse verschieden vorkommt, eingehüllt und ihm mehr Festigkeit gegeben haben. Im weiteren Verlaufe bildet sich genuines Narbengewebe aus, welches die ursprüngliche Geschwürsstelle trübt. Liegt ausser dem *Humor aqueus* Iris mit der Keratocele, so bleibt diese Trübung und erscheint dunkelbläulich. In andern Fällen hellt sich das Exsudat über dem Bruche auf, nur die Peripherie bleibt trübe. Diesen Zustand haben Einige mit *Keratoconus* verwechselt,

Andere unter die verwirrende und deshalb zu beseitigende Bezeichnung *Staphyloma* gebracht. Er ist aber nur als stationär gewordene Keratocele (*Arlt*) in Anspruch zu nehmen und dürfte allen Operationsversuchen widerstehen, sowohl der Punction als der Aetzung, von der *Desmarres* spricht.

Beginnt eine *Keratocele* erst sich zu bilden, so muss man versuchen, 1) den Eintritt der Iris in den Bruch zu verhindern durch Eintröpfeln mydriatischer Mittel, und 2) der stärkeren Hervorwölbung durch periodische Entleerung und angemessenen Druckverband entgegen zu wirken. *Seitz* berichtet einen interessanten Fall der Art, bei dem es ihm gelang, durch Compression (mit einer Münze, Charpie und dem Monoculus) in 14 Tagen den Tumor nicht bloss abzuplatten, sondern auch in ein fleischähnliches Wärzchen zu verwandeln, neben welchem das Sehevermögen erhalten blieb. — Uebrigens ist die Behandlung des Geschwüres im Beginn der *Keratocele* fortzusetzen, Ruhe, Rückenlage, Schliessen der Augen, entsprechende Antiphogose etc. —

Synechia anterior sc. Iridis, Vordere Verwachsung der Iris.

Wenn nach einem perforirenden Geschwüre die vorgerückte Iris an der Perforationsstelle sich anheftet, anlöthet oder fest an ihr verwächst, so pflegt man diesen Zustand vordere Synechie zu nennen, zum Unterschiede von der hinteren Synechie, wo die Iris mit der Linsencapsel verwächst. Ist diese vordere Synechie eine beschränkte (*partialis*) und frisch entstanden, so ist sie heilbar und geht nicht gar selten von selbst wieder zurück; erstreckt sie sich über die ganze Iris (*totalis*), so lässt sie sich nicht beseitigen und veranlasst, weil die Irisfunction gänzlich beschränkt ist, fast regelmässig Blindheit. — Oft wird die partielle *Synechia ant.* nur durch ein Pseudoligament vermittelt, in dem sich wenig Irissubstanz oder Pigment befindet. Gehen solche *Synechien* zurück, so erkennt man den früheren Zustand an der Pigmentirung der Hornhautnarbe und dem Defecte der Iris. Die partiellen *Synech.* haben für das Sehevermögen einen um so höheren Werth, je näher sie der Pupille liegen, indem sie dadurch um so eher eine Vorziehung derselben veranlassen und den Pupillarrand selbst ergreifen können, dessen Befestigung die Beweglichkeit der Pupille und die Sehkraft beschränkt. Die grosse Dehnbarkeit der Iris überwindet das Eintreten dieses Zustandes aber meist. Ein operatives Verfahren wird selten angezeigt sein, da nur ligamentöse *Synechie* das Gesicht nicht beeinträchtigt und die gefährdende Operation verbietet, eine ausgedehnte aber keinen günstigen Erfolg verspricht. Wenn eine beschränkte *Synech.* sehr störend wird, so kann man einen Hornhautschnitt machen und das Ligament durchschneiden

Prolapsus Iridis, Irisvorfall.

Der Zustand, wo bei theilweise zerstörter Hornhaut die Iris zu Tage tritt, wo also noch ein Theil Augenkammer vorhanden ist und Humor aqueus sich wieder ansammeln kann. Perforationen durch Verschwärung oder Verletzung führen diesen Zustand, den man frisch nennt, so lange die vorgefallene Iris noch in keiner Weise degenerirt ist, herbei. Es kann sich je nach dem Umfange der Oeffnung, der Lage derselben, der Beschaffenheit der Iris, dem Drucke der Augenmedien mehr oder weniger Substanz vordrängen. Oft wird durch eine kleine Oeffnung mehr vorgedrängt, als in anderen Fällen durch eine grössere. Verwachsung tritt nicht immer ein, sondern nur dann, wenn die Iris an der Cornea selbst während des Exsudationsprocesses angelegen hat. *Mildner*¹⁾ und *Arlt*²⁾ haben nachgewiesen, dass in den nicht seltenen Fällen, wo die zerrissene *Membr. Descemeti* ihre Zipfel in die Oeffnung legt und die Berührung der Iris- und der Cornealsubstanz verhindert, die Iris nicht verwächst, sondern nach Verschliessung der geöffneten Cornea mit dem neu sich ansammelnden Kammerwasser in ihre normale Lage zurückgeht.

Die Entstehung eines Vorfalls ist je nach dem Grade der Zerrung, die in der nervenreichen Iris zu Stande kommt, mit mehr oder weniger Schmerz, der durch die ganze Kopfhälfte empfunden wird, verbunden.

Wird das vorgefallene Stück in einer relativ engen Oeffnung eingeklemmt oder entzündet es sich daselbst, durch Staub, Augensecret, Einfluss der atmosphärischen Luft, Lidschlag, unpassende Mittel u. d., gereizt, so geht es nicht zurück, sondern in Verlöthung und spätere Verwachsung über. Bei der Entzündung schwillt es an, wird dunkelgefärbt, oft fleischroth und wie mit Wundgranulationen besetzt. Selten indess entzündet sich mehr als die vorgefallene Irispartie. Die Verziehung der Pupille ist nach dem Grade verschieden, es kann dieselbe linear oder gänzlich verschlossen werden, ein Fall, der um so übler ist, je mehr der Pupillarrand an dem Prolapsus participirt. Tritt Brand ein, was indess selten geschieht, so wird die vorgefallene Partie abgestossen (*Desmarres*), verläuft die Entzündung normal, so entsteht bald eine feine Gefässverästelung auf dem gerötheten Prolapsus und man beobachtet die Absetzung eines pseudomembranösen Exsudates, welches in die Geschwürsränder der Hornhaut verläuft, über dem Prolapsus, der in diesem Zustande sich gewöhnlich abflacht und, mit *Synechia anterior* verbunden, stationär bleibt. — Sind mehrere solcher überwachsenen Vorfälle nebeneinander oder wird ein grösserer durch

¹⁾ Prager Vtljsschrift. Bd. 13. p. 56.

²⁾ Arlt. 1. c. p. 229.

straffe Exsudatfäden in mehrere Theile getrennt, so erhalten sie wohl das Aussehen einer Brombeere (*Staphyloma racemosum*). Die bildlichen Bezeichnungen für stationär gewordene Irisvorfälle, die aus der Aehnlichkeit mit den verschiedensten Gegenständen entnommen wurden, wie *Myocephalon* (Fliegenkopf), *Malum* (Apfel), *Clavus* (Kopf eines eingeschlagenen Nagels), werden in Zukunft wohl besser nicht mehr gebraucht. Bei Gelegenheit der *Pseudocornea* werden wir auf anderweitige Entwicklung dieses Zustandes zu sprechen kommen.

Ein direct operatives Verfahren wird kaum je indicirt sein. Das Beste ist immer, dem Zustandekommen vorzubeugen (siehe *Perforatio corneae*). *Desmarres* schlägt vor, wenn die Iris noch nicht festeingewachsen und unbeweglich ist, was durch Mydriatica zu erforschen ist, leichte Aetzungen in der benachbarten *Conj. sclerae* wiederholt zu instituiren, um die zum Verfall verlaufenden Gefässe zur serösen Exsudation zu veranlassen und so die Loslösung der Iris möglich zu machen.

Pseudocornea (Wharton Jones), Polterauge. (*Staphyloma corneae*.)

Neugebildetes Gewebe, verwachsen mit der vorgefallenen, hervorgewölbten und degenerirten Iris, an die Stelle durch Verschwärung zerstörter Hornhaut getreten. Man hat diesen Zustand, der erst seit *Wharton Jones*¹⁾ Untersuchungen (1838) richtiger erkannt ist, nur als einen andern Ausgang der Cornealulceration mit Prolapsus Iridis zu betrachten, er ist in der That nichts Weiteres, als Irisvorfall, partiell oder total, kegel- oder kugelförmig hervorgedrängt, mit narbig fester Pseudomembran überzogen, — einer getrübbten, degenerirten Cornea ähnlich, aber etwas ganz Anderes.

Mit dem bildlichen Namen *Staphyloma* bezeichnete man anfänglich die Entartung der Hornhaut, die Aehnlichkeit mit einer Weinbeerhülse hat, später warf man unter dieser Bezeichnung die verschiedenartigsten Zustände zusammen. so die *Keratocoele*, den *Keratoconus*, den *Hydrophthalmos anterior* u. s. w., von denen man sie demnächst durch das Epitheton *opacums. verum* zu trennen versuchte. Nach den früheren Theorien, die mehr aus dem Sectionsbefunde als aus der Entstehungsweise genommen wurden, war die staphylomatöse Hervortreibung Folge entzündlicher Schwellung und Verdickung der Hornhaut; die Masse wäre weiss, weich, speckartig, oft verhärtet (*Richter*). *Walther* verglich die Entstehung der *Hypertrophie* und Substanzwucherung mit der des s. g. Narrennagels. Nachdem *Richter*

¹⁾ Med. gaz. 1838. p. 847. — Corn. in Cyclop. of pract. surg. 1841, p. 842. Ophthalm. med. 1847. p. 189. — Cfr. Roser. 1852. Hornhautstaphylom. Arlt. l. c. 236. u. s. w.

auf den Einfluss der Extension durch das Kammerwasser aufmerksam gemacht, unterschied *Scarpa* a) Verdickungs- und b) Extensionsstaphylome, durch Ausdehnung, Verdünnung und Verdrängung der Cornea (*Gräfe, Jüngken, Andreae, Ammon* etc.). *Beer* trennte ebenfalls die ohne Wasser und die durch Wasser bedingte Entstehung und spricht von dem Einfluss der verwachsenen Iris, die sich vor die Cornea dergestalt lege, dass durch letztere das Wasser nicht mehr hindurchdringen könne, sich überschüssig ansammele und deshalb die erweichte Cornea vordränge. Dieses Entstehungsmoment, dass nämlich die Iris zu einer unperforirten Membran werde, das Wasser der hintern Kammer absperre und so die Hervordrängung bewirke, halten *Roser, M. Chelius, Hasner* u. A. noch fest.

Es ist wohl ausser Zweifel, dass zwischen stationär gewordenen Irisvorfall und *Pseudocornea* nur eine graduelle Differenz stattfindet, herbeigeführt durch die Ausdehnung der Cornealzerstörung, indem diese letztere zwei Quadratlinien Umfang haben muss, wenn eine *Pseudocornea* soll entstehen können (*Arlt*). Ist die *vis a tergo* auf eine kleinere Stelle beschränkt, so wirkt sie nicht ausdehnend, sondern durchbricht diese Stelle alsbald, es entsteht alsdann keine *Pseudocornea*, sondern Irisvorfall. Man nimmt die Gränze füglich so an, dass man den Zustand noch als *Prolapsus Iridis* bezeichnet, wenn die Iris deutlich abgegränzt aus der perforirten Hornhaut vorliegt, als *Pseudocornea partialis*, wo Iris und Hornhaut an der vorgetriebenen Stelle verschmelzen und auch noch durchsichtige Hornhaut sich mit der Iris konisch hervortreibt.

Vom practischen Gesichtspunkte aus hat man folgende drei Arten unterschieden (*Roser*):

1) vollständige *Pseudocornea*, deren Cur in der Abtragung besteht,

2) unvollständige *Pseudocornea*, mit Erhaltung eines Restes von durchsichtiger Hornhaut, aber mit solcher completen *Synechie* des Pupillarrandes, dass das Sehen nur nach künstlicher Pupillenbildung möglich ist,

3) bloss partielle Vortreibung nebst Verziehung der Pupille, wo wegen intensiver (leukomatöser) Trübung der kranken Partie die Operation der Pupillarverziehung indicirt sein kann.

Was die Entstehung betrifft, so ist nothwendig, dass die blossgelegte Iris nur erst mit einer weichen und dehnbaren Pseudomembran überzogen ist, wenn die Contractur der Augenmuskeln und der Druck der Augenmedien als *vis a tergo* zu wirken beginnen. Ebenso muss die Perforationsstelle narbig abgeschlossen sein, so dass das Kammerwasser sich ansammeln und mitwirken kann, indem beim Abfliessen desselben durch eine Fistel die *Pseudocornea* nicht zu Stande kommen kann (*Arlt*). Diese sich wieder bildende Flüssigkeit ist nämlich durchaus erforderlich, um den beim Nachlass der Muskelwirkung ent-

stehenden Raum zu füllen und die vorgetriebene, entzündlich erweichte Cornea und die exsudative Pseudomembran über der blossgelegten Iris in Spannung zu erhalten, d. h. die Hervorwölbung stationär zu machen. Der Reiz der Lider und der atmosphärischen Luft steigert nun den durch den ganzen Process gesetzten Reizungsstand der Art, dass die Iris bedeutend anschwillt, theils von zuströmendem Blute, wo sie dann verschieden roth gefärbt erscheint, theils von abgesetztem Exsudate, welches diese Farbe wieder nüancirt, wodurch auch der Abfluss gehemmt wird, und so, dass ausser den serösen Ergüssen auch weitere plastische Ablagerungen dauernd zu Stande kommen und an die Stelle der mehr und mehr verschwindenden normalen Gebilde treten. Hierin liegt auch der Grund, wesshalb in der fertigen *Pseudocornea* fast niemals normal erhaltenes Cornealgewebe gefunden wird. Ist der Bildungsprocess noch nicht abgelaufen, so ist dies plastische Exsudat bei der Abtragung weich, vasculös, hin und wieder noch mit normalen Cornealfasern durchsetzt und oft von auffallender Dicke, (2—3 mal dicker, als normal, *Scarpa's* Verdickungsstaphylom).

Von dem Grade der Zerstörung der tieferen Cornealschichten und der *Membr. Descemet.* hängt die Beschaffenheit der Rückseite der abgetragenen *Pseudocornea* ab. Ist die Zerstörung eine überall durchgängige gewesen, so ist die mit der Iris verwachsene Rückseite durchaus uneben und rauh, sind kleine Reste der Wasserhaut erhalten, so liegen diese wie Balken und Streifen, zwischen denen die Iris sich hineindrängt, unter dem Neugebilde ausgespannt. Selten sind grössere Parteen unversehrt, die sich dann leicht abpräpariren lassen.

Sobald die Reizung aufhört, schrumpft die *Pseudocornea* in eine derbere, festere, absolut undurchsichtige Masse zusammen und lässt in einzelnen Fällen die Absetzung fettiger oder kalkiger Producte zu. In andern Fällen kommen partielle Ulcerationen vor, die in beschränkter Ernährung ihren Hauptgrund haben und zu wiederholter Perforation und endlicher Zerstörung des ganzen Auges führen können.

Der Defect der Linse, der bei der Abtragung der *Pseudocornea* nicht selten beobachtet wird, kann seinen Grund darin haben, dass die Linse während der Perforation sich gelöst hat und ausgefallen ist, oder dass die Kapsel nur geborsten und die frei gewordene Linse darauf resorbirt worden ist. Diese Resorption kommt oft nur theilweise zu Stande, in welchem Falle die Linse dann als ein verkalkter, verknöchelter und verschobener, allein aus der Entstehung als frühere Linse erkennbarer Klumpen erscheint. — Andere Male sind nur noch Kapselreste aufzufinden oder die destruirte Linse ist mit der Iris verwachsen, so dass auch keine hintere Kammer besteht (*Frerichs*).

Durch Rupturen der Zonula, der Hyaloidea u. s. f., welche mit ausgebreiteter Perforation und heftigem Vordrängen der

Augenmedien nicht gar selten gleichzeitig eintreten, wird der Zustand zu einem vielfach complicirten. Es entsteht hydropischer Erguss an den verschiedensten Partien des hinteren Auges, die Glasfeuchtigkeit vermehrt sich im *corp. vitreum* und verflüssigt ihn, die *Sclera* verdünnt sich durch den Druck der überschüssigen Flüssigkeit und wird partiell hervorgedrängt in Form bläulicher Wülste (*vulgo Staphyloma varicosum* oder *cum varicositate bulbi*, eine falsche Bezeichnung, da die Venen ganz unbetheiligt sind und diese Wülste nie Blut, sondern hydropische Flüssigkeit enthalten) oder sie dilatirt sich in ihrer Totalität, so dass der Bulbus in seinem hinteren Umfange eine Vergrößerung erleidet, welche Lähmung der Retina und absolute Erblindung zur Folge hat. Ohne solche Complicationen bleibt nämlich im Anfange der *Pseudocornea* der lichtempfindende Theil des Auges in der Regel normal und der Lichtempfindung fähig.

Die Form der *Pseudocornea* wird besonders durch die Ausdehnung bedingt: totale pflegen kugelförmig zu sein, sie entstehen, wo die ganze Cornea verloren gegangen war und ein pseudomembranöses Neugebilde sich bald über die ganze Iris gelegt hatte; partielle sind meist kegelförmig, besonders da, wo nach centraler Perforation Verwachsung der *Iris* und *Synechia anterior marginalis* eingetreten war, wo also auch nur das kranke Centrum, nicht die gesunde Peripherie der Cornea sich hervordrängt. Abweichungen hiervon sind häufig, wenn z. B. die angränzende Sclera sich mit vortreibt, wenn die Spitze der *Pseudocornea* fungös entartet (*Szokalski*, mit Resorption der Linse) oder wenn in Folge langdauernder Blennorrhoeen die Cornea in hohem Grade erweicht und verdünnt ist (*Hasner*) etc.

Zu der weiteren Entwicklung tragen sowohl die eintretenden Gefässe bei als auch Wucherung in dem Epithelium der *Pseudocornea*. Letztere kann so bedeutend werden, dass die normale Dicke der Cornea erheblich überschritten wird (Verdickungsstaphylom).

Die Farbe ist verschieden je nach dem Stadium und den Complicationen. Der Grund des Auges kann schwarz durchscheinen, es kann die *Pseudocornea* aber auch durch Vasculosität, Hypopyon, Narbengewebe u. d. m. roth, gelb, weiss, grau u. s. f. und gemischt gefärbt erscheinen. Ablösungen der Iris, die während der Aus- oder Rückbildung, aber ohne Einfluss auf den Process selbst, beobachtet worden sind, üben ebenso einigen Einfluss auf die Färbung. — Cur operativ.

Laesiones corneae, Verletzungen und fremde Körper.

1) Quetschwunden geringeren Grades und bloss oberflächlich sind meist ohne Bedeutung und heilen unter Wiederersatz

des abgestossenen Epitheliums ohne Trübung. Bedeutendere Quetschwunden können, wenn ein fremder Körper auch nur heftig angeprallt war, Substanzentzündung und Abscedirung hervorrufen und selbst bei richtiger Behandlung das Sehvermögen unrettbar zerstören, zumal wenn die Entzündung auch auf tiefergelegene Organe übergreift. Erblindung pflegt einzutreten, wenn gleichzeitig Commotion der Netzhaut eingetreten war. — Ausser antiphlogistischer Behandlung, selbst Aderlass, ist es stets nothwendig, sofort das Auge genau zu untersuchen, um sich Gewissheit zu verschaffen, ob nicht vielleicht Theile des verletzenden fremden Körpers (Glassplitter, Zündhütchenstücke u. d.) zurückgeblieben sind. — Ruptur der Cornea hat fast regelmässig Blindheit zur Folge.

2) Hieb- und Schnittwunden sind ohne Erheblichkeit, so lange sie nicht penetriren, indem sie schnell und ohne Trübung zu heilen pflegen. Bei beschränkter Penetrationsöffnung fliesst das Kammerwasser aus, die Iris legt sich vor, bis die Wunde verheilt ist, und zieht sich meist normal wieder zurück. Oft hinterbleibt keine störende Narbe und der Patient ist in 2—3 Tagen wieder gesund. War die Wunde grösser und complicirt, so dass auch andere Organtheile, z. B. die Iris, verletzt wurden oder dass Linse und Glaskörper ausfallen konnten, so ist die Prognose natürlich ungünstig. Ebenso stellt sie sich übel, sobald die Wundränder gequetscht oder gelappt sind und desshalb zur Verschwärung hinneigen.

Cur: Oberflächliche Wunden heilen schon unter Abhaltung schädlicher Einflüsse, desshalb ist es stets rathsam, dem Patienten Ruhe und Schonung des Auges zu empfehlen und gelinde Antiphlogose anzuordnen. Perforirt die Schnittwunde, so hat man sich zu überzeugen, dass die Wundränder einander genau berühren, worauf man beide Augen mit Pflasterstreifen verklebt, kalte Aufschläge applicirt und den Patienten mit tiefliegender Kopfe auf den Rücken lagert. In die Kammer ergossenes Blut vor dem Verbande zu entleeren, ist meist ein überflüssiger Versuch, indem er entweder missglückt oder das Blut sich von Neuem ergiesst. In fast allen Fällen muss doch die Hauptmasse des Blutes resorbirt werden. Vorgefallene Iris sucht man mit dem Daviel'schen Löffel zu reponiren, doch hat die Reposition nur da Bestand, wo sich die Wunde hernach genau schliessen lässt. Die Application mydriatischer Fomente und Einträufelungen erleichtert die Reposition bisweilen auffallend. Ebenso das gelinde Reiben des geschlossenen Auges und das schnelle Oeffnen im Lichte. Misslingen alle Repositionsversuche, so thut man am besten, um Einwachsen zu verhüten, den Prolapsus vorsichtig mit einem raschen Scheerenschlage abzuschneiden. Die Reposition des Restes tritt dann oft von selbst ein. Cauterisation ist erst im weiteren Verlaufe angezeigt und unterbleibt meistens besser ganz.

3) Stichverletzungen sind desshalb bedenklicher, weil eher Gefahr ist, dass auch die Iris, die Linse, der Glaskörper u. s. w. mitverletzt worden sind. Fleissige Kälteapplication ist besonders nöthig, um zerstörende Entzündungen zu verhüten, doch folgt leicht Trübung der Linse oder gar Atrophie des Bulbus, wenn edle Theile gelitten hatten.

4) Fremde Körper haften sehr häufig nur oberflächlich auf der Hornhaut und reizen der Art, dass der Patient alsbald die Entfernung vom Arzte verlangt. In einzelnen Fällen sind aber auch leichte Substanzen, Hülsentheile u. d. Jahre lang liegen geblieben, ehe sie erkannt und entfernt wurden.

Dringen sie in die Substanz, so treten heftige Reactionserscheinungen und Entzündung auf, die sich über das ganze Parenchym ausbreiten kann, wie das nach dem Eindringen von Aehrengrannen oft beobachtet worden ist. Sobald es zur Eiterung kommt, pflegt der fremde Körper mit dem Eiter ausgestossen zu werden, Er kann aber auch so tief sitzen, dass noch dann weitere Hülfe nöthig ist, zumal wenn er auch in der Iris haftet. Oder es kommt zu interlamellärer Eitersenkung, Fortgang der Entzündung auf die Iris, Hypopyon und Verlust des Auges. Bisweilen beobachtet man auch, dass die fremden Körper, zumal Pulverkörner, eingebalgt werden und liegen bleiben.

Nach der Entfernung des fremden Körpers behält der Patient gewöhnlich noch längere Zeit die Empfindung der Gegenwart desselben, eine Täuschung, die in der entstandenen Verletzung ihren Grund hat. Schmutz und Metalloxyde stossen sich später meist von selbst aus.

Die Schmerzen der Patienten sind, auch bei sehr kleinen fremden Körpern oft sehr erheblich und erschweren die Entfernung ausserordentlich.

Cur: Bei kleinen Partikelchen in oder auf der Cornea thut man gut, die Loupe zur Hand zu nehmen, um sich vor den Entfernungsversuchen genau von der Lage des fremden Körpers zu überzeugen. Nach passender Stellung des Patienten zum Lichte öffnet man das Auge hinreichend und entfernt vom rechten Auge mit der linken Hand und umgekehrt den fremden Körper am besten mittelst einer Staarnadel, mit deren Schneide man schnell und möglichst vortheilhaft über die fremden Körper hinfährt. Ausserdem bedient man sich je nach Umständen eines beölten Pinsels, einer Pincette oder des Daviel'schen Löffels. Ist ein Holzsplitter schief zwischen die Cornealschichten gerathen, ohne dass er mit der Pincette herausgezogen werden kann, so entfernt man ihn am leichtesten, wenn man eine scharfschneidende Staarnadel gegen die Richtung des eingedrungenen fremden Körpers auf diesen einsticht und dann gegen die Oeffnung, durch die der Splitter eingedrungen ist, der Art vorschiebt, dass man die Hornhautschichte über dem Splitter scharf durchschneidet und den Splitter, indem man ihn

selbst als Leitungssonde für die Nadel gebraucht, fortschiebt. Dies wenig bekannte Experiment bewährte sich mir in den schwierigsten Fällen als ausserordentlich brauchbar.

Nach der Entfernung ist angemessen antiphlogistisch zu verfahren. Blutegel und selbst Aderlass sind oft nicht zu entbehren. — Schliesslich erwähne ich noch, dass sehr oft Augenentzündungen wider Wissen der Patienten ihren einzigen oder Hauptgrund in eingedrungenen und liegengebliebenen fremden Körpern haben.

5) Verbrennungen und chemische Substanzen gefährden die Hornhaut in hohem Grade. Verbrühung durch kochende Flüssigkeiten haben Trübung und Abstossung des Epitheliums zur Folge, die nur in leichten Fällen keinen bleibenden Nachtheil mit sich führen. Ungelöschter Kalk erregt fast regelmässig Suppuration mit permanenten Trübungen, Mineralsäuren, geschmolzenes Metall zerstören zugleich meistens die Bindehaut in dem Grade, dass *Ankylo-* und *Symblepharon* eintreten. Ebenso kann das momentane Aufschlagen einer Feuerflamme nicht nur die Hornhaut, sondern das ganze Auge zerstören.

Die Cur beginnt mit sorgfältigster Entfernung der chemischen Substanzen, zu denen man sich nur keiner lösenden Mittel, z. B. des Wassers bei Kalk, bedienen darf. Oel ist das geeignetste Mittel, um die Substanzen einzuhüllen und beweglich zu machen. Zurückgebliebene Kalktheile rath *Andreae* vermittelst eines Pinsels mit Salzsäure, concentrirt oder verdünnt, täglich oder jeden zweiten Tag zu betupfen, um auflöselichen salzsauren Kalk zu bilden, der weniger hartnäckig den Entfernungsversuchen widersteht.

Die Antiphlogose darf hier ebenfalls nicht versäumt, muss aber ausgesetzt werden, wenn die Eiterung eingetreten ist. Dann nützt überhaupt Ung. einer., in der Umgegend eingerieben, und trockne Wärme mehr.

Keratoconus.

Kegelförmige Hervorbildung der durchsichtigen Hornhaut, central oder mehr peripherisch in verschiedenem Grade entwickelt, kein Ausgang von Entzündung oder Verschwärung; wenigstens entsteht sie ohne Entzündungssymptome, langsam, gewöhnlich auf einem Auge stärker, bis zu einer gewissen Stufe, auf der sie stationär wird. Die Cornealperipherie ist anfänglich unbetheiligt, die spätere Kegelform ist nicht immer gleichmässig. Das verdünnte Centrum ist in der Regel mehr weniger getrübt, nicht in allen Fällen, wie *Sichel* behauptet. Bei der Profilbetrachtung wird die Prominenz am deutlichsten erkannt, ebenso die Glätte und der Glanz des Kegels. Die veränderte Brechung der Lichtstrahlen verursacht oft ein ungewöhnliches Flimmern und Opalisiren des Auges,

die besonders durch eine günstige Stellung des Auges zum Lichte vermehrt wird. *Brewster* schreibt das Funkeln des *Keratoconus* mikroskopischer Facettirung zu, die mit der Loupe nicht bemerkt wird und wohl noch fraglich ist.

Ursächlich hat man Entzündung, Verschwärung, mangelhafte oder gesteigerte Ernährung, Druck des Hum. aq. u. a. d. beschuldigt. *Pickford*¹⁾ stellte zuerst die jetzt adoptirte Ansicht auf, dass mangelhafter oder abnormer Einfluss des Ciliarnervensystem zu mehr weniger ausgedehnter Erweichung und diese sodann zur durchsichtigen Hervorbildung der Hornhaut führe. Das Auge pflegt übrigens normal zu sein, Complicationen am Auge kommen bei wirklichem *Keratoconus* wohl nur selten vor, *Pseudocornea* u. d. können höchstens Analogieen bieten. Wohl aber finden sich häufig bei den Individuen *Chlorose*, *Tuberculose*, *Scrophulose*, Schädelanomalieen, Flüssigkeiten in den Ventrikeln, abdominelle Störungen u. s. f.

Die Entstehung fällt meist in die jüngeren Jahre, doch will man das Uebel auch schon am Foetus beobachtet haben.

Zu den subjectiven Symptomen gehört hauptsächlich die Gesichtsstörung. Je nach dem Grade der Ausbildung des Kegels erscheinen die Gesichtsobjecte doppelt oder mehrfach vorhanden, sie sind von farbigen Säumen umzogen, undeutlich, ganz verworren oder nur noch seitlich sichtbar. Kurzsichtigkeit ist nicht vorhanden, wie oft gesagt wird. Die Bedingungen zu derselben fehlen, der Patient sieht weder in der Nähe noch in der Ferne genau. Oft gewöhnen sich die Patienten an Schielen, um besser sehen zu können. — Die Prognose muss in allen irgend vorgeschrittenen Fällen als eine üble bezeichnet werden, da abnorm gesteigerte oder verringerte Muskelaction, Innervation u. s. f. der Therapie wenig Spielraum lassen und *Xerosis corn.* sich leicht im Verlaufe hinzugesellt.

Cur: Nur im Beginn des Uebels lässt sich von den zahlreich empfohlenen Mitteln Hülfe erwarten. Adstringentien (Alaun, Silber, Zink, Blei u. d. in einem Dct. Querc.) sind angerathen worden, um der Erweichung entgegenzutreten. *Ware* liess ein starkes Tabaksinfus., *Benedict* Laudanum einträufeln. Ebenso wenig Nutzen leistet die blosse Punction zur periodischen Entleerung des Kammerwassers. *Desmarres* und *Demours* rühmen den Erfolg derselben in Verbindung mit einem methodischen Druckverbande. Gleichzeitig soll Laudanum eingeträufelt und die Spitze des Kegels mit Lap. infern. periodisch und leicht geätzt werden. *Walker* legte in einem Falle eine künstliche Pupille an, *Vetch*, *Textor*, *Lawrence* riethen die Zerstückelung der Linse, *Fario* die Excision eines Stückes der Hornhaut. *Sichel* beschränkt sich auf leichte Cauterisation mit Höllenstein 2—3 mal täglich und öfteres Betupfen mit Laudanum.

¹⁾ On the conical cornea, Dublin. 1844. —

Gibson applicirt örtlich Chinadecoet mit Alaun. *Pickford* hat günstige Resultate mitgetheilt in Fällen, wo er Brech- und Abführmittel gab, China und Jod, Blutegel, Zugpflaster, die in Eiterung erhalten wurden, Jod- und Mercursalben verordnete. Von angemessen biconcaven Brillen, um die Lichtbrechung zu accommodiren, habe ich in einem, allerdings gering entwickelten Falle, grossen Nutzen gesehen. Tenotomie kann nur gegen etwaige Complicationen hülfreich sein. In gewissen Fällen ist es rathsam, myotische, halbverdunkelte oder ähnliche Brillenvorrichtungen zu versuchen.

Hydrophthalmos anticus, vorderes Wasserauge, bezeichnet den Zustand übermässiger Ansammlung von Kammerwasser zwischen Hornhaut und Linse und kommt seltner bei allgemeinen Wassersuchten, als nach localen Hyperämien und Entzündungen vor. Man will auch eine angeborene Form beobachtet haben (in der *Berberi*), ebenso soll das Uebel erblich auftreten. Die Hornhaut erscheint glänzend und prominirt; trübt sich die Flüssigkeit, so erlischt das Gesicht bis auf ein Minimum. Im Beginn und ohne Complication ist das Uebel heilbar, steht aber meist mit serösen Ergüssen im hinteren Auge in Causalnexus und ist desshalb von übler Prognose. Mit *Keratoconus*, dem es nahe verwandt ist, könnte es verwechselt werden.

Therap. Die Mittel gegen die Ursachen heben auch das Uebel selbst; besonders hat sich die Punction und Entleerung in neuester Zeit als heilsam erwiesen.

Hypopyon, Eiterauge.

Ablagerung von Eiter innerhalb der Kammern, ein Zustand, der häufig und vielleicht einzig in Folge von Iritis und deren Complicationen auftritt. Aeltere Autoren unterschieden von diesem Uebel, das sie *H. verum* nannten, einen anderen, der *H. spurium* genannt wurde und den man entstehen liess, wenn der Eiter eines Hornhautabscesses sich nach Rückwärts in die Kammer ergossen hatte. Es ist zu merken, dass dieser Vorgang äusserst selten ist und dass die Erscheinungen des Eiterauges fehlen, indem sich ausser einem leichtgelblichen Belag der hintern Hornhautfläche höchstens ein Eiterstreifen von der Durchbruchsstelle nach Unten hin zeigt. Diese Erscheinungen gehen meist schnell vorüber, wenn nicht durch sie Iritis und in Folge dieser wirkliches Eiterauge zu Stande kommt.

In den meisten Fällen entsteht das *Hypopyon* so, dass das plastische Exsudat, welches bei Iritis von der ganzen Oberfläche der Iris abgesetzt wird, eitrig zerfällt und dass dieser Eiter, specifisch schwerer als der Hum. aqueus, die tiefste Stelle in dem Raume hinter der Cornea einnimmt. Bei geringer

Quantität ist nur ein hellgelber Streifen auf dem Grunde der vorderen Kammer wahrnehmbar, oft sehr versteckt; bei grösserer Quantität gränzt er sich an der unteren Hornhautcircumferenz rundlich ab, während er oben, einfach nach den Gravigationsgesetzen, eine horizontale Gränze zeigt, so dass die Form eines Halbmondes entsteht. Je flüssiger der Eiter ist, um so leichter ändert er seine Lage in der Kammer nach den Bewegungen des Kopfes und kann bei der Seitenlage des Patienten die untere Circumferenz vollständig verlassen, um an der seitlichen sichtbar zu werden. Ist der Eiter dick und käsig, so verändert er seine Lage nicht, dann fehlt dies Unterscheidungsmerkmal zwischen *Hypopyon* und *Unguis*. Für letzteren ist es indess stets charakteristisch, dass der interlamelläre Canal, in dem der Eiter sich gesenkt hatte, mit der Loupe gesehen werden kann.

Bildet sich sehr viel Eiter, so steht er durch die Pupille hindurch oft in beiden Kammern in einem Niveau, ja er kann beide gänzlich anfüllen, worauf dann die Cornea erweicht und platzt oder solche pseudomembranöse Neubildungen auftreten, dass das Auge blind bleibt. Solche Ausgänge gehören indess zu den Seltenheiten. Meistens wird der Eiter mit dem Rückgange der Iritis früher oder später vollständig resorbirt. Kleine Ueberreste, die sich auf dem Grunde der Kammer mit Exsudat vermengt und organisirt haben, beeinträchtigen das Sehvermögen nicht.

Hasner berichtet (l. c. p. 110), er habe ein eigentliches *Hypopyon* bei *Keratitis parenchymatosa*, die ohne irgend welche Affection des Corp. ciliar. und der Iris verlaufen sei, beobachtet und nimmt an, der Eiter sei von dem hintern Corneal-epithelium abgesetzt worden. (?)

Im Allgemeinen erregt das *Hypopyon* keinen Schmerz, meist entsteht es, ohne dass die Patienten den Vorgang ahnen. Die stechenden und klopfenden Schmerzen, über die in einzelnen Fällen berichtet wird, gehören der Iritis an, mit Ausnahme der höchsten Steigerung des Uebels, wo eine übergrosse Eitermasse durch Druck zu wirken beginnt.

Scarpa, *Desmarres* u. A. berichten von zahlreichen Fällen, wo z. B. nach *Depressio Cataract.* die Eiterbildung periodisch recidivirte.

Cur: Die gegen die zum Grunde liegende Entzündung nothwendige Antiphlogose beseitigt in der Regel auch das *Hypopyon*, so dass es in den meisten Fällen keiner speziellen Behandlung desselben bedarf. Lässt die Resorption auf sich warten, so nützen allg. und topische Blutentleerungen und Calomel. *Schmalz* empfiehlt Rad. Polygal., Seneg. in Pillenform zur Beseitigung des Eiters, Andere rathen zu fliegenden Vesicatorien, kalten Aufschlägen, blander Diät u. d. — Bei allgem. Schwäche sind stärkende Mittel, China u. d. angezeigt. — Ist mehr als

die Hälfte der Kammer mit Eiter gefüllt, sind die Schmerzen sehr heftig und droht der Eiter die Hornhaut zu zerstören, so darf man den vierten Theil der Circumferenz der Hornhaut mit dem Staarmesser öffnen und den Eiter entleeren. Bei blosser Punction gelingt die Entleerung niemals.

Haemorrhagia interna, s. Blutaugen.

Blutergiessungen innerhalb der Kammern, mehr oder minder beträchtlich, kommen nicht selten vor. Man unterscheidet nach den Ursachen 1) H. interna mechanica und 2) die spontanea. Die erstere wird durch Stösse, Schläge, Erschütterungen, Irisverletzungen und Operationen (*Iridodialysis* u. d.) herbeigeführt. Wie beim *Hypop.* senkt sich das Blut nach Unten, wo es bis zur Zersetzung und Resorption liegen bleibt. Dicke Blutpfropfe rathen *Desmarres* u. A. nach gemachtem Einschnitt zu entleeren, doch wird durch solche Eingriffe die Gefahr eher erhöht als vermindert. Mischt sich das Blut, was bei grosser Unruhe des Bulbus wohl eintritt, mit dem Kammerwasser, so erscheint dieses gelblich und gibt der blauen Iris eine grünliche, der braunen nur eine schmutzige Farbe. Das Blut verändert seinen Platz bei seitlicher Lagerung des Kopfes, wie der Eiter des *Hypopyon*.

2) H. interna spontanea tritt bei prädisponirten Individuen ohne directe Veranlassung oder schon bei leichter Erschütterung durch Niesen, Husten, besonders nach gewaltsamem Erbrechen u. d. auf. Ebenso wird sie bei *Iritis*, *Kyklitis* und schon bei blosser Congestion nach diesen Organen hin beobachtet. Störungen der Circulation durch Hämorrhoiden und Menostasie sind die häufigsten Grundübel, doch gehören auch Medullarsarcome im Auge, Varicosität des Corp. ciliar. Scorbut zu den Anlässen.

Compliciren sich Blut- und Eiteraugen, so nimmt, wenn es zu keiner Vermischung kommt, das Blut über dem Eiter, deutlich abgegränzt, seinen Platz.

Mittel, welche die Resorption befördern, sind am Platze, können aber bei zweckmässiger Behandlung der Hauptkrankheit meistens füglich entbehrt werden. — Antiphlogistica, frühzeitig angewandt, helfen indess in den meisten Fällen am zuverlässigsten, um das Uebel, das oft ausserordentlich hartnäckig ist, zu beseitigen.

Cysticercus cellulosae, Finnenwurm,

innerhalb des Kammerraumes beobachtete v. *Gräfe* jun. im letzten Jahre neben begleitender Conjunctivalinjection, leichter Trübung der *membr. Descem.* und *Iritis* als runde, erbsengrosse, milchige Blase, an deren unterem Ende ein vollkommen opaker, weisser Kopf befestigt war. An letzterem liessen sich Saugnäpfe und vom Fundus der Blase aus wellenförmig sich

verbreitende Bewegungen deutlich erkennen. Die Gesichtsstörungen und die entzündlichen Nebenerscheinungen verschwanden nach der Extraction der Blase aus einer linearen Schnittöffnung in 2—3 Wochen vollständig.

IV.

Die Lederhaut.

Scleritis,

Entzündung der Lederhaut kommt nicht in dem Sinne vor, wie Entzündung der Binde-, Hornhaut u. s. w., weil diese Membran an Nerven und Gefässen sehr arm ist und desshalb auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe steht. Die entzündlichen Erscheinungen, welche als der *Sclera* angehörig beschrieben werden, gehören richtiger der *Tunica vaginalis bulbi* (d. h. der s. g. *Tenon'schen* und *Bonnet'schen* Kapsel) an oder sie entstehen erst im Verlaufe von *Iritis*, *Kyklitis*, besonders *Choroiditis* (siehe diese) und haben dann nur den Werth begleitender, nicht substantiver Krankheitssymptome in einem Gewebe, das in dieser Art primär nicht ergriffen wird. *Arlt* ist der einzige, welcher ¹⁾ eine selbstständige, aber nur partielle *Scleritis* beschreibt. Das Wesen derselben besteht indess hauptsächlich in der Absetzung eines tuberculösen (?) Infiltrats in das Scleralparenchym, analog der *Conjunctivitis lymph. pustular.*, verschieden von dieser durch den Sitz, den langsameren Verlauf und die stets erfolgende Rückbildung. Die Geschwulst liegt in der Grösse einer halben Linse bis Erbse tief unter der Bindehaut, oft von Gefässen und gelblichen Körnern in der Bindehaut überzogen und vereinigt, und geht nie in Eiterung über, sondern verflacht sich früher oder später, wird violett oder grau und hinterlässt keine Spur, recidivirt aber wohl. Das Gewebe selbst ist mehr nur hyperämisch, als entzündet; ausser dumpfem Kopfschmerz sind keine charact. Symptome constant.

Cur: Die Behandlung besteht in Normirung des Allgemeinzustandes, guter Ernährung u. s. w., örtlich darf höchstens die Resorption durch Einträufelung von Laud. liq. Sydenh. und Einreibungen von Ung. ciner. in Stirn und Schläfe unterstützt werden.

Die *Sclerotico-choroiditis posterior* gehört ursprünglich mehr der *Choroidea* an und ist ophthalmoscopisch schon früh

¹⁾ 1. c. Bd. II. p. 4 et c. —

und mit grosser Sicherheit aus den stark reflectirenden weissen Plaques neben der *papilla nerv. opt.* nachweisbar, die früher für Exsudate galten, aber durch Pigmentschwund entstehen. Zuerst zeigt sich derselbe halbmondförmig, die Concavität der Papilla, die Convexität der macula lutea zuwendend, bis er die weniger hell reflectirende Papilla ganz umgibt oder sich in anderen Richtungen vergrössert. Auf der weissen Fläche, welche mit der lamina fusca eins zu sein scheint, sieht man die Retinal- und Choroidealgefässe oft mit überraschender Deutlichkeit verlaufen. Die Bulbuspole entfernen sich dabei von einander, so dass Myopie aus Axenverlängerung eintritt, gegen die man indess zum Nachtheil des Kranken Concavgläser in Anwendung bringen würde. Da das Uebel als schleichender Entzündungszustand zu betrachten ist, wofür auch die günstige Wirkung angemessener Antiplogose spricht, so ist besser alle Accommodation für die Nähe zu untersagen.

Sclerectasia,

Erweichung und Ausdehnung der Sclera kommt häufiger zur Beobachtung, als Folgeleiden von langwieriger, scrophulöser *Keratito-Iritis*, *Kyklitis* u. s. w., wobei sie sich röthet, anschwillt und in bläulichen Wülsten ausdehnt, die bis in die wohl sclerosirte Cornea sich erstrecken und diese oft ringförmig umgeben. Diese Form hat zu den sehr unpassenden Namen *Staphyloma annulare* und *Staphyloma corporis ciliaris* Veranlassung gegeben, an dem man auch noch festhielt, wenn eine theilweise Schrumpfung der Wülste wieder eingetreten war. Ob man die Entstehung dieser Erweichung und Ausdehnung als entzündlich bezeichnen will, ist nicht erheblich, jedenfalls participirt die Sclera an der Entzündung benachbarter Organe in der ihr eigenthümlichen Weise. Wenn in Folge von Vermehrung des verflüssigten Glaskörpers die Sclera in ihrer Totalität erweicht, verdünnt und ausgedehnt wird, so tritt der Zustand ein, den man vordem Ochsenauge, *Buphthalmus*, zu nennen liebte. Bei serösem Erguss zwischen Retina und Chorioidea, dieser und Sclera ist die Ectasia der letzteren meist nur partiell und wir haben es dann nach der älteren Anschauungsweise mit *Varicositas bulbi*, *Cirsophthalmus* und den *Staph. antic. lateral. antic. annulare* u. s. f. zu thun.

Die Beeinträchtigung des Sehevermögens ist nie von der Ausdehnung und Zahl dieser Wülste, vielmehr von dem Grundeiden in der Chorioidea, Retina u. s. w. abhängig, das sich in der *Sclerectasie* nur manifestirt.

Cur: *Desmarres* empfiehlt wiederholtes Betupfen mit Argent. nitric. (1 bis 2 mal wöchentlich), leichten Compressionsverband, öftere Punction (alle 8—10 Tage) und in den schlimmsten Fällen die Abtragung des vorderen Auges behufs Einsetzung eines künstlichen. — Dem entstehenden Uebel tritt man hin-

reichend durch die Mittel gegen das Grundübel (*Chorioiditis* u. s. w.) entgegen.

Laesiones sclerae,

Verletzungen der Lederhaut sind an und für sich ohne Erheblichkeit, da die Heilung bald und ohne irgend bedeutende Reaction zu Stande kommt. Bedenklich werden sie fast einzig durch die verschiedenen Complicationen. Befindet sich eine penetrirende Wunde dem Cornealrande nahe, so kann leicht die Iris verfallen und sich einklemmen, ein Vorfall, der, wenn er nicht reponirt würde, zur Verschliessung der Pupille führen könnte. Einen solchen Fall habe ich in der Klinik des Hrn. Geh. Rath *Wutzer* beobachtet ¹⁾. Einem Drechsler flog ein Hornsplitterchen mit Vehemenz in's Auge, wesshalb er in die Klinik kam. Bei der Untersuchung fand ich es nicht mehr, wohl aber war die Pupille nach der äussern Seite hin bedeutend verzogen und c. $\frac{1}{2}$ '' vom Cornealrande hing aus der 1'' langen Scleralwunde ein weicher, bräunlicher Körper, den der Patient für einen fremden hielt und zu entfernen bat. Es war indess die Iris; die mit einer Staarnadel vorgenommene Reposition gelang sofort. Die Iris rundete sich wieder normal. Bei strenger Antiphlogose genas der Patient in wenigen Tagen, obgleich dem Trunk ergeben und über 50 Jahre alt, vollständig. — Die Reposition muss in jedem Falle wenigstens versucht werden, da, wenn auch nicht immer Verschliessung, doch Coloboma und Verkleinerung der Pupille eintreten und das Sehevermögen beeinträchtigt werden könnte. —

Kleine Portionen Glaskörper können ohne Nachtheil verloren gehen. Bleiben sie vorliegen, so trüben sie sich zuerst und werden allmählig abgestossen. Wird mehr als ein Drittheil des Glaskörpers entleert, so pflegt der Bulbus atrophisch zu werden. Der Verlust der Linse hatte in einzelnen Fällen nur den Effect der Extraction, so dass die Patienten durch Staarbrillen wieder erträglich sehen konnten.

Birst die Sclera, was in Folge von Stössen und Schlägen, gewöhnlich dem Cornealrande nahe, wo die Sclera am dünnsten ist, geschieht, so bleibt oft die *Conj. sclerae* vermöge ihrer Elasticität unzerrissen, so dass die hervorgetriebenen Theile hinter ihr zurückgehalten werden. Hum. aq., Linse, Glaskörper, Chorioidea dislociren sich nicht selten auf diese Weise hinter die *Conj.*, um dort ganz oder theilweise resorbirt oder eingebalgt zu werden.

Innere Hämorrhagia, Retinal- und Irislähmung und ähnliche Complicationen stellen die Prognose immer ungünstig. — Unmittelbar nach der Verletzung stellt sich meist wegen Erschütterung der Ciliarnerven Erbrechen ein. — *Hasner*

¹⁾ Cfr. Deutsche Klinik.

beschreibt¹⁾ eine Risswunde, bei der die Ränder anschwellen, eitrig infiltrirt, graugelb und nach Aussen umgestülpt wurden. Er will nur diesen Fall als wahre *Scleritis* gelten lassen.

Cur: Strenge Antiphlogose, besonders wegen der Complicationen.

V.

Die Regenbogenhaut.

Iritis, Entzündung der Iris,

tritt nur selten für sich auf, meist complicirt mit Entzündung der Hornhaut, des Corp. ciliare, besonders der Choroidea etc., ebenso meist einseitig und ist immer sehr gefährlich, da nur unter sehr günstigen Umständen vollständige Zertheilung gelingt. Man hat sie eingetheilt in primäre und secundäre, partielle und totale, oberflächliche, parenchymatöse und *Uveitis*, ebenso nach dyscrasischen Complicationen in syphilit., rheumat., scrophul., mercurielle, arthrit. u. s. w. Am besten theilt man sie nach der Art des Verlaufes in die acute und chronische Form, welchen beiden sich die obengenannten sodann als Grade oder Unterarten anreihen.

Die Iritis acuta zeigt ein kurzes Stad. prodrom. (*Irit. serosa, superficialis*) durch leichte Entfärbung der Iris, leichte Trübung der Cornea, Rauchigwerden und Trägheit der Pupille nur selten. Meistens beginnt sie sofort intensiv (*Irit. parenchymatosa*). Die vorderen Ciliararterien führen mehr Blut zu, sogar bis zur Berstung der Gefässwände und innerer Blutung, es zeigt sich ein rother Saum um die Cornea, die Substanz der Iris wird durch Hyperämie und Exsudation geschwellt und entfärbt. Zur Entfärbung trägt meist auch Trübung des Kammerwassers bei und so wird die Iris röthlich, wenn ihre Gefässe viel Blut enthalten, grünlich, wenn vor der blauen Iris gelbliches Kammerwasser steht, schmutzig grau von der Farbe des Exsudates u. s. w. Die Verfärbung ist sehr verschiedenartig und wird durch Vergleichung mit der Farbe des gesunden Auges sofort erkannt. Die Entfärbung nimmt fast stets den Weg vom Pupillarrande nach Aussen zu; selten stellt sie sich in der ganzen Iris gleichzeitig ein. Sie ist als Folge von Blutstase erklärt worden. Das Exsudat ist entweder serös und trägt dann zur Vergrößerung der Kammer bei oder es ist mehr plastisch und schlägt sich dann an der Iris nieder oder vertheilt sich im Kammerwasser, von dem es punktförmig

¹⁾ l. c. pag. 177.

an der hintern Cornealwand, besonders nach Unten hin, abgesetzt wird. Nicht selten zerzt es Pigmentpartieen von der *Uvea* ab, die dann an verschiedenen Stellen sichtbar werden (s. g. *Uveitis*). Ebenso kann das Exsudat Ursache werden von hinterer Synechie, indem es Iris und Linsencapsel miteinander verklebt, von grauer, rauchiger Färbung der Pupille durch Trübung des Kammerwassers und der vordern Linsencapsel, von Pupillensperre, indem es sich im Pupillarraume ablagert und so auf rein mechanische Weise von Trägheit oder Unbeweglichkeit der Pupille. Zur Entstehung der letztgenannten Erscheinung trägt gleichzeitig die Erfüllung des Irisparenchyms mit Blut und Serum bei, zur Verengung der Pupille aber, die ein fast constantes Symptom der Iritis ist, der Umstand, dass die Pupille während des Schlafes, wo die Pupille sehr eng ist, und bei der ersten Reizung, welche Contraction der Ringfasern bewirkt, unbeweglich zu werden anfängt. Ring- und Strahlenfasern der Iris sind später unthätig, weil Lähmung in ihnen eintritt und das Gewebe ausserdem so verändert und verdickt ist, dass es auch desshalb dem Einflusse der Nerven und Muskeln Widerstand leistet. Ist bei Iritis die Pupille dilatirt, so ist dies ein schlimmes Zeichen, indem es auf primäre Affection der Retina und Choroidea hinweist, denen die *Iritis* sich später zugesellt hat. Zu den gewöhnlichen Reflexsymptomen ist die concomitirende Verengung des gesunden Auges zu zählen. Die Verziehung der Pupille wird durch das Exsudat bewirkt. Bei *Arthritis* soll die Form oval werden, bei *Syphilis* eckig, besonders nach dem inneren Winkel zu, was die Erfahrung in vielen Fällen allerdings bestätigt. Das Sehevermögen wird durch reine *Iritis* nie ganz aufgehoben, wohl aber durch Exsudate und Complicationen. Die vorkommenden Störungen beschränken sich bei reiner *Iritis* auf Lichterscheinungen, Mückensehen und temporäre, durch Lichtscheu gesteigerte Gesichtsschwäche. Diese Erscheinungen, ebenso Thränenfluss etc., weisen nicht, wie *Sichel* annimmt, auf *Retinitis* hin, sondern zeigen nur den Grad der Ciliarnervenaffection an, als deren Reflex sie bei allen Entzündungen bekannt sind. Als weitere Beweise hochgesteigter *Iritis* gelten mit Recht Injection der *Conj. bulbi* und besonders ein rosenrother Saum um die Cornea (*Kyklitis*), Oedem der benachbarten Haut, febrile und gastrische Erscheinungen, sogar Erbrechen, Stuhlverstopfung, psychische Alterationen (*Ammon*), obgleich sie theilweise nur indirect auftreten und keineswegs constant sind. Der Schmerz ist um so heftiger, je intensiver und schneller die *Iritis* auftritt und verläuft. Er strahlt in der Richtung des *N. ophthalmicus* aus und verbreitet sich oft über die ganze Kopfhälfte. Die periodischen Steigerungen, die nicht selten beobachtet werden, haben, wenn nicht Erkältungen die Schuld tragen, ihren Grund in gesteigerter

Erregung des allgemeinen Nervensystems. Sie währen meist nur 2—4 Stunden und stellen sich in der Regel Nachts ein.

Die Complication mit *Keratitis*, die s. g. *Kerato-Iritis*, macht wegen Trübung der Hornhaut in der Regel sehr bald die genaue Wahrnehmung der Erscheinungen an der Iris unmöglich. *Kyklitis* und Reizung der Thränenorgane fehlen bei dieser Complication fast nie.

Männliches Geschlecht und reiferes Alter sollen prädisponiren, rheumatische, gichtische und besonders syphilitische Individuen sind erfahrungsgemäss in höherem Grade exponirt. Die *Iritis* erleidet bei ihnen verschiedene Modificationen, ist hartnäckiger, verläuft schneller, führt eher üble Ausgänge herbei etc., weshalb diese Modificationen unten besonders besprochen werden.

Die chronische Iritis tritt als solche entweder unter schleichenden Erscheinungen (*I. occulta*) primär auf oder entwickelt sich, was häufiger ist, aus der verschleppten acuten Form. Im Wesentlichen sind Entstehung, Symptome, Ausgänge dieselben, nur treten sie unscheinbar, oft gänzlich unbemerkt auf, bis *mouches volantes* und Gesichtsabnahme, die bei Integrität des anderen Auges allzuhäufig der Wahrnehmung entgeht, die Kranken zum Arzte treiben. Vor der Verwechselung mit Retinalaffectionen, zu der das Fehlen der gewöhnlichen Entzündungszeichen verführen könnte, sichert meist schon vergleichende Betrachtung der Irisfarbe. Die Hartnäckigkeit des Uebels erklärt sich bald aus der Constitution (venösen oder lymphatischen), bald aus Verschlimmerungen nach den geringfügigsten Erkältungen; in manchen Fällen hat der intermittirende Character das Leiden als Neurose erscheinen lassen, gegen welche Chinin sich als dienlich erwies. — Ging acute *Iritis* voraus, so finden sich die Ausgangerscheinungen derselben; entstand die chronische *Iritis* primär, so zeigen sich ausser Veränderungen in der Farbe, der Beschaffenheit der äusseren Fläche, der Beweglichkeit und der Pupillaröffnung besonders häufig Exsudate, die bald als Flecken aufliegen oder in die Substanz eingesenkt scheinen, bald aber frei als Fäden, Netze, Pseudoligamente und Knötchen zum Vorschein kommen und zumal bei Pupillendilatation sichtbarer werden. In der Form von kugeligen Anhängen erscheinen sie ähnlich wie Warzen und haben *Ph. v. Walther* bei zum Grunde liegender *Syphitis* zu der Annahme von Condylomen an der Iris verführt. — Die subj. Symptome sind anfänglich gleich Null und hängen später von dem Grade, von den Folgezuständen und den Complicationen ab. Reflexerscheinungen treten erst spät auf, das Sehevermögen wird bald durch diese, bald durch Exsudate, bald durch Complicationen, besonders häufig durch Retinalirritation beeinträchtigt. — Zu merken ist noch, dass die chronische Form häufiger ist, als die acute und auch häufiger partiell auftritt. — Dass die Irisentfärbung vorwiegend vom Ciliarrande

begänne, während bei der acuten Form das Entgegengesetzte der Fall sei, ist nicht constant.

In prognostischer Hinsicht ist jede *Iritis* zu den bedenklichsten Augenkrankheiten zu zählen und nur bei leichten, frischen und einfachen Fällen ist mit einiger Sicherheit auf günstigen Verlauf zu hoffen. Die acute droht mehr Gefahr durch Verlöthungen und Exsudate, die chronische durch schleppenden Verlauf und auffallende Neigung zu Recidiven.

Was die bei *Iritis* einzuschlagende Therapie im Allgemeinen betrifft, so gilt als Hauptgrundsatz, das Uebel durch energische Antiphlogose sobald als möglich zu stellen, um dadurch den schwer zu beseitigenden Folgeübeln vorzubeugen. Bei einigermaßen heftiger Entzündung wird ein ergiebiger Aderlass von Vorn herein immer günstig die weitere Cur einleiten; nur grosse Schwächlichkeit des Kranken könnte dessen Ausführung contraindiciren und die Blutentleerung durch hirud. (10—12 Stück) und Schröpfköpfe auf dem Rücken vorziehen heissen. In Anstalten wird nicht unpassend der *Junod'sche* Stiefel statt des Aderlasses angewendet. Die Blutegel setzt man 1—1½ Fingerbreit vom Auge entfernt, an die Schläfe, hinter das Ohr oder auch in die Nase und sorgt je nach Umständen für längeres Nachbluten. Eine grössere Anzahl mit einem Male schafft mehr Nutzen, als wenige zu verschiedenen Zeiten. Nicht selten wird indess Wiederholung der örtlichen Blutentleerung durch Fortgang hochgradiger Entzündung nöthig. Bei chron. *Iritis* reicht meistens wiederholte Schröpfung im Nacken aus. — Der Patient muss ausserdem mässig kühl gehalten werden, leichter Schutz durch Leinenlappchen vor dem Auge, nicht dicke Tücher, mässige Verdunkelung des Zimmers, einfache kühlende Diät, Bethätigung der Entleerung durch Laxanzen, zweimal täglich Einreibung von Ung. Hydrarg. ciner. mit Extr. Bellad. oder Hyosc. (gr. 4—6 auf Dr. 2), um das Auge. Die Salbe muss mehrere Minuten kräftig eingerieben werden, so dass sie von der Haut möglichst reichlich aufgenommen wird. — Belladonna oder Atropin gegen die Pupillenverengerung einzuträufeln, ist bei noch bestehender Entzündung oft von nachtheiliger Wirkung. — Ableitung durch scharfe Fussbäder, Blasenpflaster, Pockensalbe, Fontanellen u. dgl. darf oft nicht versäumt werden. Als sehr zweckmässig verdient bei sehr intensiver *Iritis* mit grosser Schmerzhaftigkeit die Entleerung des Hum. aq. durch Hornhautpunction gerühmt zu werden. Die Schmerzen verringern sich nach der Punction oft augenblicklich. — Kalte Fomente nützen nur bei traumatischer Veranlassung. — Um im weiteren Verlaufe der Entzündung und besonders der Exsudation entgegenzutreten, ist Calomel das bewährteste Mittel. *Desmarres* gibt es von Vorn hinein zu gr. 15 als Laxanz und dann zu gr. 1 2stündlich fort; passender bedient man sich als Eccopropticum salinischer Mittel und geht erst nach ihrer Anwendung zu kleinen Dosen

Calomel über, dem man gern Opium zusetzt, um es verträglicher zu machen, oder Extr. Cicut., wenn die Lichtscheu bedeutend ist. Bei heftiger Hydrargyrose wird der Mercur innerlich und äusserlich ausgesetzt und Jodkali an seiner Stelle gebraucht.

Nach den Complicationen und den ursächlichen Momenten wird die Therapie variirt, wie wir weiter unten sehen werden. Ebenso müssen die Ausgänge in therap. Hinsicht besonders berücksichtigt werden.

Iritis in ursächlicher Hinsicht.

1) Verletzungen der Iris, wenn sie nur vorübergehend einwirken, haben seltner Entzündung zur Folge, als man bei einem an Gefässen und Nerven so reichen Organe anzunehmen berechtigt ist. Die Eingriffe in deren Integrität bei Staaroperationen und künstlicher Pupillenbildung bestätigen diesen Satz. Selbst traumatisches Coloboma und gewaltsame Ablösungen im Ciliarligamente sind häufig nur zu partieller Entzündung Veranlassung. Bei wiederholten Insulten und bei Zurückbleiben eines fremden Körpers ist die Gefahr indess grösser und es gesellt sich meist zu der *Iritis* im Verlaufe *Keratitis*, *Chorioiditis*, *Panophthalmitis*, Vereiterung und *Phthisis bulbi*. Die Verletzung der Iris selbst ist sehr häufig, aber keineswegs immer sehr schmerzhaft, doch gelten fortdauernde Lebhaftigkeit des Schmerzes, besonders wenn derselbe nach Oberkiefer, Nase, Schläfe und Stirn ausstrahlt, Vomituritionen und andre gastrische Erscheinungen mit Recht für Vorboten beginnender *Iritis*. Temperaturerhöhung der verletzten Wangenseite, Schwellung der Lider bleiben bei weiterem Fortgange nicht aus, *Conjunctival-injection* und *Chemosis* gesellen sich gern hinzu, ebenso Reflexerscheinungen, Fieberhaftigkeit und allgemeines Kranksein. — Bleiben Horn- und Aderhaut intact, so drohen Pupillensperre, Exsudate und Eiterung, wenn die Behandlung ohne Erfolg ist.

Therapeutisch wichtig ist neben der obenangeführten Antiphlogose die sofortige Application eiskalter Fomente, mit denen man 2—3 Tage nützliche Dienste leistet. Man hört mit denselben in der Regel erst auf, wenn sie dem Patienten unangenehm zu werden anfangen, und geht dann zu spirituös-aromatischen Waschungen und Umschlägen über (Tinct. Arnicae montanae mit Spirit. vin. oder Spirit. Roris mar.). Letztere Mittel werden früher statt der Kälte in Anwendung gebracht, wenn von der Erschütterung der Netzhaut oder des Bulbus Lähmungen zu befürchten sind. — Gegen die Exsudation ist Mercur in oben beschriebener Weise das angemessenste Mittel. Der Eiter wird in der Regel resorbirt; nur wenn er die vordere Kammer mehr als zur Hälfte anfüllt, entleere man ihn durch Punction. Vielleicht giebt aber auch hier die Heftigkeit der Schmerzen richtiger den Ausschlag. Innerlicher Gebrauch von Polygala senega soll die Resorption befördern (?).

2) Nur Eigensinn und falscher Begriff von Consequenz kann in Abrede stellen, dass nach mehr weniger heftigen Erkältungen ebenso wie Diarrhœ, Katarrh, Conjunctivitis etc. auch *Iritis* eintreten könne, sowohl für sich als in Verbindung mit Entzündung der Horn-, Bindehaut und des Corpus ciliare. Selten beginnt diese Art sehr heftig, meist nach Vorboten von einigen Tagen (*Conjunctivitis* und Reflexsymptomen), dann aber äussert sie sich plötzlich durch lebhafteste, stechende Schmerzen, die über die ganze Kopfhälfte sich fortsetzen. Zu den häufigsten objectiven Symptomen gehören Unbeweglichkeit und Verengerung der Pupille und Vergrösserung der vorderen Kammer durch reichliche seröse Ergüsse. Die Iris erscheint dabei abgeflacht, die Cornea glänzend und stärker gewölbt. — Bei schleichendem Auftreten ist im Gegentheil die Hornhaut glanzlos und durch punktförmig präcipitirte Exsudathäufchen auf der *Membr. Descemet.* undurchsichtig (fälschlich als *Hydromeningitis* beschrieben). — Längere Vernachlässigung kann zur Complication mit *Chorioiditis* hinführen, was sich durch grössere Gesichtsstörung, Flammensehen, Pupillendilatation anzeigt und die Gefahr bedeutend steigert.

Im Beginn dieser *Iritis* wird ein anticatarrhalisches Regime angeordnet. Patient muss bei gleichmässiger Temperatur und geringer Verdunkelung des Zimmers das Bett hüten, Ruhe und absolute Schonung des leicht verhängten Auges beobachten, Haut und Darmcanal müssen mässig bethätigt werden. Kräftigen Individuen mache man bei stärkerer Entzündung eine Venæsection, in der Regel genügen 8—12 Blutegel und stundenlange Beförderung des Nachblutens durch warme Tücher. Dann Ung. ciner. mit Extr. Belladon. und innerlich kleine Dosen Calomel und abwechselnd damit Tart. stib. in refr. dosi und pulv. Doweri. Um Recidiven vorzubeugen, muss noch längere Zeit jede Schädlichkeit gemieden und durch Empl. Canth., Schröpfköpfe in den Nacken, reizende Fussbäder u. dgl. für angemessene Ableitung Sorge getragen werden.

3) Selbst von den hartnäckigsten Lägern jeder Specificität von Ophthalmien wird die s. g. *Iritis syphilitica* als diejenige Erkrankung zugegeben, welche in hohem Grade einen directen Zusammenhang des Localleidens mit dem allgemeinen Uebel anzunehmen zwingt. Feststeht, dass bei vorhandener recenter und inveterirter Syphilis selbst auf die geringfügigste locale Veranlassung die Iris sich entzündet, mag Trauma, Zugluft, Katarrh oder übermässige Anstrengung das Auge insultirt haben. In der Regel tritt diese *Irit. syphil.* monocular auf und deutet sich, wenn keine örtliche Vorkrankheit da war, oft nur durch penetrirenden Schmerz im Auge und der benachbarten Stirnpartie an. Tags über bemerkt der Patient dann nur eine in geringem Grade gesteigerte Empfindlichkeit und mühsameres Sehen, zumal feinerer Gegenstände, Abends schies-

sen heisse Thränen hervor, Kerzenlicht incommodirt, Eingenommenheit des Kopfes gesellt sich hinzu, im Bette, wo Patient Erleichterung erwartet, nehmen plötzlich alle Erscheinungen zu und der heftigste Augen- und Stirnschmerz stellt sich ein und raubt bis in die Morgenstunden Ruhe und Schlaf. Bei der Untersuchung findet man meistens sofort Klumpen oder Fäden des bei dieser *Iritis* sehr faserstoffigen Exsudates, anhaftend sowohl am Ciliar- als am Pupillarrande der hinteren Irisfläche, aber auch in der Form graugelblicher Knötchen oder Flecken in die Substanz der Iris eingesenkt. Oft kommen sie erst bei künstlich bewirkter Pupillendilatation zum Vorschein, sie können aber auch über Nacht entstehen und zwar in Folge der ungewöhnlichen Plasticität des sie bildenden Exsudates. Das bei *Irit. syphil.* gebildete Exsudat ist niemals serös und hat ebensowenig Neigung eitrig zu zerfallen, welches Beides bei anderen Iritiden zu den häufigen Vorkommnissen gehört. Wegen dieser Plasticität verursacht es auch häufiger Atresie der Pupille, Synechie, besonders posterior und jene Verzogenheit der Pupille, die einfach mechanisch durch Fixation der hintern Iriswand auf der Kapsel zu Stande kommt und desshalb nicht mit Unrecht als Characteristicum der *Irit. syphil.* gilt. — Uebrigens können, wie ich mich wiederholt überzeugt habe, alle Erscheinungen, die man als characteristisch für die syphilit. Iritis angegeben hat, auch bei nichtsyphilitischen Individuen vorkommen, besonders jene Knötchen, die *Walther* für Condylome halten zu müssen glaubte, und jene punctirte Trübung der Descem. Membran. — Vernachlässigt kann die *Iritis syphil.* nicht nur auch auf das andere Auge überspringen, sondern sich auch auf die *Chorioidea* fortsetzen, in welchem Falle dann die Sehstörung bei grosser Pupille bedeutender ist und der Process mit *Atrophia bulbi* zu endigen pflegt. — Dass auch Kinder nicht verschont werden, beweist ein *Gräfe'scher* Fall (Arch. I. p. 433), bei dem angeborene Syphil. Iritis und Entartung der Nerven zur Folge hatte. Der ungleichmässig verdünnte Oculomotorius hatte Ptosis bewirken müssen.

Therapeutisch muss gegen das dyscrasische Leiden sofort ernstlich Hülfe geschafft werden und zwar durch Calomel am passendsten, welches durch das Localleiden zugleich indicirt wird. Man gibt es zu $\frac{1}{2}$ gr. 4 mal täglich mit etwas Opium, um die Salivation so lange als möglich zurückzuhalten. Nur bei hochgradiger Entzündung sind Blutegel nöthig, doch zögere man nicht, den Patienten im Bette festzubannen, das Auge warm und leicht zu bedecken und graue Salbe mit Extr. Opii aquos. reichlich in Stirn und Schläfe einzureiben. — Statt des Calomels methodische Curen in Anwendung zu bringen (Sublimatpillen in steigender Dosis, Entziehung und Holztränke), wird man nur in inveterirten Fällen Veranlassung haben. — Wenn durch unpassenden Mercurgebrauch auch das Jodquecksilber

nicht mehr indicirt erscheint, so muss man zum Jodkali seine Zuflucht nehmen; aber man vergesse nicht, dass durch dessen Anwendung dem örtlichen Uebel nicht in gleichem Grade Einhalt gethan wird.

4) Die oben besprochene chronische Iritis hat man vorzüglich bei Individuen zu beobachten Gelegenheit, deren übrige Krankheitssymptome man mit dem Collectivnamen *Scrophulosis* bezeichnet. Selten leidet nur eine Iris, meist beide abwechselnd und in der Regel in Complication mit anderen Augenorganen. Der Verlauf ist ein schleichender, die Besserung nur eine scheinbare und die Iris häufig wenig für die äussere Besichtigung verändert. Das Exsudat wird durch das Kammerwasser fortgespült und mehr weniger reichlich auf der hinteren Corneawand präcipitirt, der Art, dass diese für erkrankt gehalten worden ist (*Hydromeningitis*). Kommen starke Exsudatanschübe, so können sie die Iris vollständig mit der Cornea verkleben (*Synechia anterior*), um später zu *Hypopyon* und Atrophirung des Auges hinzuführen. Dasselbe Resultat kann durch Complication mit *Chorioiditis* zu Stande kommen.

Im Allgemeinen ist übrigens die chronische Iritis sehr variabler Natur, wesshalb in jedem Falle genau individualisirt und die Cur nach dem vollständig erforschten Zustande des Gesamtorganismus eingerichtet werden muss. Unmöglich lassen sich für alle speciellen Fälle allgemein gültige Regeln aufstellen. — Gegen die Iritis selbst müssen die entsprechenden Modificationen der oben angegebenen Heilregeln angewendet werden. Ist hinter der Cornea viel seröses Exsudat deponirt, so kann man durch Emetica die Resorption zu bethätigen versuchen, im Fall des Misslingens aber die Entleerung durch Einstich in die Cornea vornehmen.

Häufig ist das Allgemeinbefinden der Art, dass antiphlogistische Behandlung entschieden verwerflich und vielmehr eine tonisirende und roborirende am Platze ist. *Arlt* empfiehlt nach *Fischer's* Vorgange Eisenpräparate mit Aloe, Myrrhe, Sabina, Borax u. dgl. m., wenn Menstruationsanomalien in ursächlicher Verbindung mit der Iritis zu stehen scheinen.

Corectopie und Polykorie, Seitenlage der Pupillen und Vorhandensein mehrerer Pupillen.

Pupilla excentrica wird erworben und angeboren beobachtet. Die erworbene ist verschieden geformt, länglich, rund, oval und spaltförmig, je nach der Einwirkung der Verletzung, Entzündung, *Synechia* u. s. f.; in höheren Graden geht sie in das erworbene *Coloboma* über. Nicht selten bildet eine zufällige Verletzung eine schönere Marginalpupille, als es durch die vorsichtigste *Koremorphose* gelingt. Seltner kommt sie angeboren vor. Geringere Grade haben keinen

Nachtheil. Liegt die Pupille im obern Theile der Iris, so pflegt das Oberlid sich mehr zu heben, der Bulbus sich mehr nach Abwärts zu wälzen, damit die Pupille den Lichtstrahlen zugänglich ist, wenn überhaupt das Auge fungirt.

Mehrere Pupillen kommen als Hemmungsbildungen nicht selten vor, traumatische sind seltner. Meist sind gleichzeitig anderweitige Missbildungen vorhanden. Oft ist die zweite und dritte Pupille so klein oder vom Oberlide bedeckt, dass keinerlei Störung erfolgt. Man hat aber auch zwei centrale beobachtet, die nur durch den Zusammentritt des Sphincter getrennt und der Erweiterung und Verengung fähig waren.

Operative Hülfe wird kaum je verlangt werden, zumal meistentheils das Sehvermögen gar nicht oder doch nur wenig gestört ist. Die Patienten werden gewohnt, durch entsprechende Accommodation und Stellung des Bulbus von der möglichen Störung zu abstrahiren.

Irideremie, Mangel der Iris,

kommt total oder theilweise und angeboren oder erworben vor.

1) *Irideremia congenita* kommt fast stets auf beiden Augen zugleich vor und scheint erblich zu sein, besonders bei männlichen Individuen. In den meisten Fällen fehlt die Iris gänzlich, nur der Foetalring, der im dritten Monat als Ringleiste beobachtet wird, ist vorhanden, die Irisbildung aber gehemmt worden. Beide Kammern bilden desshalb nur einen Raum, übrigens kann Alles normal sein. Doch findet man die Cornea wohl mehr länglich und nicht deutlich von der Sclera abgegränzt. Das Sehen ist verhältnissmässig wenig gestört, der Patient scheint kurzsichtig, weil er von nahen Objecten deutlichere Bilder erhält. In beschatteten Räumen sieht er besser, weil ihm der Lichtreiz nicht so nachtheilig ist. Bei längerem Gebrauche pflegt die Lichtscheu indess sich zu verringern, die in der Kindheit sehr störend sein kann. Der Grund des Auges ist nie so purpurschwarz, als im Normalzustande, häufig in's Braune und sogar in's Rothe spielend. Um weniger Strahlen auf die Netzhaut gelangen zu lassen, pflegen die Kranken die Lider nur beschränkt zu öffnen, wodurch oft eine zu enge Lidspalte permanent herbeigeführt wird. Ausserdem bildet sich nicht selten Nystagmus, Strabismus convergens und Richtung der bulbi nach Unten hin aus. Sogen. *Amblyopie* wird nur selten gleichzeitig beobachtet.

Irideremische Augen sollen Entzündungen leichter ausgesetzt sein, die Netzhäute werden höchstens etwas stumpfer. Blaue Brillen, Schutzbrillen, die nur 1—2'' weit Licht durchfallen lassen, übrigens es vom Auge abhalten, helfen in der Regel wenig und werden desshalb von den Patienten meist bald wieder bei Seite gelegt.

2) *Irideremia acquisita*, total oder theilweise, wird nicht selten auf mechanische Insulte beobachtet. Stösse vor das Auge haben oft eine theilweise oder gänzliche Lösung der Iris vom Ciliarbande zur Folge. Einem Wärter der chir. Klinik in Bonn hatte nach einem Wurf mit einem Messer, welches auch die Cornea und Sclera eingeschnitten, die halbe Iris sich abgelöst, aufgerollt und war so verwachsen. Die halbe Cornea zeigte einen rauchig dunklen Hintergrund, doch konnte Patient gröbere Schrift noch wohl lesen und meinte, im Allgemeinen nicht im Sehen behindert zu sein. *Desmarres* spricht von einem Falle, wo sich bei unvorsichtiger Ausführung der Iridodialysis die Iris in der ganzen Peripherie ablöste.

Die Cur ist antiphlogistisch, so lange Entzündungssymptome vorhanden sind, anzuordnen, hernach können Schutzbrillen gegen zu starke Lichteinwirkung versucht werden (*Wardrop* u. A.).

Iridodonesis, Iriszittern,

Schlotternde Bewegung der Iris, besonders des grossen Irisringes, von Vorn nach Hinten, analog der durch Wellenschlag veranlassten, mitgetheilten Bewegung eines in Wasser lose ausgespannten Tuches. Dieser stets pathologische Vorgang, bei dem die Kammern abwechselnd sich vergrössern und verkleinern, kommt vorzugsweise dann vor, wenn sich zwischen der hintern Irisfläche und der Linse mehr als ein Minimum Kammerwasser befindet und dadurch die Iris die Stütze an der Linse verliert, die sie zu einer ruhigen Lage bedarf. So lange der Bulbus ruhig ist, verhält sich auch die Iris ruhig; sie schlottert aber, so bald der Bulbus oft nur geringe Bewegungen macht. Bewegungen des Kopfes haben nicht den Einfluss auf die Iris, um sie schlottern zu machen. Die Contractionsfähigkeit ist in der Regel wenigstens etwas verringert, oft aufgehoben; an und für sich ist die *Iridodonesis* überhaupt von keinem wesentlichen Nachtheile und dürfte auch die Deutlichkeit des Sehens nur nebensächlich beeinträchtigen. Jede Gesichtsstörung ist vielmehr, wie das Iriszittern selbst, nur Symptom einer anderweitigen Anomalie.

Die Ursachen des Zitterns sind bis jetzt nicht bis zur vollständigen Evidenz nachgewiesen. Man beobachtet es gewöhnlich nach Dislocationen der Linse, sowohl spontanen als operativen, weil hier, wie angeführt wurde, die Iris nach Hinten jeden Rückhalt einbüsst. Sie besteht so lange, oft Jahre lang, bis entweder die Muskelfasern der Iris allein stark genug geworden sind, die Iris in fester Spannung zu erhalten, oder bis, was hauptsächlich der Grund des Aufhörens zu sein scheint, der Glaskörper der Art in die Stelle der Linse getreten ist, dass er nun die Iris hinterwärts stützen kann.

Eine zweite Ursache der *Iridodonesse* ist die Lockerung der Linse in ihrer Befestigung an der Zonula oder dem corpus ciliare, welche mitunter so erheblich wird, dass die Linse um ihre ganze Dicke vorwärts treten und sogar bis in die vordere Kammer gelangen kann. Ist die Iris nicht so weit geöffnet, dass die Linse durchtritt, so muss sie natürlich der Linse folgen und mit ihr vor- und zurückweichen.

Zu den Veranlassungen gehört ferner Lähmung der Iris, abnorme Grösse der vordern Kammer z. B. bei *Keratoconus*, Dünnflüssigkeit und Vermehrung oder Verminderung des Glaskörpers, Atrophie des Auges. *Desmarres* will das Zittern auch angeboren beobachtet haben. Verflüssigung der Linse mit Fortbestehen eines harten Kernes, ebenso traumatische Eingriffe, besonders wenn sie mit *Commotio bulbi* complicirt waren, werden ebenfalls zu den Veranlassungen gerechnet.

Das Uebel, an und für sich geringfügig und nur Symptom eines anderen Leidens, erhält seine Bedeutung stets durch dieses. Prognose und Therapie sind deshalb auch stets auf dieses gerichtet.

Hippus

bezeichnet den klonischen Iriskrampf, einen schnellen Wechsel von Contraction und Dilatation der Pupille, der im Licht und Dunkel gleichmässig fortbesteht und meistens nur bei sehr genauerer Betrachtung des Pupillarrandes der Iris entdeckt wird. Die Patienten wissen häufig selbst nicht von diesem Uebel, da es nicht immer mit Gesichtsstörung verbunden auftritt und Jahre lang ohne anderweitige Complication bestehen kann. Steigert sich aber der Erethismus der Netzhaut, auf dem es zu beruhen pflegt, so muss ernstlich die Veranlassung, z. B. tägliches Mikroskopiren, in Folge dessen ich Retinal-erethismus mit *Hippus* mehrere Male auftreten sah, gemieden werden.

Myosis, abnorme Verengerung der Pupille (*Stenocoria*),

mit mehr weniger aufgehobener Beweglichkeit und von Störung der Nerventhätigkeit herrührend, bildet gewissermassen das Gegentheil von *Mydriasis*. Wie Ablösung der Iris vom Ciliarbande nicht als *Mydriasis* gelten, so rechnet man Pupillarverengerung durch Exsudate, Verwachsung, auch entzündliche nicht zur *Myosis*. Bei krankhafter Steigerung der Thätigkeit des *n. oculomotorius* wird die *Myosis* durch tonischen Krampf bewirkt und steht dann im Gegensatze zu dem klonischen Iriskrampfe, dem *Hippus*. Das Licht und mydriatische Mittel haben noch einigen, aber meist sehr geringen Einfluss auf die Iris, die übrigens normal zu sein pflegt. Anhaltende Beschäftigung mit sehr feinen Arbeiten gibt zu dieser *Myose* Veranlassung, die *Arlt* als habituelle Contraction

des *sphincter iridis* betrachtet wissen will und als analog dem Zustande der *mm. recti* bei *Strabismus* bezeichnet. Es ist unzweifelhaft, dass verringerte Thätigkeit der *nn. vag.* und *sympathic.*, gesteigerte des *n. trigeminus* und Retinalirritation gleichzeitig zur Erzeugung dieser habituellen Pupillarverengung mitwirken. Einige Male hat man sie bei Retinalhyperæsthesien, z. B. der *Nyctalopie* beobachtet. (Siehe diese.) — Als entgegengesetzt bezeichnet *Arlt* die von Erkrankung der *med. oblongata* herrührende *Myosis*, die nach ihm der Spinalamaurose vorhergeht und auf verminderter oder aufgehobener Energie der Radialfasern der Iris beruht.

Die Pupille ist oft bis auf eine halbe Linie im Durchmesser verengt, das Sehen auf Abstand aufgehoben und in der Nähe nur durch starkconvexe Gläser zu bewirken.

Therapeutisch ist nach den veranlassenden Momenten zu verfahren. Man hat Arbeiten in feinen Dingen (Uhrmacher- und Graveurarbeit u. dgl. mehr) wo möglich gänzlich zu untersagen und häufigen Aufenthalt im Freien anzuempfehlen.

Willebrand theilt einen lehrreichen Fall von *Myosis* mit, die durch den Druck hypertrophischer und verhärteter Lymphganglien auf den *plexus brachialis*, also auf den Cervicaltheil des *nerv. sympathicus* hervorgerufen war und durch Vertheilung dieser Geschwulst (vermittelst Jodkali, warmer alkalischer Bäder etc.) vollständig geheilt wurde.

Mydriasis, abnorme Erweiterung der Pupille, als längere Zeit dauernder Zustand und mit gänzlicher oder theilweiser Unbeweglichkeit der Iris complicirt, kommt auf verschiedenartige Weise zu Stande. Oft ist sie der Art gesteigert, dass nur noch ein schmaler Streifen der Iris vorhanden ist und die Erscheinung der *Irideremie* ähnlich wird. Da die Pupille mehr Licht eindringen und reflectiren lässt, so wird der Grund des Auges mehr erleuchtet, als normal und erscheint desshalb statt purpurschwarz bleich und rauchig; aus demselben Grunde ist der Patient stets von dem *Plus* eingedrungenen Lichtes geblendet und sieht desshalb schlechter, besonders in der Nähe. Dass die Retina in den einfachen Fällen normal fungirt, ist leicht dadurch zu beweisen, dass man dem Patienten in Gestalt eines geschwärzten, pupillengross durchbohrten Chartenblattes ein Diaphragma, eine künstliche Blendung vor das Auge bringt, bei deren Anwendung er stets, wenn nicht gut, doch bei weitem besser sehen können wird. Man hat nach diesem Experimente mydriatische Brillen construirt, um die Lichteinwirkung zu beschränken. Uebrigens beschatten und schonen solche Kranke ihre Augen auf jede Weise, sowohl um zu viel Licht, als auch um anderweitige Reize, die Entzündungen veranlassen könnten, abzuhalten. An und für sich steht *Mydriasis* mit keinerlei

Entzündungs- oder Congestivzuständen in causalem Zusammenhange.

Physiologisch muss die Entstehung der *Mydriasis* auf Lähmung der circularen Irisfasern (des *Sphincter Iridis*) oder auf Krampf der radialen zurückgeführt werden, d. h.

- 1) auf verminderte Energie der Ciliarnervenfasern, die vom *N. oculomotorius* kommen,
- 2) auf gesteigerte Energie derjenigen, die vom *Sympathicus* kommen, (— nicht vom *Vagus*, woran *Arlt* zu denken scheint).

Zu der *Mydriasis paralytica* gibt nun jeder Umstand Veranlassung, der mehr weniger lähmend auf die Function des *N. oculomotorius* wirkt. Künstlich erzielen wir diese Lähmung durch die mydriatischen Mittel (Sulphas Atropini, Extr. Belladonna, Hyoscyam. Stramonii etc.); es können diese Mittel aber auch bei Vergiftungen ihre mydriatische Wirkung äussern, wo dann der Zustand der Pupille zur Aufstellung der Diagnose dienlich wird. Längeres Verweilen an dunklen Orten wirkt auf dieselbe Weise. Ebenso können feuchte, scharfe Luft, die den erhitzten Kopf trifft, Verletzungen durch Erschütterung und Bluterguss, Entzündungen durch Exsudat, besonders bei stattfindender Prädisposition durch geistige und körperliche Ueberreizung vorübergehende oder hartnäckige Lähmung des *N. oculomotorius* herbeiführen.

Mydriasis spastica erfolgt häufiger durch alle Affecte, welche die Thätigkeit des *Sympathicus*, besonders im Unterleibe, steigert, also Masturbation bei männlichen und weiblichen Individuen, Wurmreiz, Hyperemesis und andere gastrische Störungen, Hämorrhoids, Hypochondrie, Hysterie; Trunksucht wird ebenfalls genannt.

Oft ist es sehr schwer zu ermitteln, auf welchem Wege die *Mydriasis* zu Stande kommt, besonders da, wo sie erblich auftritt. Mit anderen Localkrankheiten des Auges complicirt, ist *Mydriasis* eine häufige Erscheinung (Paralyse der Augenmuskeln und Lider, Accommodationsparese, Amaurosis, Markschwamm der Netzhaut, Chorioidealexsudat u. s. f.), tritt dann aber als secundäres Leiden in den Hintergrund.

Therapeutisch ist zunächst das Grundleiden in Betracht zu ziehen und in angemessener Weise zu bekämpfen. Gegen das Localübel hat man Specifica anpreisen zu dürfen geglaubt: *Secale cornutum*, *Euphorbia cyparissias* u. dgl. m. Oertliche Reize nützen in frischen Fällen unzweifelhaft, sowohl mittelbare als Vesicat, und Einreibungen in Stirn und Schläfe, als auch Ammoniakdämpfe, Opiumtinctur, Electricität etc. direct auf das Auge. *v. Gräfe* hat von forcirtem und methodisch wiederholtem Lidschlag, die er antimydriatische Uebungen nennt, einige Male bedeutende Besserung gesehen. Oft verliert sich die *Mydriasis* mit den Complicationen, z. B. der Accommodations-

parese, gegen welche Leiden desshalb ebenfalls die Cur gerichtet sein muss, z. B. der Gebrauch von Convexgläsern.

Synicesis Iridis s. *Atresia pupillae*, Pupillensperre, bezeichnet denjenigen Zustand dieser perforirten Membran, in welchem dieselbe zu einer theilweise oder gänzlich imperforirten geworden ist und zwar der Art, dass das Sehevermögen wesentlich beschränkt oder aufgehoben ist. Es muss also die perforirte Stelle, die Pupille, aufgehört haben. Unpassender Weise rechnen einige Autoren auch Blindheiten, durch Verdunkelungen der Hornhaut, der tellerförmigen Grube u. d. veranlasst, hieher. Mit demselben Rechte dürften Pseudocornea und Linsentrübungen genannt werden.

Die Pupillensperre kommt angeboren und erworben vor.

1) Die angeborene. Die *Membr. pupillaris Wachendorffiana*, die vor der Geburt schwinden soll, besteht in sehr seltenen Fällen längere oder kürzere Zeit fort, meistens nur in Rudimenten, aber auch total, fest, weisslich, weissgrau, oft schwärzlich und mit Gefässen durchzogen. Meistens bildet sie sich in der ersten Lebensperiode ohne Zuthun der Kunst zurück. Sie kann aber auch fortbestehen und ist dann Object der *Koremorphose*. 1728 heilte *Cheselden* zum ersten Mal einen 14jährigen Kranken dieser Art durch Anlegung einer neuen Pupille mittelst der Iridotomie.

Ein ähnlicher angeborener Zustand wird nach foetalem Verlauf einer *Iritis* beschrieben, doch fehlt es über diese Genese an hinreichend genau beobachteten Thatsachen.

2) Die erworbene ist bei weitem häufiger und entsteht nach sehr verschiedenartigen, meist entzündlichen Vorgängen.

a. Nach exsudativer Iritis. Das Exsudat spannt sich entweder in einzelnen Pseudoligamenten durch die Pupille, verhindert deren Ausdehnung im Lichte oder zieht sie geradezu zusammen, oder es verlöthet den Pupillartheil der Iris mit der Linsenkapsel, so dass eine *Synechia posterior* entsteht, oder es lagert sich im Pupillarraume selbst ab und organisirt sich daselbst, mehr weniger dick und undurchsichtig, fest mit der Iris verwachsen und oft auf der Kapsel aufliegend. Die Farbe dieses Exsudatpfropfes ist verschieden, weiss, weissgrau, schmutzig gelb, von durchgehenden Blutgefässen in's Röthliche spielend, von Uvealpigment dunkelbraun und sogar schwarz. Zieht sich das Exsudat später auf ein geringeres Volumen zurück, so wird die Pupille kleiner; die Spannung in der Iris kann so bedeutend werden, dass sie vom Ciliarbände abgerissen wird und eine spontane Iridodialyse zu Stande kommt. Andere Male ist nur so viel Exsudat vorhanden, als erforderlich ist, um den Pupillarrand verwachsen und die Pupille unmittelbar sich verschliessen zu lassen.

Hæmorrhagia interna, *Hypopyon* und *Discisio lentis* können ebenfalls Sperre veranlassen, wenn nämlich die Aufsaugung der festen Bestandtheile derselben nur unvollständig erfolgt und die Reste in der Pupille sich festsetzen und verwachsen.

Sind die genannten Formen für sich vorhanden, so lässt sich durch die Bildung einer neuen Pupille Herstellung des Sehvermögens erzielen. Tritt aber Sperre durch Zusammenfaltung der Iris bei *Atrophia bulbi* ein, so ist keine Hülfe möglich.

Ebenso können die mannichfaltigsten Complicationen jede Hoffnung auf Genesung nehmen, ausgedehnte Cornealtrübungen, Leiden der Netzhaut, der Chorioidea u. d. Gleichzeitige *Iritis* trübt die Prognose nicht; es kann sogar, wenn die *Iritis* die Sperre veranlasste, eine passende Antiphlogose zugleich die *Iritis* und die *Atresie* beseitigen. Eine cataractöse Linse pflegt man durch denselben Operationsact zu entfernen, durch welche das in der Iris liegende Gesichtshinderniss beseitigt wird.

Das Curverfahren besteht hauptsächlich in der Bildung einer künstlichen Pupille; doch ist es nöthig, bevor man sich zur Operation entschliesst, den Thatbestand möglichst genau aufzunehmen, weil noch bestehende Entzündlichkeit der Iris die Operation zu verschieben zwingt, Anæsthes. opt. und andere Complicationen sie aber gänzlich contraindiciren können.

Synechia posterior, sc. Iridis, hintere Verwachsung

der Iris, kommt selten total, häufig partiell vor und ist bei der Auflagerung der Iris an die vordere Linsenkapsel fast unausbleibliches Resultat jeder *Iritis* mit einigermaßen plastischem Exsudate. Bei totaler hinterer Synechie ist die Iris vollständig unbeweglich, bei partieller wird die Bewegung der Iris an der Anlöthungsstelle aufgehoben, der Art, dass bei Verengerung der Pupille ein Einschnitt, bei Erweiterung eine Spitze im Pupillarrande erscheinen kann, welche letztere bei weisslicher Färbung des Exsudates leicht zu sehen ist. Schwieriger ist die Wahrnehmung, wenn Uvealpigmente dem Exsudate auflagern, die es so schwarz wie der Augenhintergrund erscheinen lassen. Die Unterscheidung von demselben ist mit Hülfe des Augenspiegels sehr leicht, bei einiger Uebung aber auch mit der Loupe nicht schwierig. Oft werden hintere Synechien erst wahrnehmbar, zumal bei Verwachsung des grossen Irisringes mit dem Kapselrande, wenn die Pupille durch mydriatische Mittel sehr dilatirt ist. Das Gesicht leidet nur bei totaler oder solcher partiellen Synechie, die ganz im Pupillarrande stattfindet und die Beweglichkeit der Iris auf ein Minimum beschränkt.

Durch rechtzeitige Anwendung der Belladonna oder besser des Atropins, d. h. vor Erhärtung des Exsudates kann man oft Synechien vorbeugen. Aeltere sind fast nie, frische Synechien nur selten durch Mydriatica zu beseitigen. Operative Lösungen setzen die Linse in Gefahr, getrübt zu werden. — Innerlicher

und äusserlicher Gebrauch von Mercur und Jodkali unter gleichzeitiger Dilatation durch Atropineinträufelung führt am sichersten zur Beseitigung, doch bleiben meistens sehr störende Flecken auf der Kapsel zurück.

Coloboma Iridis, Irisspalte

ist ein hasenschartähnlicher Zustand von Hemmungsbildung im Auge, der wie ähnliche Hemmungsbildungen nicht selten erblich auftritt und an der Iris, die V förmig mit der Spitze nach dem Ciliarrande gespalten zu sein pflegt, schon im Leben sichtbar ist. *Albinus* hat den keineswegs seltenen Defect zuerst beschrieben, doch ist er in seiner Entstehung bis jetzt noch nicht mit hinreichender Sicherheit erforscht und festgestellt worden. In manchen Fällen ist die V Form nicht genau vorhanden, die Schenkel laufen mehr weniger parallel, divergiren oder treten früher zusammen. Oft ist die Form durchaus unbestimmt, andere Male ist der *Sphincter Iridis* vorhanden und die Spalte beginnt erst in der Substanz und es existirt gewissermassen eine zweite Pupille. In wieder andern Fällen ist nur die oberflächliche Irisschichte gespalten, während die tiefere pigmentirte oder Uvealschicht nicht unterbrochen ist. Der Sphincter ist in der Regel nur theilweise vorhanden, was durch die Art der Irisverengerung und Erweiterung hervorgeht, die nur an dem der Spalte gegenüberliegenden Theile, gewöhnlich dem oberen, in normaler Weise der Fall ist. Die Thätigkeit der Netzhaut und das Accommodationsvermögen pflegen nicht beeinträchtigt zu sein. Oft wissen die Patienten nicht einmal von dem Uebel, selbst wenn es beiderseitig vorhanden ist. Doch sollen Linsentrübungen verhältnissmässig häufiger vorkommen. Das linke Auge ist dem Uebel häufiger und im höheren Grade unterworfen, andere Missbildungen, wie Hasenscharte, Hypospadias, Coloboma palpebr., Hydrocephalus, begleiten oft die Irisspalte.

Pathologisch anatomisch ist festgestellt worden, dass die Spaltung sich keineswegs einzig auf die Iris beschränkt, vielmehr ursprünglich von der Choroidea herrührt, die sich zu spät vollständig abschliesst und dadurch den Irisspalt veranlasst. Spaltungen, die nicht nach Unten gerichtet sind, würden demnach nicht als Hemmungsbildungen, sondern als pathologische zu betrachten sein.

Laesiones Iridis,

Die Iris kann durch Stich, Schnitt, Quetschung, Risswunden und eingedrungene fremde Körper gefährdet werden. Nadeln, Stacheln und Splitter jeder Art können stechend wirken, nachdem sie die Horn- oder Lederhaut durchdrungen haben, Pupillenverengerung stellt sich sofort ein, darnach Bluterguss, endlich wohl Entzündung, doch

bleibt letztere, wie man häufig genug bei unvorsichtigen Staaroperationen erlebt, auch aus. Durch angemessene Antiphlogose und künstliche Dilatation wird meist jeder Nachtheil verhütet. — Schnittwunden, durch Säbel, Messer oder ungeschickte Führung des Staarmessers beigebracht, heilen ebenfalls unter derselben Behandlung meist günstig. Nur Complication mit bedeutender Cornealverletzung oder Substanzverlust der Iris stellen die Prognose ungünstig. Im letzteren Falle bildet sich gern *Polykorie* aus. — Quetschungen des Bulbus haben leicht Ablösung der Iris vom Ciliarbande und starke Blutung zur Folge, doch kehrt das Sehvermögen nach strenger Antiphlogose und nachfolgender Anwendung resorbirender Mittel häufig zurück.

Fremde Körper als Glas- und Metallsplitter, Zündhütchenfragmente, Pulverkörner u. dgl. gelangen bei Explosionen leicht in die Iris und zwar meist durch die Cornea. Ist es irgend möglich, so extrahire man sie sofort oder auch später, dann freilich nach gemachtem Hornhautschnitt, während sofort oft die Eingangsöffnung benutzt werden kann. Entzündung bleibt selten aus und erfordert die stärkste Antiphlogose. Einige Male sind die fremden Körper ohne Nachtheil zurückgeblieben, auch sind sie wohl nach längerem Verweilen spontan ausgestossen, meistens führen sie zu perniciöser Eiterung und Verlust des Auges. Leicht folgt traumat. Cataracte.

VI.

Das Linsensystem.

Laesiones systematis lentis.

Verletzungen des Linsensystems, im Allg. nicht selten, betreffen entweder Kapsel und Linse gleichzeitig oder die Kapsel allein, in welchem Falle die Linse erst secundär erkrankt, und rühren von mechanischen Gewalten her, die meist den Bulbus selbst treffen, aber auch von Kopfverletzungen auf ihn fortgepflanzt werden können. Bei lockerem Anheften der hinteren Kapselwand an die Hyaloidea, bei Verflüssigung oder Atrophie des corp. vitreum u. d. a. ist die Wirkung jedes Insultes ungleich erheblicher. Perforirende Stich- und Hieb- wunden der Cornea oder Sclerotica verletzen häufig auch die Linse. Bei grosser Oeffnung fällt sie meist vor, punktförmige Verletzungen haben Trübung mit Erweichung der Substanz (*Cataracta traumatica*) zur Folge, die sich bei gesunden Individuen wieder vollständig verlieren kann. Nach *Lawrence* Berichte sollen Versuche gemacht worden sein, vermittelst Nadel-

stichen durch die Cornea in die Linse diese Trübung zu erzeugen, um sich der Militärpflicht zu entziehen. — Das auf die Linsensubstanz einwirkende Kammerwasser durchdringt dieselbe und löst sie auf, wenn die Einwirkung längere Zeit oder durch eine grosse Kapselwunde statthat. Bei günstigem Verlaufe resorbirt sich die Substanz vollständig, so dass wieder ein Sehen mit Linsendefect, wie nach Staaroperation, möglich ist. — Erschütterungen, sowohl mittelbare als unmittelbare, haben häufig Einrisse in die Kapsel oder Ablösung des Befestigungsapparates der Linse zur Folge, nach welcher letzterer die Linse sich dislociren kann und wegen mangelhafter Ernährung zu entarten pflegt. Uebler wird dieser Zustand noch, wenn die Verletzung sich auf die Zonula Zinnii, Iris, corp. vitreum erstreckte, diese sich entzünden und ihre Entzündungsproducte im Bereiche des Linsensystems ablagern. — Bei Insulten durch stumpfwirkende Objecte auf den Bulbus ist häufig Ruptur der Sclera beobachtet und Hervorgleiten der oft noch viele Monate transparent bleibenden Linse mit der unverletzten Kapsel bis unter die Bindehaut. Dort entartet sie schliesslich zu einem gallertigen, trüblichen und difformen Tumor, um so schneller, je intensiver die consecutive Entzündung sich einstellt.

Therapie. — Die Antiphlogose muss den Umständen angepasst werden. Besonders bei vollsaftigen Individuen kann selbst Venæsection nothwendig werden. Absolute Ruhe, strenge Diät, Application von Kälte und Blutegeln, leichte Laxanzen u. dgl. sind nicht zu entbehren. — Bei gleichzeitig äusseren Verletzungen ist es gut, das Auge zu verkleben, was überhaupt in der ersten Zeit nicht schadet. Erst nach Beseitigung der Entzündung darf Atropine in Anwendung gezogen werden, um die Resorption zu befördern. — Prolabirte Linsen werden am zweckmässigsten durch den Hornhautschnitt entfernt, doch kann man sich in geeigneten Fällen darauf beschränken, sie durch Depression vollständig aus der Sehachse zu entfernen. Linsen unter der *Conjunct.* werden leicht nach Incision der letzteren hervorgezogen. — Hinterher ist meistens der Gebrauch von Staarbrillen indicirt.

Dislocatio seu luxatio lentis spontanea.

Spontane Ortsveränderung der Linse kann, auch aus anatomischen Gründen, nur bei Erweichungszustande des Glaskörpers und gleichzeitiger Relaxation der Befestigungsapparate der Linse stattfinden. Im andern Falle würde sie schneller ihre Transparenz verlieren, als gemeinhin geschieht. Würden die vordern und hintern Lamelle des Strahlenplättchens zerissen, mithin der Petit'sche Canal zerstört, so müsste die Ernährung der Linse aufhören und Trübung erfolgen, aber diese Membranen sind sehr elastisch und verziehen sich mit der Luxation oft sehr bedeutend. Die Senkung tritt, was hierzu

stimmt, nie plötzlich, sondern immer sehr allmählig ein, was *Sichel* bewogen hat, drei Stadien der Senkung anzunehmen. Das erste Symptom pflegt Verschlechterung der Sehkraft, zumal bei der Betrachtung kleiner Gegenstände zu sein. Die Beweglichkeit der Linse theilt sich der Iris mit (*Iridodonesis*), auch den gesehenen Objecten, die zu schwanken scheinen. Bei weiterer Senkung ändert sich die Sehkraft und Sehweite. Die Gegenstände, nur undeutlich sichtbar, scheinen ausserdem verschoben und nach den Randpartieen hin verwaschen und farbig begränzt. Die Pupille erweitert sich, oft in dem Grade, dass bei entsprechender Kopfhaltung die Linse in die vordere Kammer gelangt. Dabei tritt dann Doppeltsehen auf, durch den von der Linse verlassenen Theil der Pupille und durch den Randtheil der Linse, und zwar dergestalt, dass im ersteren Falle das Bild die Gegenstände näher, im anderen Falle dieselben mehr entfernt erscheinen lässt. Oft ist der Kranke selbst im Stande, den gesunkenen Rand zu sehen und zwar als eine missfarbige, nach der entgegengesetzten Seite gerichtete Scheibe. Mittelst des Augenspiegels und der entoptischen Platte lässt sich diese Scheibe unschwer nachweisen. Die stete Undulation der Linse führt schliesslich zur Reizung und Entzündung. Wird nicht geholfen, so kann das Auge verloren gehen, obwohl Fälle bekannt gemacht sind, wo die Linse nach heftigem Stosse auf den Bulbus durch eine Scleraruptur vorgefallen war, ohne erhebliche entzündliche Reizung.

Therapie. — Im Beginn der Senkung kann durch Convexbrillen einige Besserung des Gesichtes bewirkt werden. Späterhin kann nur die Wegnahme der luxirten Linse der Zerstörung des Auges vorbeugen. Methode und Effect der Operation sind wie bei Staar und häufig von vollkommen günstigem Erfolge gewesen. Es müssen später starke Convexgläser (2—5) gebraucht werden. — *v. Gräfe* jun. erwähnt einer durch seitliche Verschiebung der Linse bewirkten *Diplopia monocularis*, bei welcher, je nachdem das durch die Linse oder das neben der Linse entstehende Bild fixirt wurde, sowohl starkes Convexglas als auch starkes Concavglas vor demselben Auge die Tragweite desselben zu steigern im Stande war.

Phakitis und Periphakitis,

Entzündung der Linse und der Linsenkapsel kann in der Weise, wie wir uns inflammatorische Processe vorzustellen pflegen, nicht angenommen werden. — *Ph. v. Walther* sprach vor 50 Jahren zuerst von solcherlei Uebeln, doch stehen die zuverlässigsten Beobachtungen der Annahme derselben entgegen. Die inflammatorischen Producte, welche nicht selten im Bereiche des Linsensystems vorkommen, sind nicht auch innerhalb desselben entstanden, sondern von Iris und Corp. ciliare her, wie bei der s. g. *Hydromeningitis*,

angeschwemmt und angelagert. Ebenso gehören Gefässe in diesen Anlagerungen nur diesen selbst und nicht der Linse oder ihrer Kapsel an. Ursprünglich besitzen beide Organe weder Nerven noch Blut- oder Lympfgefässe und sind deshalb nicht entzündungsfähig. Die Linsentrübung nach Kapselverletzung ist mechanischer und im weiteren Verlaufe chemischer Natur. Verdunkelte Kapseln lassen sich fast stets durch Maceration wieder glasshell darstellen. — Hochgradig entwickelte Pseudomembranen, welche mehr weniger zerstörte Kapseltheile in sich aufgenommen haben, können allerdings leicht zu dem Irrthume hinführen, als habe man es mit einer durch genuine, die Kapsel selbst betreffende Entzündung und deren Ausgänge entarteten Kapsel zu thun. (Cfr. *Arlt*. II. pag. 261.) Vorsichtige mikroskopische Untersuchung kann allein vor dieser Missdeutung schützen. (Siehe Kapselstaar.)

Cataracta, der graue Staar.

Jede partielle oder totale Verdunkelung der Linse oder der Kapsel wird Staar genannt, ein Name, der desshalb eine grössere Reihe an sich verschiedenartiger Krankheitszustände in sich begreift. Die Alten hatten für die Erscheinung der Krankheit die Namen *Gutta opaca*, *Suffusio*, *Glaucosis*, *Hypochyma* und ähnliche. *Celsus* beschreibt bereitsein sehr zweckmässiges Operationsverfahren. Nähere Kenntniss dieses wichtigen und häufigen Uebels verdanken wir erst dem letzten Jahrhundert, genaue fehlt noch zur Stunde. — Consistenz der Staare variirt durch alle Aggregatzustände, ebenso die Farbe, meist grau, bis in's Lichtweisse und Pigmentschwarze.

Der besseren Uebersichtlichkeit halber behält man noch heutzutage das alte Eintheilungsprincip am passendsten bei und ordnet die Staare in

- 1) Kapselstaare,
 - 2) Linsenstaare und
 - 3) Kapsellinsenstaare,
- ohne indessen mit diesen Namen auch ganz dieselben Begriffe, wie die alten Autoren, zu verbinden.

- 1) Kapselstaar (*Catar. capsularis*).

Die Verdunkelung hat ihren Sitz in der Linsenkapsel und zwar entweder in der vorderen Wand (*C. caps. anterior*) oder in der hinteren (*C. caps. posterior*).

Wir theilen nicht die Ansicht derjenigen, welche behaupten, die Kapselverdunkelung habe ihren Grund in einer Veränderung der Structur und Textur der Kapsel. Diese ist an sich keiner Alienation durch Inflammation unterworfen (siehe *Periphakitis*), kann aber durch An- und Auflagerung entzündlicher Producte, wie bei *Iritis*, bei *Synechia* u. d. von Aussen, durch Präcipitation erweichter Linsensubstanz von Innen her und durch Faltung und Runzelung über geschrumpften Linsen eine solche

Beschaffenheit annehmen, dass sie für Licht undurchgänglich wird und insofern als verdunkelt bezeichnet werden muss.

a. Cataracta capsularis posterior kommt sehr selten, meistens angeboren vor und entsteht dann nach *Ammon* aus Obliteration der *art. centralis ante partum*. Die Entstehung derselben während chronischer Ophthalmien ist nur schwer nachweisbar, da die Linse stets gleichzeitig getrübt ist. Ohne Zweifel sind Autoren, die ihn oft gesehen zu haben glauben, durch hintere Rindenstaare getäuscht worden. Ob das *Purkinje-Sanson'sche* Experiment die Diagnose erleichtert, muss noch bestätigt werden.

b. Cataracta capsularis anterior zeigt sich als partielle oder totale, meist gelblich-, selbst bläulichweisse Trübung fast im Pupillarraume selbst und hat nicht selten scheinbare oder wirkliche Unebenheiten. Diese und die vielfachen Formen der Trübung haben zu den obsoleten Namen *Cataracta fenestrata, trabecularis, arborescens, striata, stellata, marmoracea, denticulata* u. s. w. Veranlassung gegeben, die sämmtlich werthlos sind. Ist diese Form nur partiell vorhanden, so ist das Purpurschwarz des Augengrundes wahrnehmbar und die Abwesenheit der Substanztrübung ausser Zweifel zu setzen. Die Augenspiegeluntersuchung bei durchfallendem Lichte gibt die beste Auskunft und lehrt bei Dilatation der Pupille durch Atropine, dass in der Regel der Marginaltheil weniger verdunkelt ist. Letzteres ist wichtig, weil es uns zeigt, dass die Sektoren und Radien der Linse frei sind, mithin keine Trübung im Bereiche der Linse selbst vorhanden ist.

Therapeutisch wichtig ist *Arlt's* Vorschlag (l. c. p. 261), solche Patienten in der Rückenlage zu operiren und im zweiten Momente statt mit der Nadel mit dem Irishäkchen einzugehen, um Linse und Kapsel gleichzeitig zu extrahiren. Er macht mit Recht darauf aufmerksam, dass wohl die entartete, nicht aber die gesunde Kapsel sich leicht von der *Hyaloides* und der *Zonula* ablöst.

c. Cataracta centralis capsulae anter. Der Centralkapselstaar entsteht, wie *Arlt* zuerst und richtig dargethan hat, nach perforirenden Cornealgeschwüren mit kleiner Oeffnung, meist nach *Blennorrh. neonat.*, doch auch nach anderen Hornhautulcerationen, wenn die Kapsel sich vor die Oeffnung gelegt hatte und nach der Heilung und Ablösung der *membr. Descem.* von der Kapsel die abgesetzte plastische Lymphe als weissliches Hügelchen auf der Kapsel sitzen bleibt. Nach vollständiger Aufhellung der Cornea bleibt der Centralkapselstaar zurück und erinnert durch nichts an seine interessante Entstehungsart. — *Hawranek* war gegen *Arlt* der Meinung, das Exsudat auf der Kapsel werde von der entzündeten Hornhaut geliefert ohne vorhergegangenen Durchbruch derselben.

d. *Cataracta caps. pyramidalis s. punctata congenita.*
 Der angeborene Pyramidenstaar erscheint nach *Arlt* meist auf beiden Augen zugleich als lichtgrauer, matter, entweder flacher oder prominirender Punkt. — *Ammon* secirte einen solchen Staar: Linse und Kapsel hingen innig zusammen; es schien, als habe sich durch ein kleines Loch der vorderen Kapsel im Centrum ein Stückchen Linsensubstanz hervorgedrängt, und als sei die pyram. Hervorragung durch die Kapsel hindurch mit der Linsenmasse gänzlich verschmolzen.

2) Linsenstaar (*Catar. lenticularis*).

Die Verdunkelung hat ihren Sitz in der Linse selbst und zwar entweder in der Rinde (*C. corticalis*) oder im Kerne der Linse (*C. nuclearis*) oder in der ganzen Linsensubstanz (*C. totalis*).

a. *Cat. corticalis*, der Rindenstaar, beginnt entweder in einzelnen Streifen von schmutzig weisser Farbe oder als gleichmässige, mattglänzende Trübung, oft perlmutterartig opalisirend, die bald von der Mitte ausgehend zunimmt, bald auch im Rande beginnt und längere Zeit auf denselben beschränkt bleiben kann. — Diese Randstaare haben zu der irrigen Annahme *Ammon's* geführt, als entspräche nicht selten dem *Arcus senilis corneae* ein *Arc. sen. capsulae lentis*. Man nimmt sie meist erst nach Dilatation der Pupille durch Atropine wahr. Der hintere Rindenstaar ist stets nur kurze Zeit sichtbar, weil bald auch der vordere hinzutritt oder die ganze Linse sich trübt; er ist häufig mit hinterem Kapselstaar verwechselt worden, von dem er sich hauptsächlich durch opalartigen Glanz und die schnellere Entstehung unterscheidet. — Der vordere Rindenstaar erscheint wie rauchige Bedeckung der Pupillarschwärze, wie „eine dünne Lage Milch auf schwarzer Unterlage“ (*Arlt*), und in der Mitte, wo die Rinde dicker ist, gesättigter, als am Rande. In Bezug auf die Vertheilung und Anordnung der Streifen und Punkte kommen viele zufällige Verschiedenheiten vor, abhängig davon, wie und welche Meridiane ergriffen sind. Desshalb hat die Form eines drei- oder sechsstrahligen Sternes, durch punctirte Streifen um die Sektoren gebildet, keineswegs anderen diagnostischen Werth, als den des Beweises, dass die Verdunkelung der Corticalsubstanz der Linse angehört. (*Cataracta dehiscens Sichelii*.) — Von einer *Catar. Morgagnii* ist hiernach nicht füglich ferner zu sprechen, da in den dafür angesprochenen Fällen eben nur mit dem weichem Rindenstaare das Linsenblastem trüb ist.

Rindenstaare sind fast ohne Ausnahme mehr weniger weich, breiartig und verflüssigen schliesslich, wenn nicht vorher die Resorption erfolgt. Dieser Umstand hat sehr geachtete Autoren veranlasst, sie sämmtlich unter die gemeinschaftliche Kategorie *Phakomalacie*, Linsenerweichung zu rubriciren. (*Pauli, Ruete,*

Hasner u. A.) Nach ihnen ist es hauptsächlich Entzündung, aber auch anomale chemische Zusammensetzung der Substanz, welche die umgebende Flüssigkeit derart macerirend auf die äussere Schichte einwirken lässt, dass mikroskopisch in den zurückbleibenden Körnern die ursprüngliche Linsenstructur nicht mehr zu erkennen ist. Schimmert im Beginn der Erweichung die hyperämische Choroidea durch, so entsteht eine grünliche Färbung, der zu Liebe man diesen Staar sehr unpassend den grünen Staar (*C. viridis*) genannt hat; sobald die Trübung gesättigter geworden ist, hört er nämlich auf, grün zu scheinen.

Schreitet die Verflüssigung vor, so verschwindet die Faserung endlich ganz (*C. fluida*) und es bleibt nur ein kleiner Kern zurück, der sich auch auflösen kann. Nach der Aehnlichkeit mit Eiter oder Milch nennt man diesen flüssigen Staar wohl Eiter- oder Milchstaar. Befinden sich Hydatiden in dieser Flüssigkeit, so spricht man von *C. hydatoidea*. Bleiben nach der Resorption der Flüssigkeit nur Salze und zerstörte, breiige Linsenreste zurück, so wird der Staar *C. cystica* genannt. Wird er zu einer trocknen Hülse mit Salzen und Fetten gefüllt, besonders mit Cholestearine, so nennt man ihn *C. arida siliquata*. Bleiben neben wenigen Linsenresten nur phosphors. und kohlensaure Kalke zurück, so entsteht *C. gypsea*. **v. Gräfe** jun. beschreibt einen solchen Staar bei einem 20jährigen Manne, der nach Prof. **Rammelsberg's** Untersuchung lediglich aus phosphorsaurer Kalkerde bestand. Es ist zu merken, dass letztere Processe vorzüglich eintreten, wenn künstliche oder spontane Dislocationen vorhergegangen sind, so dass jede normale Ernährung aufhören musste. Da die Linsen, wenn sie noch im Bereiche der Pupille sich befinden, in solchen Fällen bei den Bewegungen des Bulbus zittern, so taufte man sie auch *C. tremulantes* oder, wenn sie vollständig frei im hintern Kammerwasser schwimmen, *C. natantes*; hängen sie durch Filamente irgendwo fest, so dass sie trotz aller Depressionsversuche wieder aufsteigen, *C. elasticæ*, sind sie ohne allen Inhalt, *C. membranaceæ*. — Es erscheint wahrscheinlich, dass all diese zuletzt genannten Processe hauptsächlich dann eintreten, wenn nach vorhergegangener *Kyklitis*, *Choroiditis* und *Iridochoroiditis* die Umgebung des Linsenrandes entartet ist und die dort verlaufenden Gefässe obliterirt sind, so dass das Kammerwasser seine normale Zusammensetzung verliert und die Verbindung des Linsensystems mit den übrigen Augenmedien statt einer organischen nur noch eine mechanische ist. Diese Hypothese zugegeben, erscheint die Beweglichkeit der Linse innerhalb der Kapsel auch sehr denkbar.

b. Cat. nuclearis, der Kernstaar, entwickelt sich primär im Centrum, auf das er Jahre hindurch beschränkt bleiben kann, ehe er auch in der Corticalsubstanz erscheint. Diese Beschränkung auf das Centrum gehört indess zu den Selten-

heiten. Wie er überhaupt die häufigste Staarform ist, so vollendet er sich in der Regel sehr schnell und zwar in Folge von localem Marasmus. Er gehört vorwiegend dem Greisenalter an, vor dem 40. Jahre ist er kaum je beobachtet worden. Da er in der Regel von derber Consistenz ist, so wird er im Gegensatz zu dem weichen Staare (*Phakomalacie*) harter Staar (*Phakoscleroma*) genannt, doch ist diese Bezeichnung keineswegs in allen Fällen zutreffend. Es kann der Kernstaar in allen Lebensaltern als weicher Staar auftreten, doch pflegt er dann sehr schnell zu reifen, wesshalb dieser weiche Kernstaar angemessener als unreifer Totalstaar betrachtet wird. Der bei Weitem häufigste Vorgang ist, dass der Kern, indem er atrophisch wird und sich verdunkelt, auch gleichzeitig erhärtet, wobei die ursprüngliche Structur fortbesteht und häufig wahrnehmbarer wird, indem die Verbindung in den Sektoren sich lockert. Die Corticalsubstanz gerinnt früher oder später zu einer breiigen Masse (Staar von gemischter Consistenz), in der die Normalstructur verschwunden ist. Sie wird schliesslich resorbirt, so dass nur ein kleiner, flacher, harter Kern zurückbleibt, auf den bei Seitenbeleuchtung die Iris einen deutlichen, dunkeln, halbmondförmigen Schlagschatten wirft, der für diese Staarform charakteristischer ist, als die Farbe. Diese ist nämlich sowohl individuell verschieden, als sie auch bei längerem Bestande des Staares sich verändert und bei fortschreitender Cornification aus dem Grauen in's Bernstein-, Kastanien-, Pallasander- und Ebenholzfarbene übergehen kann. (*C. nigra*.) Das Uvealpigment scheint an dieser schwarzen Farbe unschuldig zu sein, wofür schon der Umstand hinlänglich bürgt, dass sie vor Kerzenlicht gehalten mit einer rothbräunlichen Farbe durchschimmernd erscheinen ¹⁾).

Der Kernstaar tritt gewöhnlich monolateral auf, doch pflegt die cataractöse Erblindung des zweiten Auges bald und zwar von der Rinde nach dem Centrum hin nachzufolgen. Spiegeluntersuchung des zweiten Auges nach intensiver Atropineeinwirkung ist desshalb in solchen Fällen dringend anzurathen, um sicher prognosticiren zu können. Einen weniger zuverlässigen Anhaltspunkt für die *C. incipiens* gibt das *Purkinje-Sanson'sche* Experiment zumal bei alten Individuen, bei denen missfarbene Reflexe aus der Tiefe des Auges ausserdem diese Untersuchung erschweren.

Als verschieden von diesem Kernstaare weist *Arlt* (l. c. pag. 250 u. 51) auf den Centrallinsenstaar hin, ähnlich,

¹⁾ v. Gräfe jun. (Archiv I, pag. 333) trennt von dem durch Cornification bedingten schwarzen Staare eine zweite Form, eben die, welche vor Licht roth durchschimmert und von der er behauptet, dass sie von Eintritt von Blutfarbstoff in das Linsensystem herrühre. Unzweifelhaft ist, dass in vielen Fällen interne Hämorrhagien der Entstehung schwarzen Staares vorhergingen und auch für sich zur Erblindung führten.

aber nicht zu identificiren mit dem Centralkapselstaare, mit dem er zugleich vorkommen könne. Er soll meist angeboren sein, oft mit Irideremie und Coloboma iridis, als scharf begrenzter, mohnkorngrosser, grauweisser Punkt erscheinen und bisweilen von einem wolkigen, lichtgrauen Hofe umgeben sein. — Eine noch andere Form soll sodann der stationäre Kernstaar jugendlicher Individuen sein, gelblich grau, noch etwas durchscheinend, tief in der Pupille liegend und bei starker Dilatation scharf sich abgränzend. Er ist selten und wird oft nur zufällig entdeckt, da er die Sehkraft nur beschränkt, nicht aufhebt.

Als Abhülfe bei all solchen Centralverdunkelungen dürfte es nicht ungeeignet sein, die Anwendung der myotischen (oder stenopäischen) Brillen zu versuchen.

c. Cat. lenticularis totalis, der Totalstaar, ist als Ausgangspunkt reiner Staarprocesse, mögen sie von der Rinde oder vom Kern ausgehen, anzusprechen und demgemäss in der Erscheinung verschieden. Bei verdunkelter Rinde erscheint er wie Rindenstaar und ist als Totalstaar nur aus der Genese zu diagnosticiren. Blieb die Corticalschicht flüssig und durchscheinend, so erkennt man in seltenen Fällen den Kern durch, bis bei fortdauerndem Ernährungsmangel die ganze Substanz vollständig sclerosirt. Auch zeigt er sich in den Stadien verschieden, z. B. voluminöser in der Entwicklung, während er später sich meist verkleinert und dann bei der Operation die Kapsel leicht verlässt.

3) Kapsellinsenstaar (*Cat. capsulo-lenticularis*).

Diese Form ist die Verbindung der beiden bisher erörterten und kommt möglicher Weise in allen Combinationen der Unterarten derselben vor. Meistens ist vollständige Verdunkelung vorhanden, nur selten lässt partielle Kapselverdunkelung Bestimmung des Trübungsgrades der Linse zu.

Besonders hinzuweisen ist noch auf:

1) *Cataracta congenita*, Fötalstaar, kommt unter verschiedenen Formen, als Pyramidalstaar, stationärer Centralstaar der Kinder, überhaupt mehr als Kernstaar vor, so dass ein beschränktes Sehevermögen noch stattzufinden pflegt. Als *C. mollis* ist er seltener beobachtet worden. Die Lehre von ihm ist jedenfalls noch in den Anfängen, wesshalb wir nur erwähnen, dass man ihn als Hemmungsbildung, als Folge foetaler Entzündungen, als Ergebniss verfrühter *obliteratio arteriae central.* zu erklären gesucht hat. Er kommt mit anderen Hemmungsbildungen sowohl als mit verschiedenen Entzündungsausgängen gleichzeitig vor und ist unter Anderem, wie jede angeborene Blindheit, durch Nystagmus characterisirt, dessentwegen man wohl thut, die Operation nur nach vorhergegangener Chloroformation vorzunehmen.

2) *Cataracta secundaria*, Nachstaar, mit welchem Namen jede nach der Operation wieder auftretende Trübung in der Sehaxe belegt wird. Diese Trübung wird verschieden herbeigeführt, entweder durch die Kapsel, die über oder mit neuen und älteren Exsudaten faltig die Pupille verlegt, oder durch Reste der discidirten Linse, oder durch die wiederaufgestiegene dislocirt gewesene Staarlinse selbst.

3) *Cataracta spuria*, unter welcher Bezeichnung ähnliche Trübungen in und hinter der Pupille verstanden werden, die aber an und für sich mit Staar nicht im Geringsten verwandt sind.

a. Cat. lymphatica, Lymphstaar, entsteht besonders nach *Iritis*, indem die Exsudate derselben sich membranartig durch die Pupille spannen und sie wohl ganz ausfüllen. Desshalb ist die bei Staar bewegliche Pupille unbeweglich und oft verzogen, die Oberfläche, genau untersucht, faserig und ligamentös, uneben und mit gelblichen Punkten besetzt.

b. Cat. purulenta, Eiterstaar, entsteht nach ähnlichen Vorgängen, oft mit *Hypopyon* gemeinschaftlich. Der Eiter, mit plastischer Lymphe gemischt, organisirt sich in der Pupille und lässt meist nur eine sehr ungünstige Prognose zu.

c. Cat. sanguinea, Blutstaar, ist Folge spontaner oder traumatischer innerer Blutungen, nach welchem die Resorption des Ergusses nur mangelhaft erfolgte und die fibrinösen Bestandtheile des Blutes sich mit dem Blutfarbstoff als braunrothe Masse im Pupillarraume festgesetzt haben.

d. Cat. pigmentosa, Pigmentstaar, bezeichnet jenen Zustand, in welchem Uvealpigmentkörner einzeln oder massenweise abgelöst und auf der vorderen Kapsel abgelagert sind, was verhältnissmässig häufig und auch bei wirklich cataractös erkrankten Linsen vorkommt. Die zerstörte Uvealschicht der Iris erstreckt sich bei vielen kranken Augen in die Pupille hinein und kann bei gleichzeitigem Staare, ihrer Gestalt wegen, mit dem Irisschatten verwechselt werden. Nur Ungeübte können diese Erkrankung mit s.g. Amaurose verwechseln; der durch Verhornung an sich schwarz erscheinende Linsenstaar (*C. nigra*) könnte eher zur Verwechselung Anlass geben, doch gibt in all diesen Fällen der Augenspiegel sofort hinreichenden Aufschluss.

Complicationen des Staares.

Die Feststellung etwaiger Complicationen ist durchaus erforderlich, um, wenn die Operation verlangt wird, dieselben vorher oder gleichzeitig zu beseitigen oder, wenn dies unmöglich ist, die Zwecklosigkeit der Operation aussprechen zu können.

1) Entzündungskrankheiten, besonders am Auge selbst, zwingen uns, von der Operation abzustehen, bis die Entzündung gewichen ist. Nach *Iritis* ist es gewagt, zu operiren, zumal wenn Farbe und Beweglichkeit noch nicht auf die Norm zurückgekehrt sind.

2) Alle Allgemeinkrankheiten, hydropische, arthritische, rheumatische, auch habituelle *ulcera cruris* u. dgl. müssen ebenso vorher beseitigt oder als Contraindicationen der Operation bezeichnet werden.

3) Von Liderkrankungen, wie *Ectropium*, *Entropium*, Cornealleiden, besonders Trübungen, Staphyloma, gilt dasselbe. Auf das Vorhandensein von Cornealneoplasieen, die nicht beseitigt werden können, muss genau geachtet werden, weil sie vor dem nicht mehr dunkeln Hintergrunde meist schwer zu erkennen sind und den Erfolg einer an sich gelungenen Operation oft sehr beeinträchtigen. Jedenfalls mache man den Patienten auf diesen Umstand vorher aufmerksam.

4) *Synechia posterior* kann man durch denselben Operationsact zu beseitigen versuchen.

5) *Synicesis* erfordert, dass man durch Extraction den Staar entferne und zugleich *Coremorphosis* verrichte.

6) *Synchysis*, Verflüssigung des Glaskörpers, contraindicirt nicht die Operation, aber die *Extractio lentis*. Vorausgegangene Choroiditis, Volumenzunahme und Resistenzabnahme des Bulbus, Iridodonesis, Schlottern des Staares selbst und ähnliche Symptome lassen auf diese Complication schliessen. Depression ist noch zulässig, der Erfolg aber meist zweifelhaft, da die Linse in der Regel wieder aufsteigt.

7) Choroidealkrankheiten und deren Ausgänge, (s. g. *Glaucoma*, *Hydrops subretinalis*, *choroidealis* u. d. m.) contraindiciren die Operation des meistens secundär auftretenden Staares. Die Beschaffenheit der Gefässe, Verfärbung und Contraction der Iris, Vergrösserung des Bulbus, fast vollständige Abwesenheit jeder Lichtperception, die intermittirenden charakteristischen Schmerzen u. s. w. sichern die Diagnose dieser Complication hinlänglich. Der Staar selbst ist meist *mollis*, *stellata*, *dehiscens* und oft, wenigstens eine Zeitlang, grünlich und opalisirend. Das andere Auge leidet gern mit, an *Hydr. subretinalis*, Opacitäten des *corp. vitreum* etc.

8) Retinalkrankheiten begleiten den Staar häufig, besonders die s. g. *Amaurose par paresse*, die in einer nach langem Bestande des Staares und langer Unthätigkeit der Netzhaut entstandenen oft hochgradigen Anästhesie derselben ihren Grund hat. Sie verliert sich nach der Entfernung der getrübten Linse und vorsichtiger Wiedergewöhnung an das Licht allmählig, wohl gänzlich. — Ist die Retina gelähmt oder anderweitig entartet, ist die Blindheit Folge von Störung des *N. opticus* oder von centralen Ursachen, so kann selbstverständlich von Erfolg eines operativen Verfahrens nicht gesprochen werden. Solcherlei Complication ist indess häufiger, als die *Amaurose par paresse*, Ursache der Erfolglosigkeit von Operationen, da Fälle constatirt sind, wo nach 20, 40, selbst 60jährigem Be-

stehen des Staares durch die Operation noch ein relativ gutes Sehevermögen hergestellt wurde.

Diagnostik des Staares.

Es ist sehr schwierig, Cat. incipiens zweifellos zu erkennen, dagegen gelingt es auch wenig Geübten bald, ausgebildete Staare zu diagnosticiren. Staarblindheit lässt sich sogar auf Distanz schon an blinden Individuen voraussagen: sie gehen mit gesenktem Haupte, halbgeschlossnen Lidern, gerunzelten Brauen, suchen den Schatten, in dem sie, wie auch in der Dämmerung, besser sehen, weil durch die geöffnetere Pupille mehr Licht in das Auge gelangt. Sie tragen deshalb gern breitkrämpige Hüte oder halten das Licht mit der Hand ab; können sie noch wenig sehen, so lassen sie das Licht hinter sich her auf die Objecte fallen, so dass sie im Zimmer dem Fenster den Rücken zukehren. Dabei tappen sie beim Gehen, als befänden sie sich im Dunkeln, strecken die Hände fühlend aus und setzen die Füße vorsichtig und mit gebogenen Knieen nieder. Ist nur ein Auge erblindet, so gehen sie auf der Strassen-seite, der das noch gute Auge zugekehrt ist. Dabei stehen die Augenachsen parallel, die Pupille ist erweitert, die Iris in der Regel beweglich, so dass sich beim Abhalten des Lichtes die Pupille noch mehr erweitert, um bei der Lichtwirkung sofort sehr enge zu werden.

Um den Staar genau zu betrachten, dilatire man mit Atropine (gr. 1 in unc. 1 aq. dest.) und benutze eine Loupe, während man in einem Zimmer mit nur einem Fenster das Licht von der Seite einfallen lässt. Man achte auf die Form, den Sitz, die Tiefe, die Ausdehnung der Trübung, auf den sichelförmigen Schlagschatten, welchen die Iris auf tiefliegende Trübungen wirft und denke immer daran, dass bei reinem Staar ein mechanisches Hinderniss das Sehen erschwert oder aufhebt. Je intensiver die Trübung, um so vollständiger pflegt deshalb auch die Blindheit zu sein; doch ist zu merken, dass gesunde Linsen von Greisen oft einen gesättigteren Teint haben, als die Linsen bei beginnender Staarbildung.

Scotome der mannichfaltigsten Art werden im Beginn der Staarerkrankung von den Patienten geklagt, ebenso sehen sie, zumal bei Centraltrübung, farbige Strahlenkränze um Kerzenlichter. Die Gesichtsstörung schreitet meistens rasch vor, wohl in einem Tage bis zur Erblindung. Beginnt die Erkrankung zuerst auf einem Auge, was Regel ist, so wird sie selten sofort bemerkt, sondern erst später zufällig. Denn Entzündung, Schmerz fehlen, die den Patienten aufmerksam machen könnten. Es ist dem Patienten zuerst, als sähe er durch feine Gaze, gefärbtes Glas, Hornplatten oder Aehnliches; ausser den Scotomen sieht er wohl die *art. cent. ret.* Convexbrillen helfen ihm etwas, weil sie mehr Licht in das Auge führen, Conçav-

brillen, die Kurzsichtigen dienlich sind, helfen nicht. Von Myopie unterscheidet sich die Cat. incipiens auch dadurch, dass letztere monolateral auftritt und rasch zunimmt, erstere gleich auf beiden Augen und nur langsam sich steigert. Auch sehen Myopische in der Nähe sehr scharf, was bei Catar. nicht der Fall ist, obgleich auch bei ihnen zuerst die Wahrnehmung ferner Objecte erschwert zu sein pflegt. — Beginnt der Staar central, so kann künstliche Dilatation oft noch monatelang einiges Sehen ermöglichen.

Um bei Cat. incipiens nicht zu irren, thut man wohl, den exclusiven Weg zur Feststellung der Diagnose einzuschlagen und zu ermitteln, dass leichte Cornealneoplasieen, feinschichtige Pupillarexsudate, Retinalirritationen, Choroidealhyperämien, Refractions- und Accommodationsstörungen und anderes Aehnliche, was zum Irrthume verführen könnte, nicht vorhanden sind.

Schliesslich versäume man nicht die Anwendung der drei physikalischen Untersuchungsmethoden anzuwenden:

1) Das Purkinje-Sanson'sche Experiment. In dunklem Raume spiegelt sich ein vor das Auge gehaltenes Kerzenlicht drei Mal ab; das erste Bild entsteht gross, deutlich und aufrecht auf der Cornea; das zweite, etwas kleiner, sehr undeutlich, mehr farbig als leuchtend und ebenfalls aufrecht auf der vorderen Kapselwand; das dritte und hinterste kleiner, aber deutlicher als das zweite, und umgekehrt, auf der hinteren, concaven Kapsel oder in der tellerförmigen Grube. Bei vorhandener Trübung muss beim Entstehen von drei Bildern die Trübung hinter der Linse ihren Sitz haben, bei Trübung der Linse oder der hinteren Kapsel sieht man das dritte Bild nicht. Spiegelt auch die vordere Kapselwand nicht, so entsteht nur das Cornealbild. — *Cramer* hat auf die Theorie dieses Experiments sein Ophthalmoscop basirt, doch kann die Lehre noch nicht als abgeschlossen gelten.

2) Das Listing'sche entoptische Experiment. Bei nahem und genauen Sehen durch eine punktförmige Oeffnung in einer Metallplatte gegen weissbewölkten Himmel nimmt Jeder Punkte und kleine Ringe, s. g. Perlflecken, wahr, welche als Schatten von Zellen, die in den verschiedenen durchsichtigen Augenmedien befindlich sind, auf die Retina fallen. Sie sind immer für Monate constant, so dass Jeder die in seinem Auge vorkommenden zeichnen und später genau controlliren kann. Bei Cat. incipiens vermehrt sich die Zahl dieser Punkte in's Unzählige, sie gruppiren sich reihenweise, sternförmig nach der Ordnung der Sectoren oder unregelmässig und können für einen intelligenten Kranken als eine instructive und interessante Lehre für die Fortschritte seines Cataractes gelten.

Einen mehr objectiven und überhaupt und in jeder Beziehung höheren Werth als diese beiden diagnostischen Experimente hat

3) Das Augenspiegelexperiment. Vermittelst des

Augenspiegels, der mit den nicht leuchtenden Strahlen des beobachtenden Auges zugleich die leuchtenden des reflectirten Lichtes in das beobachtete Auge sendet, so dass alle durchsichtigen Medien des Auges erhellt werden, ist es unschwer, Trübungen innerhalb des Linsensystems und wären sie noch so klein, objectiv wahrzunehmen und zu bestimmen. Bei Cat. incipiens ist es am zweckmässigsten bei durchfallendem Lichte zu untersuchen, um die dem Beobachter zugewendete, aber beschattete Seite der Trübungen vor dem erhellten Augenhintergrunde sofort auf das Deutlichste zu erkennen und die Diagnose des positiv Vorhandenen ausser allen Zweifel zu setzen.

Aetiologie.

Momente, die zur Staarbildung in ursächlicher Beziehung ständen, sind von den Autoren so manche namhaft gemacht worden, dass wir mit vollem Rechte behaupten zu dürfen glauben, die meisten seien mehr zufällige Antecedentien als veranlassende Ursachen des Staars gewesen. Nach ihrem Werthe nennen wir sie und zwar

1) Das Greisenalter. Schon vom 40. Jahre ab ist das Linsensystem zur senilen Decrepidität, zum localen Marasmus geneigter, als andere Organe. Die Ernährung erreicht, vielleicht in Folge von Obliteration oder verringerter Thätigkeit der zuführenden Gefässe, nicht mehr das erforderliche Mass, möglicher Weisse wird die Kapselmembran zur normalen Endemose und Exomose zu rigide und so trübt sich der Staar, indem er erhärtet. Nach allen statistischen Forschungen fällt das häufigste Vorkommen des Staars zwischen das 40. und 70. Lebensjahr. — Es sei die Bemerkung erlaubt, dass Momente, welche localen Marasmus begünstigen, durch die verschiedenartigsten Vorgänge verfrüht in Wirksamkeit treten können.

2) Erbliche Anlage scheint einige Male nachgewiesen.

3) Männliches Geschlecht ist wie 3: 2 mehr prädisponirt, vielleicht durch die Beschäftigung.

4) Feuerarbeiter sind jedenfalls häufig ausgesetzt, auch Personen, die bei hellem Sonnenschein arbeiten. Sogar Feuerbrünste scheinen zu schneller Entstehung beigewirkt zu haben.

5) Oertliche Verletzungen können unzweifelhaft und auf verschiedene Weise Trübung veranlassen.

6) Mineralische Dämpfe (salzsaure nach *Frerichs*, vulkanische nach *Mackenzie*) werden vielleicht mit Recht beschuldigt.

7) Der Einfluss des Klima's ist sehr problematisch.

8) Dyscrasieen werden, mit Ausnahme von *Arthritis* und *Rheuma*, wahrscheinlich ohne Grund angeklagt; *Syphilis* scheint weniger Ursache gewesen zu sein, als manche antisypilitische Curen. Nur von *Diabetes mellitus* lässt es sich mit einiger Bestimmtheit sagen, dass er weichen Staar sehr oft im Gefolge habe.

Geistige Getränke, Störungen des Kreislaufs, Ophthalmieen, Scrophulosis und Tuberkulosis und manches Andere ist noch genannt, doch herrscht über den wahren Sachverhalt noch viel Dunkel.

Prognose.

Die Prognose ist insofern absolut ungünstig zu nennen, als Naturheilungen wohl nie vorkommen. Wo man sie beobachtet hat, ist das mechanische Hinderniss des Sehens, der Staar, durch spontane oder traumatische Veranlassung luxirt oder resorbirt worden. Die Prognose der Operation ist dagegen eine günstige, indem gegen 80 pCt. dergestalt geheilt zu werden pflegen, dass sie mit Hülfe einer Brille (von 5—2, je nach Entfernung der Objecte) wieder relativ gut zu sehen vermögen. Eine neue Linse entsteht nicht wieder, wohl ein durchscheinendes Exsudat, Krystallwulst genannt; ebenso stellt sich das Accommodationsvermögen nur scheinbar wieder her. — Uebrigens wird die Prognose bedingt durch die Art des Staares (reiner Linsenstaar lässt die beste Prognose zu), durch Complicationen, durch die Wahl und Ausführung der Operationsmethode und ganz besonders durch die Nachbehandlung.

Therapie.

Bei Cat. incipiens kann man versuchen, durch möglichste Schonung der Augen und streng geregelte Diät die weitere Entwicklung zu hemmen. Es soll durch lang fortgesetzte Einreibung von Ung. Kalii jod. in Stirn und Schläfe bei gleichzeitigem Gebrauch von Eger und Karlsbad selbst bei reifen Staaren, d. h. solchen, deren Entwicklung vollendet war, gelungen sein, das Gesicht herzustellen, doch nur in sehr wenig nachgewiesenen Fällen. Durch Sublimatcuren, Mercurialfrictionen Aufhellung der Linse versuchen zu wollen, wäre ebenso unverantwortlich, als das Experiment, durch Einleiten eines galvanischen Stromes in die Linse dieselbe zur Auflösung zu bringen, — gelinde gesagt — originell ist (*Crusell* in Petersburg). — Man verweise den Patienten einfach auf die Operation und sichere sich für die Ausführung derselben die günstigsten Bedingungen. Dazu gehört allerdings als Vorbereitung die Bekämpfung von Gicht, Rheuma, Entzündung, Hydrops u. s. w., die Herstellung des Katamenial- und Hämorrhoidalflusses, von unterdrückten Hautausschlägen und Fussgeschwüren und man wähle zu dem Ende die entsprechenden Mittel; den ausgebildeten Staar hat man mechanisch aus der Sehaxe, die er verlegt, zu entfernen und zwar nach den in der Operationslehre erörterten Indicationen.

Der Glaskörper.

Hyalitis, Entzündung der Glaskörperhaut,

gehört zu den vor Zeiten supponirten Krankheiten, kommt aber in der structurlosen Membran nicht vor. Die Trübungen, welche in ihr und ihrer Fortsetzung, der *Zonula Zinnii*, von *M. J. Weber* u. A. beobachtet worden sind, haben nur den Werth angelagerter Niederschläge; wahrscheinlich entstehen sie nach intraoculären Hämorrhagien und sind also nicht Exsudate, sondern metamorphosirte Blutreste.

Hydrops corporis vitrei,

seröse Ausschwitzung in das Glaskörperparenchym ist einer der deletärsten Ausgänge intensiver innerer Entzündungen, zumal der Ciliargefäße, krebshafter Degenerationen, chronischer Congestionen in Folge von Menstrual- und Hämorrhoidalstase u. dgl. und zwar, weil er von primärer oder secundärer Retinalanästhesie regelmässig begleitet wird und fast stets zu *Phthisis bulbi* den Uebergang bildet. Die vorderen Organe sind meist vorgedrängt, die Sclera erscheint in Folge von Pigmentresorption bläulich und in ihrer hinteren Hälfte voluminöser. Bei gesteigerter Resistenz ist meist einige Fluctuation des Bulbus vorhanden. Durch die träge, nicht stets dilatirte Pupille, dringt ein blaugrauer Schimmer. Zwei von mir mit dem Spiegel untersuchte Fälle ergaben nur eine ungenügende Erleuchtung des inneren Auges. Im Beginn der Ausschwitzung treten neben und nach einander die Erscheinungen von Myopie und von Hyperästhesie der sensoriellen und sensiblen Nerven auf, machen aber später einem lästigen Druckgefühle und halbseitigem Kopfschmerze Platz.

Um für die *Prothesis ocularis* einen günstigen Stumpf zu erhalten, wartet man das Platzen oder die Schrumpfung nicht ab, sondern bildet, wie bei Abtragung der *Pseudocornea*, den Stumpf auf operativem Wege.

Synchysis corp. vitr., Glaskörpererweichung,

kommt im Verlauf innerer Entzündungen nicht so sehr selten vor und ist wohl in allen Fällen als Secundärleiden zu betrachten. Der Zustand steht von dem *Hydr. corp. vitr.* nicht weit ab; letzterer geht bei beginnender Resorption in *Synchysis* über, indem nicht bloss das hydropische Exsudat, sondern auch die Glaskörpersubstanz in höherem oder geringerem Grade mit schwindet. Die Verflüssigung scheint weniger in der Flüssig-

keit, als in dem maschigen Scelett des Glaskörpers und zwar in eigentlicher Phthisis desselben seinen Grund zu haben, die indess als genuiner Krankheitsprocess einstweilen noch nicht aufzustellen ist. Von der Quantität noch vorhandener Flüssigkeit hängt die Festigkeit oder Weichheit des Bulbus beim Anfühlen ab. Dass bei festem, prallen Bulbus der Glaskörper verflüssigt sein kann, erhellt oft genug aus dem Schlottern der Iris und des Linsensystems trotz der Prallheit. In solchen Fällen muss man die Indication zu Operationen mit grösster Vorsicht stellen, da bei Messerwunden *prolapsus corp. vitr.* kaum zu vermeiden ist.

Therapeutisch kann man nur gegen das Grundleiden mit Erfolg operiren; Schonung, Hebung des Allgemeinbefindens etc., gegen gleichzeitige *Presbyopie* oder *Myopie* palliativ entsprechende Brillengläser.

Opacitäten des corp. vitr.,

Trübungen innerhalb des Glaskörpers, kommen auffallend häufig vor und haben zu der Mehrzahl s. g. *Amblyopieen* das Wesen hergegeben. Bei der ophthalmoscopischen Untersuchung zeigen sie die mannichfaltigsten Formen. Sie erscheinen als Punkte, Faden, Flecken, Häute, auch als leere, faltig zusammengelegte Schläuche und in der Combination dieser verschiedenen Specialfiguren. Ihre Tieflage erkennt man aus der Art und der Schnelligkeit, mit der sie an den Bewegungen des Bulbus um seinen Drehpunkt participiren. Entweichen sie bei der Rechtsdrehung der Axe nach Links, so liegen sie hinterwärts vom Drehpunkte, ebenso vor demselben, wenn sie mit nach Rechts ausweichen. Je weniger sie sich überhaupt mitbewegen, um so näher liegen sie dem Drehpunkte. Nach dem Grade ihrer Massenhaftigkeit und dem Verflüssigungszustande des Glaskörpers sind sie fix oder beweglich. In einigen Fällen heben und senken sie sich langsam und stetig, in anderen können sie durch eine heftige Bulbusbewegung plötzlich emporgeschnellt werden, um ebenso rasch wieder zu versinken. Um den ganzen Glaskörper zu untersuchen, muss man der Reihe nach Linsen von verschiedener Focaldistanz benutzen und bei der Untersuchung von Vorn nach Hinten mit den stärkeren Linsen (von 5 Centim.) beginnen. Es scheint, als ob sie auch organisch zu Stande kommen können, die Mehrzahl beruht sicher auf intraoculären Hämorrhagien, die selten von der Retina, meistens mit Perforation der Retina von der Choroidea ausgehen und zur theilweisen, ophthalmoscopisch zu verfolgenden Resorption gelangen. Häufig wiederholen sich diese Blutungen periodisch, um direct oder durch Dissolution des Glaskörpers, Retinalanästhesie etc. zur vollständigen Erblindung hinzuführen. Die gefalteten Häutchen, Fasern und leeren Schläuche dürfen mit einiger Wahrscheinlichkeit als

Rudimente des zerstörten und erst durch die Zerstörung wahrnehmbar gewordenen Glaskörperscelettes in Anspruch genommen werden. Für den in solchen Fällen beeinträchtigten Ernährungsprocess spricht das gleichzeitige Auftreten von Cholestea-rintäfelchen im Glaskörper.

Von der Ausdehnung der Opacitäten ist der Grad der Gesichtstrübung abhängig, die der Patient oft mit vielen, wenig lehrreichen Worten zu schildern weiss. Störung in der Retinalfunction ist keineswegs eine constante Complication, vielmehr wird häufig die Retina bei Opacitäten intact gefunden, — Beweis, dass sie nicht Retinitisproducte sind. Wohl aber scheinen sie bei längerem Bestande Hyper- und Anästhesie der Retina zu veranlassen.

Die Therapie besteht in möglicher Schonung der Augen und schliesst sich übrigens der gegen Congestion nach den Augen an: Schröpfköpfe im Nacken, blande Diät etc.

Ausserdem kommen auch Entozoen im Glaskörper vor. *v. Gräfe* beobachtete sie vier Mal als Ursache von *Amblyopie*. In einem von mir genau untersuchten Falle überzeugte ich mich, dass zwei *Cysticercus cellulosae* im Glaskörper in verschiedener Tiefe lagen, der vordere in normaler Ausbildung, der hintere mit den Symptomen der begonnenen Incrustationsmetamorphose.

VIII.

Die Netzhaut.

Retinitis, s. *Dictyitis*, Netzhautentzündung, kommt der ophthalmoscopischen Untersuchung zufolge in zwei Formen vor; *a*) als chronische, bei der das Gesicht allmählig und unwiederbringlich verloren geht und die partiell, in inselförmigen Plaques neben feingekörnten, weisslichen oder röthlich weissen Exsudaten auftritt. Die Plaques sind Ecchymosen ähnlich, bestehen aber aus unzähligen, sehr feinen und dicht ineinander verfilzten Gefässschlingen, die bald zur vollständigen *Anästhesia retinae* zu führen scheinen. Und *b*) acute, bei der die Sehkraft schneller abnimmt oder gänzlich aufhört, nach der Zertheilung der Entzündung aber vollkommen wiederkehren kann. Anfänglich, bei Beginn der Congestion, ist nur die Papilla missfarbig, leicht gelblichroth und ohne scharfe Contour, später ist der ganze Augengrund trübröthlich, wie verwischt, die stärkeren Choroidealgefässe werden unsichtbar, nur die arteriellen und venösen Retinalgefässe sind noch sichtbar, wie sie intumescirt und in dichterem Ramificationen der Papilla zustreben. Endlich ist nur noch die Papilla zu erkennen,

umgeben von einem lichtrothen Halo, in dem einzelne grössere Gefässe unterschieden werden können. Die Arterien sind nur schwer von den Venen durch ihre doppelten Contouren zu unterscheiden. Beide haben geschlängeltem Verlauf und erscheinen in verschiedener Tiefe, woraus sich auf einen Schwellungszustand der Netzhaut schliessen lässt. — Ausser geringem Vorrücken des Linsensystems mit der Iris in den Kammerraum, pflegen äusserliche Charactere zu fehlen. — Die Cur muss streng antiphlogistisch sein ¹⁾.

¹⁾ Zur weiteren Erläuterung dieser noch erst seltener beobachteten Retinitisform lasse ich eine Beobachtung aus der chir. Klinik in Bonn abdrucken, die ich der gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Weber verdanke.

„Die Ehefrau Magdalena V., eine kräftige, gut constituirte und wohlhabende Bäuerin aus Alfter, 46 Jahr alt, kam am 16. März 1854 zu mir, indem sie über eine sehr bedeutende Abnahme des Sehvermögens ihres linken Auges klagte; sie hatte vor 2 Tagen bei feuchtem, nebligem Wetter auf dem Felde gearbeitet, war dabei in heftigen Schweiss gerathen und hatte sich eine Erkältung zugezogen. Schon auf dem Heimwege bemerkte sie eine Trübung ihres linken Auges, welche fortwährend im Zunehmen begriffen, jetzt so beträchtlich war, dass die Frau, während das rechte Auge ganz gesund war, beim Zuhalten desselben mit dem linken kaum noch Licht und Schatten zu unterscheiden und die Umrisse grosser Gegenstände nur mit Unsicherheit anzugeben vermochte, dabei tanzten vor dem Gesichtsfelde mannichfache Funken und Flammenbilder, besonders auch vielfache und verschieden wechselnde Farben, ohne dass indess bestimmte Bilder angegeben werden konnten. Ausserdem waren gelinde Schmerzen in der Tiefe des Auges sowie in der Stirn vorhanden. Mässige Lichtscheue. Kein Thränenträufeln. Liess man die Kranke Bewegungen mit dem Auge vornehmen, so klagte sie dabei über Schmerzen an der Seite des Bulbus, nach welcher hin der letztere gerichtet war; am heftigsten war dieser Schmerz beim Sehen nach einwärts, die Krauke hatte dann die Empfindung „als ob das Auge abgerissen wäre“. Auch gegen Berührung war das Auge sehr empfindlich; indess zeigte sich die Spannung des Auges dabei unverändert.

Die Inspection zeigte nur geringe Veränderung: Die Conjunctiva ohne alle Spur von Erkrankung; die Iris auf beiden Augen gleich der Farbe der Haare hellbraun unverändert; die Pupille von mässigem Umfange rund reagirt in dem kranken Auge langsamer als in dem gesunden; die Tiefe des Auges erscheint links etwas rauchig, rechts vollkommen schwarz.

Die Erweiterung der Pupillen gelang nach Eintröpfung einer Atropinlösung beiderseits vollständig und somit schritt ich zur Untersuchung mittelst des Donders'schen Augenspiegels im umgekehrten Bilde. Augenmedien vollkommen klar. Die Eintrittsstelle des Sehnerven umgeben von einem dichten Kranze strahliger, feiner, rother Gefässe, welche mit den Ramificationen der strotzend gefüllten vasa centralia sich verbreitend auf der Retina ein dichtes, rothes, feinmaschiges Netz darstellten, so dass an einzelnen Stellen, besonders an der Innenseite des Bulbus und gegen die Peripherie hin bei oberflächlicher Untersuchung eine Verwechslung mit capillanen Apoplexien möglich gewesen wäre. Indess war weder von solchen, noch von einem Exsudate, noch von Pigmentflecken eine Spur zu entdecken. Diagnose: acute Entzündung der Retina. Verordnung: 3 Blutegel an den canthus internus, 3 in die Schläfe, spanische Fliege in den Nacken, Einreibung mit Ung. hydr. cin. Dr. 2 und extr. Belladonna gr. 10 3mal täglich über der Augenbraue; Morgens und Abends Fussbäder mit Senfmehl; innerlich Infus. fol. sennæ (ex unc. dim. ad unc. 6) mit unc. 1 magn. sulf. Calomel wollte ich, da ich die Kranke nicht überwachen konnte, nicht reichen, ausserdem sollte sie sich sofort zu Bette begeben und durch Trinken vielen Thee's zu schwitzen versuchen; bei eintretender Verschlimmerung am andern Tage sich 10 Schröpfköpfe in den Nacken appliciren und einen Aderlass von 10 unc. machen lassen.

Fungus medullaris retinae, Markschwamm der Netzhaut.

Die Netzhaut ist von allen Augengebilden am häufigsten Ausgangspunkt der Krebslocalisation, in der Regel beiderseits und fast nur im kindlichen Alter. Mit Beginn der Ablagerung stellt sich Erblindung ein, die indess so lange partiell als blosser Lücke im Sehfelde (*Hemiopie*) bestehen kann, als einzelne Netzhauttheile noch intact sind. Die vorderen Theile sind zuerst unverändert, nur nimmt man durch die Pupille einen hellgelblichen Reflex wahr (*Beer's* amaurotisches Katzenauge), der von dem noch concaven Markschwamm herrührt und sich mit der Ausdehnung der Vegetation durch den Glaskörper nach Vorn allmählig verliert. Bei dieser Zunahme wird die Linse verdrängt, es stellt sich zuerst *Conjunctivitis* ein, die allmählig zu eigentlicher *Panophthalmitis* fortschreitet, zu *Rhexis corneae* oder *sclerae* führt und mit Tod endigt, der unter den Erscheinungen allgem. Erschöpfung und heftigen Fiebers oder durch Krebsablagerung in edlen Organen des Kopfes, der Brust oder des Unterleibes erfolgt. — Dieser Verlauf tritt nicht immer ein, das Leiden kann sich

Indess erschien sie, ohne dieser zu bedürfen, am 19. März hocherfreut wieder; alle Erscheinungen hatten nachgelassen; das Sehvermögen hatte zugenommen; sie konnte die grösste Schrift schon wieder lesen. Bei der Untersuchung zeigte sich Abnahme der Vascularisation der Retina. 10 Schröpfköpfe in den Nacken; übrigens Fortsetzung der obigen Behandlung.

Am 22. März stellt sich die Kranke als vollständig gesund bei mir ein. Das Sehvermögen ist ungetrübt; sie kann ganz kleine Schrift lesen. Bei der Untersuchung zeigt sich das ganze feine Gefässnetz zurückgebildet, die Centralgefässe sind nur etwas voluminöser als auf der gesunden Seite. Unter Anempfehlung der äussersten Vorsicht wird die Kranke entlassen.“

Nach den Beobachtungen von Stellwag wird das für Retinitis charakteristische Gefässnetz in der Regel sehr bald so dicht und feinmaschig, dass die Choroidea durch dasselbe vollständig verdeckt wird. Bei weiterer Entwicklung führt das Infiltrat zur Resorption der Retina und zur partiellen Synchysis. Eine florähnliche Exsudatmembran liegt noch über der wieder sichtbar gewordenen Choroidea und könnte für leichtgetrübtete Retina gehalten werden. Doch fehlt dieselbe meist vollständig, wofür einmal das Fehlen der Netzhautgefässe und dann der Umstand spricht, dass in der synchytischen Flüssigkeit Cholestearinekrystalle, Fetttropfen, abgestossenes Pigment, Blutkugeln u. dgl. fluctuiren; was bei Integrität der Netzhaut nicht wohl möglich ist. — Andere Male degenerirt die Retina in derselben Weise, wie der Sehnerv: „Ein Theil des Infiltrates geht die Zellenbildung ein; es bildet Zellen an, die sich in Kurzem mit Fettkügelchen füllen, in Körnchenzellen übergehen, zerfallen und ihren Inhalt entleeren. Ein anderer Theil des Infiltrates verdichtet sich zu faserspaltenden, sehnigen Streifen und Bändern, welche den Nerven durchziehen. Die Nervenröhren nehmen an diesem Processe den innigsten Antheil. Manche derselben verfetten, während andere in den sehnigen Streifen und Bändern untergehen und so stellenweise unterbrochen werden.“ (Stellwag.) Die Netzhaut wird dabei dick, undurchsichtig, schmutzig gelblich, die Gefässe obliteriren und häufig stellen sich kleine hämorrhagische Heerde ein. Mit der Aufsaugung der den Glaskörper theilweise ersetzenden gelatinösen Flüssigkeit löst sich die Retina partienweise ab und wölbt sich nach Vorn, während sich hinter ihr Exsudate von der Choroidea ablagern.

Jahre lang hinziehen, endigt indess stets, wenn man es wirklich mit Krebs zu thun hatte, mit Zerstörung und Tod.

Die Exstirpatio bulbi kann allein von dem örtlichen Uebel befreien, das indess an einer anderen Stelle wieder auftritt, wesshalb man besser auf alle Heilungsversuche verzichtet.

Hyperaesthesia retinae,

gesteigerte Reizbarkeit der Netzhaut kommt entweder in ihr selbst nach Ueberreizung derselben durch grelle Lichtwirkung (Blitze, Arbeiten bei oder in hellem Lichte, zumal Gaslicht, Betrachten der Sonne oder reflectirter Sonnenstrahlen, z. B. auf weiten Schneeflächen, Helligkeitsbestimmungen, mikroskopischen, ophthalmoskopischen und ähnlichen Forschungen), durch Ueberanstrengung der Augen (anhaltenden Gebrauch ungeeigneter Brillen, zu lange fortgesetztes Prüfen von geschliffenen Gläsern, Prismen, besonders ophthalmologische Studien an den eigenen Augen, Arbeiten in sehr feinen Gegenständen, zumal in dämmeriger Beleuchtung etc.) oder nach Hyperämie der Netzhaut in Folge anstrengender Thätigkeit in der Sonnenhitze zu Stande oder sie wird auf sie durch den *nerv. opticus* und den sympathischen vom *Ganglion ciliare* kommenden, mit der *art. centr. retin.* verlaufenden Nervenfasern vom Gehirn her übergeleitet. Im Gehirn sind es sowohl Congestion, Irritation, Inflammation als auch verschiedenartige Intoxicationen durch Chloroform, Aether, Stickstoffoxyd, Digitalis, Opium, Cannabis indica, Belladonna etc., welche durch Irradiationen die Ueberreizung der Netzhaut bewirken können. — Leichtere und schnell vorübergehende Grade erfolgen aber schon auf geringe Reize, z. B. anhaltenden Fingerdruck auf den Bulbus, Galvanismus u. d. m., die schweren durch alle Momente, welche die Cerebral- und Nervenfunctionen überhaupt excitiren, aus welchem Grunde *Romberg* sie mehr der Reizung, nicht der Reizbarkeit zuzählt (Cfr. Nervenkrankheiten p. 109); doch ist der Unterschied nur ein gradueller, wesshalb wir es vorziehen, in unserer Darstellung, der grösseren Klarheit wegen, von einer sachlichen Differenzirung Beider zu abstrahiren. Aus Dauer oder Wiederholung der Reizung resultirt die Reizbarkeit. Die Aeusserungen dieses krankhaften Erregungszustandes der Netzhaut sind so zahlreich, wie die Ursachen mannichfaltig, die Grade verschieden und die Prognose und Ausgänge ungleichartig sind.

Vorzüglich sind es die subjectiven Aeusserungen der *Retinal-hyperaesthesie*, welche in verschiedenartigster Weise erscheinen, zu unzähligen bildlichen und vergleichungsweisen Bezeichnungen hinführten und desshalb um so verwirrender wirken mussten, als sich diese *Hyperaesthesie* mit vielen energischen Krankheitsprocessen im Auge compliciren kann und ihre Aeusserungen dann allzuleicht als Symptome jener Grundprocesse verstanden

werden. Die subjectiven Lichterscheinungen werden besonders im Dunkeln oder bei geschlossenen Augen deutlich wahrgenommen, aber auch im Hellen, wo sie dann das Sehen nur mehr oder weniger beschränken. Nach den Ursachen und dem Grade sind sie von Allgemeinzufällen, Schwindel, Benommenheit und Schmerzhaftigkeit im Kopfe, Druckgefühl im Auge, Brechneigung etc. begleitet und zeigen nach dem Character des Grundübels einen intermittirenden oder remittirenden Typus.

Die Reizbarkeit der Netzhaut kann partiell oder total gesteigert sein. Im ersteren Falle sind die subjectiven Erscheinungen auf die ergriffene Partie beschränkt, während das Gesichtsvermögen auf dem übrigen Theile der Netzhaut nur unwesentlich verringert ist. Sie in allen Formen, wie sie von Kranken beschrieben werden, zu schildern, ist um so schwieriger, als mit ihnen gleichzeitig die Schatten von Glaskörperopacitäten, Choroidaldruck- und Congestionsphänomene, Trübungen im Linsen-, Kammer- und überhaupt dem ganzen dioptrischen Systeme vorkommen und nur durch experimentelle Untersuchung oder Wiederholung der Erscheinungen am eignen Auge von diesen zu trennen sind. Die Aufgabe, alle subjectiven Symptome gestörter Dioptrik und Katoptrik bis zur absoluten Blindheit in übersichtlicher Klarheit und sicher darzustellen, ist noch ungelöst.

Die Wahrnehmung von Lichtbildern (*Photopsie*) ist von unendlicher Mannichfaltigkeit, wobei zu merken, dass die Regenbogen, Scheiben, Ringe mit stets erneueter excentrischer Reproduction auf einer Erregung beruhen, die sich von der *macula lutea* sowohl als von der optischen Papille aus in die Kugelinnenfläche fortsetzt. Dasselbe gilt von den Farbenbildern (*Chropsie*, *Chromopsie*), die bei grösserer Extensität der Hyperästhesie auf eine geringere Intensität derselben hindeuten scheinen. Mückenartige Gebilde (*Mouches volantes*, *Myodesopsie*) verdanken in der Regel dem dioptrischen Apparate ihre Entstehung. Das Sichtbarwerden der sogen. *Purkinje'schen* Aderfigur (seit 1819 bekannt gemacht) auf einer weissen Wand gehört theilweise hieher, da es, wie das Entstehen der Laterna magicabilder, nur als Spiel der Schatten von den *vas. centr. retin.* zu betrachten ist. Indem das schnelle Hin- und Herbewegen des Lichtes vor der kleinen Pupille in dunklem Raume blendend wirkt, kommt Hyperästhesie zu Stande, die schnell auf einander sich zeigenden Schatten wirken wie ein continuirliches Schattenbild, dessen Eindruck hernach wohl einige Minuten in der Stäbchenschicht fortbestehen kann.

Leichtere Grade der *Retinalhyperaesthesia* vergehen ohne irgend welchen Nachtheil, wovon man sich überzeugen kann, wenn man nach einem flüchtigen Blick in die Sonnenscheibe das Auge auf weisses Papier wendet. Der anfänglich lichte Fleck variirt in Zeit von einigen Minuten durch Gelb, Roth,

endlich in Violett, womit sich die Wiederkehr der normalen sensorischen Thätigkeit der Retina ankündigt.

Höhere Grade verlaufen chronisch und führen mit den entsprechenden Fort- und Ausgängen der Causalübel meistens zur Anästhesie der Netzhaut und damit zu dem beklagenswerthesten Symptome aller Augenkrankheiten, zu unvollständiger oder vollständiger Erblindung. Einzelne Theile der Netzhaut können schon anästhetisch sein, während in anderen noch *Hyperaesthesia* vorwaltet. Andere Male können die subjectiven Lichtphänomene bei bereits vollständiger *Retinalanaesthesia* einem Erregungszustande der Centraltheile des *Nerv. opticus* angehören.

Die Diagnose der hyperästhetischen Erscheinungen wird auf dem Wege der Exclusion durch den Augenspiegel sehr erleichtert, indem man nämlich alle entoptischen Schattenkörper in den durchsichtigen Augenmedien als nicht der Netzhaut entstammend ausschliesst; nur ist freilich häufig die Anwendung der bis jetzt construirten Ophthalmoscope noch sehr empfindlich für gereizte Netzhäute.

Dem Grade und den Ursachen gemäss stellt sich die Prognose günstig oder ungünstig. Man hat bei localer Veranlassung beobachtet, dass die *Hyperaesthesia*, an sich schon eine *Vesania visus*, zu eigentlicher *Vesania* hinübergeführt hat, wobei nicht zu übersehen, dass sie auch als eine der ersten Folgen begonnener *Vesania* auftreten kann. *Romberg* sagt: „Die psychische Beziehung der optischen Hyperästhesie ist bedeutend. Keines anderen Sinnesnerven Affection zwingt so verführerisch zur Anerkennung einer Objectivität der Phantasmen, keine andere führt so leicht zur Entfremdung des Selbstgefühls an ihren Erscheinungen und hierdurch zum Irresein.“ (l. c. p. 113.) — Diese eigentlich phantasmagorische Wirkung ist indess meist nur dann vorhanden, wenn der Centralapparat des Sehnerven primär ergriffen ist. Die Phantasmen erscheinen immer in der Fläche, doch weist die Bewegung derselben wohl nicht, wie *Romberg* p. 110 anzunehmen scheint, auf vorwiegende Affection des peripherischen Apparates hin.

Die Therapie hat in erster und letzter Instanz die causal Momenten zu beseitigen, woraus hinlänglich die Nothwendigkeit scharfer Individualisirung hervorgeht. Blutentleerungen können das Uebel beseitigen, aber auch bis zum Eintritt vollkommener Erblindung steigern. Alles, was örtlich reizen kann, muss abgehalten, das Licht durch Augenschirme, graue und blaue, aber durchaus reine Brillengläser abgedämpft werden. Ableitungen, sogar eigentliche Antiphlogose können von Nutzen sein, je nach der Natur des Grundleidens. Besonders werde auf den Unterleib gewirkt, wo ein Causalnexus mittelst des Sympathicus erweisbar ist.

Verlauf und Dauer variiren sehr, so dass man eine acute und chronische Form unterscheiden könnte. Die acute führt nicht selten in 24 Stunden zu vollständiger Functionsstörung der Netzhaut, wie z. B. unter gleichzeitiger Congestion der Retinal- und Choroidalgefässe bei dysmenorrhoeischen Mädchen, wo indess sofort eingeleitete Kunsthülfe baldige Besserung und gänzliche Heilung bewirkt. Nur ist die Neigung zu Recidiven und zu chronischem Verlaufe gross, wesshalb fortgesetzte Aufmerksamkeit auf jede Anomalie der Unterleibsfunctionen erforderlich bleibt. Der chronische Verlauf unterliegt vielerlei Schwankungen, besonders hinsichtlich des Gesichtes, indem die subjectiven Symptome periodenweise zurücktreten können, um der sensoriellen Norm, aber auch um graduell different gesteigerter Anästhesie Platz zu machen.

Die objectiv nachweisbaren Symptome sind zur Zeit noch gering. Ausser denen des Allgemeinleidens weist *Desmarres* bei chronischem Bestande auf eine wulstförmige Vorbauchung der Iris zwischen deren grossem und kleinem Ringe hin, die aber nicht constant aufzutreten und mehr der chronischen Choroidealcongestion anzugehören scheint. Die Irisbewegung gibt ebenso keine sicheren Anhaltspunkte, da bald Enge, bald Weite der Pupille, bald beschleunigte, bald verlangsamte, auch wohl eine unregelmässige Thätigkeit der Irisfasern (*Hippus*) beobachtet wird. Die Pupille bleibt schwarz, Conjunctiva, Tenon'sche Kapsel und Sclera sind unverändert oder mit braunrothen Gefässramificationen durchsetzt, die bei chronischen Congestivzuständen des Auges selten fehlen. — Rauchige, starre, weite Pupille ist nicht mehr Symptom der Hyperästhesie. — Der Lidschlag ist lebhafter, oft ist Zucken der Lider ohne eigentlichen Lidkrampf vorhanden, dabei Aengstlichkeit des Gesichtsausdruckes und der ganzen Körperhaltung.

Begleitet acute Congestion den hyperästhetischen Anfall, so wende man alle dagegen geeigneten Mittel an. Reicht eine Venaesection nicht aus, so lasse man Blutegel an die Schläfe, die Zitzenfortsätze, an den After, in die Nase setzen oder noch besser den Nacken und den Rücken bis an's Kreuz tüchtig abschröpfen. Der Junot'sche Stiefel, Fussbäder mit Senf, Senfteige u. d. sind ebenso am Platze, späterhin fliegende Vesicantien und geeignete Mittel, um täglich 2—3malige Leibesöffnung zu erhalten, überhaupt Alles, was die Wiederkehr der Congestion vermeiden hilft, also auch blande Diät, passende Bewegung, continuirlicher Gebrauch nicht zu kräftiger Brunnenwässer. Hämorrhoiden, Dysmenorrhoeen, Helminthen erfordern die entsprechenden Curmassregeln.

In leichteren Graden kann man umstimmend auf die Magenerven wirken durch kohlensäurehaltige Getränke, Säuren etc.; auch ist Tart. stib. in refr. dosi empfohlen, doch sagt *Romberg* richtig: „von umstimmenden, ekelerregenden Heilmitteln hat

man sich mehr versprochen, als sie leisten.“ — Spirituosa, auch Kaffee und Thee müssen vermieden werden, kalte Ueberschläge und Augendouchen wende man nur versuchsweise an, ebenso lasse man die Bewegung im Freien und den Genuss der Luft nicht ohne vorsichtige Beachtung der nächsten Wirkung zu. — Oertliche Mittel erwiesen sich nicht als dienlich.

Hemiopia ex. hyperaesthesia retinae,

temporäres Halbsehen, Minuten, halbe und ganze Stunden anhaltend, ist eine ebenso interessante als seltene Localisation eines gesteigerten Ueberreizungssustandes der Gesamtnervensphäre, der mit der Blutbeschaffenheit und dem Kreislaufe in Causalnexus steht. Die Hyperästhesie ist auf einzelne Stellen der Netzhaut beschränkt, denen entsprechend Lücken im Gesichtsfelde, oft sehr plötzlich, entstehen und meistens deshalb dunkel erscheinen, wie bei partieller Anästhesie, weil das übrige Gesichtsfeld die normale Helligkeit nicht verliert ¹⁾.

Metamorphopsie nennt man diese Gesichtsstörung dann, wenn die Gesichtsobjecte in Folge unregelmässiger Netzhautreizung verdreht, verschoben, zerrissen erscheinen, wenn halbe oder Viertelblattseiten eines Buches leer sind. In letz-

¹⁾ Mir schien es wenigstens in mehreren Fällen, die ich genau beobachten zu können das Glück hatte, unzweifelhaft, dass der Eindruck der Verdunkelung des halben Gesichtsfeldes nicht von vorübergehender Lähmung der halben Netzhäute, sondern von hochgradiger Erregung derselben herrührt, die im Gegensatze zu der blendenden, unmittelbar an sie anstossenden, hellbeleuchteten Partie des Sehfeldes als vollständige Verdunkelung wahrgenommen wurde. Eine junge, hübsche Dame, schlank, schwarze Haare, blaue Iris, feiner, weisser Teint, nervös aufgereggt, klagte plötzlich, sie sehe ein grosses, rundes Knäuel weissen Garnes, mit dem sie beschäftigt war, nur noch halb. Von mir aufmerksam gemacht, fand sie, dass alle Gegenstände, vor ihr stehende Personen etc., ihr nur noch zur Hälfte sichtbar waren. Von den vorgehaltenen fünf Fingern sah sie den Ringfinger und den kleinen Finger nicht. In ein stark verdunkeltes Nebenzimmer geführt, sah sie ihre weisse Garnkugel wieder als Kugel, die eine Hälfte aber auffallend dunkel, ähnlich, wie sie es passend ausdrückte, wie man bei Halbmond zu Zeiten auch wohl die nicht beleuchtete Hälfte doch wohl ganz schwach sehen könne. — Nach Verlaufe einer halben Stunde war diese erethische Hemiopie allmählig gänzlich verschwunden.

Ein zweiter Fall ist ebenfalls nennenswerth, da er die Möglichkeit einer anderen Erklärung seiner Genese zulässt. Der kürzlich verstorbene Prof. Bernd in Bonn war verschiedene Male von mir an spontanem Bluterguss der Conjunctiva bulbi behandelt, als er mir gelegentlich erzählte, dass er zu Zeiten noch an einem andern Augenübel leide, nämlich an temporärer Halbblindheit, die sich meistens auf die obere Hälfte des Gesichtsfeldes beschränke, einige Stunden anhalte, besonders auf stärkeren Promenaden ihn be falle und mit gelindem Schwindel verlaufe, so dass es ihm schwer falle, den Heimweg zu machen. Kurz vor der letzten Augenblutung, die fast die ganze Sclera roth um die unveränderte Cornea erscheinen liess, habe auch ein solcher Anfall stattgehabt. — Wenn hier Choroidealcongestion in der unteren Partie, der oberseitigen Halbblindheit entsprechend, als Ursache angenommen werden darf, weil Congestion nach den Augen habituell war und auch jene Ergüsse hervorrief, sollte es dann nicht mehr zu rechtfertigen sein, jene Hemiopie als eine temporäre Anaesthesia, nicht als Hyperästhesie der Netzhaut anzusprechen?

terem Falle ist die Lücke oft nicht dunkel, sondern schmutzig weiss, wie beschattet, (*Visus interruptus*).

Nyctalopia, Tagblindheit,

Unvermögen, bei heller Tagesbeleuchtung deutlich oder überhaupt zu sehen, ein der *Retinalhyperaesthesia* sich anreihender, aber sehr seltner Zustand. In der Dämmerung, sogar in vollkommener Dunkelheit, wie behauptet wird, ebenso bei Mond-, Sternen- und Kerzenlicht ist der Gebrauch der Augen uneingeschränkt, mit Anbruch des Morgens tritt aber wieder die Functionsanomalie der Netzhaut ein. Dies Leiden bildet sich wohl nur bei Personen aus, die verhältnissmässig lange Zeit in dunklem Raume gefangen gehalten wurden, in dem sie endlich scharf zu sehen anfangen. Die Wiedergewöhnung an das Licht erfolgt erst allmählig. Andere Male tritt es als typische Neurose auf, über die es zur Zeit noch an wissenschaftlichen Berichten fehlt. Das bessere Sehen der Albino's im Dunkeln beruht auf etwas Anderem, nämlich dem Aufhören der Blendung aus Pigmentmangel. (Siehe Albinismus.) Dafür, dass gesteigerte Reizbarkeit der Netzhaut Ursache der Tagblindheit ist, spricht die sie meistens begleitende spastische *Myosis*. Sie wird mehr in südlichen, als in unseren Climates beobachtet.

Die Therapie muss den ursächlichen Verhältnissen angepasst werden, Emetica, Laxantia, Derivantia werden kaum so viel nützen, als vorsichtige Gewöhnung an das Licht. — Nervina? —

Anaesthesia retinae,

Abnahme oder gänzlicher Verlust der Energie der Netzhaut kann einen Theil oder die ganze Netzhaut betreffen und vorübergehend auftreten oder permanent und zur unheilbaren Blindheit, dem sogenannten schwarzen Staare (*gutta serena, Amaurosis*) werden.

1) *Anaesthesia retinae partialis*, meistens nur Vorstadium der totalen Anästhesie, gibt sich durch Lücken in dem Sehfelde zu erkennen. Ist die Anästhesie noch unvollständig, so sind die Lücken, die den gelähmten Partien der Netzhaut entsprechen, farbig, später erscheinen sie absolut dunkel, wie leergebliebene Stellen in einem Gemälde. Die Form dieser Lücken ist variabel, fleckig, streifig, punkt- und netzförmig, je nach der Form der nicht mehr fungirenden Partie in der Retina und deshalb auf jedem Auge eine andere. Nur bei Transscendenz der partiellen Anaesthesia vom optischen Centralapparate werden identische Partien der Netzhaut ausser Function gesetzt und es tritt dann der Zustand auf, den man gemeinhin *Hemiopie*, Halbsehen, nennt und bei dem beiderseitig gleichmässig ein mehr weniger grosser Theil in dem an-

nähernd runden Gesichtsfelde fehlt. — Mehrere auch hieher bezügliche Einzelheiten kommen bei der *Anaesth. ret. imperf.* zur Sprache. —

2) *Anaesthesia retinae totalis perfecta*, gänzlicher Verlust der Energie der Netzhaut, und *imperfecta* s. *Torpor ret.*, welche denjenigen anästhetischen Zustand der Netzhaut bezeichnet, während dessen noch ein beschränktes Sehevermögen stattfindet, der aber in der Regel nur Vorstadium des gänzlichen Verlustes der Energie der Netzhaut ist. Die Differenz ist eine graduelle und die Benennung des ersten Grades *Amblyopie* und des zweiten oder der absoluten Erblindung *Amaurosis* kein Gewinn. Die Abnahme der Retinalenergie oder, wie sich dieselbe äussert, die Abnahme des Gesichtsvermögens, ist eine gleichmässige, ungetheilte; die Symptome von Hyperästhesie, welche diesen Zustand begleiten, gehören nicht der Retina, sondern dem *nerv. opticus* und dem Centralorgane an. Man unterscheide desshalb unter den Scotomen genau. Nur die unerhellten, fixen sind anästhetische oder paralytische; sie bewegen sich allein um den Drehpunkt des Bulbus, verändern ihre Gestalt wenig oder gar nicht und die Farbe nur dann deutlich wahrnehmbar, wenn das geschlossen gewesene Auge plötzlich dem hellen Tageslichte ausgesetzt wird. Ist die Anästhesie noch im Beginn, so verliert sich das Scotom bei der Fixation desselben im Lichte wohl, aber nur zeitweilig. Die Wiederkehr kündigt sich dadurch an, dass eine dunkle Wolke in dem Raume zwischen dem Sehobjecte und dem Auge sich zu entwickeln und mehr und mehr zu verdichten scheint. Je nach dem Grade der Anästhesie ist diese Wolke durchsichtig oder undurchsichtig, in letzterem Falle meist mit durchsichtigen, verwaschenen Rändern. Sie kann sich vergrössern dadurch, dass andere ähnliche Scotome mit dem ersten zusammenfliessen. Für Tage oder Wochen können die Scotome geringer sein oder gänzlich ausbleiben.

Das Gesichtsvermögen ist um so besser, je mehr Licht in das Auge fällt, je stärker also die Netzhaut gereizt wird. Desshalb suchen die Patienten die Helligkeit, was man Licht-hunger (*Photolimie*) genannt hat. Das Betrachten kleiner Objecte ist ebenso um so schärfer, je besser dieselben beleuchtet und je näher sie dem Auge gebracht werden. Sie senden dann mehr Strahlen auf die kranke Netzhaut. Convexbrillen sammeln ebenfalls mehr Strahlen im Auge, wesshalb sie dem Patienten willkommen sind ¹⁾.

¹⁾ Sehr unpassend hat man diesen Zustand *Myopia spuria* genannt; falsch ist es allerdings, ihn mit der Kurzsichtigkeit, die auf anomaler Strahlenbrechung beruht und durch Concavbrillen corrigirt wird, in eine Kategorie zu bringen, aber wesshalb nach Laienfehlern wissenschaftliche Namen bilden?

Subjectiv wird zuerst geklagt, dass die Sehobjecte ihrer scharfen Contouren beraubt seien und in Schatten oder Nebel gehüllt erschienen. Morgens und Abends ist das Gesicht schwächer, als Mittags in hellem Lichte. Vorübergehende Besserung knüpft sich, oft nachweisbar, an günstigeres Allgemeinbefinden, allgemein schwächende Einflüsse dagegen machen sich auch sofort an den Augen geltend. Oft treten beim Fortgang des Uebels die Erscheinungen von *Hemiopie* intercurrent auf, andere Male erscheinen die Bilder der Gegenstände gegen ihren erfahrungsgemässen Umfang vergrössert oder verkleinert (*Megalopie*, *Micropie*).

Die Anästhesie der Netzhaut besteht oft neben der Hyperästhesie des *nerv. optic.* für sich, ebenso ist der Zustand der Empfindungs- und Bewegungsnerven ein verschiedener. Ging Hyperästhesie der Netzhaut der Anästhesie vorher, so besteht erstere nicht gar selten in den Ciliarnerven fort, das Auge ist schmerzhaft, empfindlich gegen das Licht, die Pupille verengert sich, die Lider werden geschlossen. Andere Male ist die Iristhätigkeit nur verlangsamt, die Pupillencontraction erfolgt erst, nachdem das Tageslicht minutenlang auf die torpide Retina eingewirkt hat. In der Regel ist die Anästhesie beider Nervensphären combinirt, so dass selbstintensive Sonnenstrahlen einen gleichmässig verringerten sensoriellen und sensiblen Reiz ausüben, der bei der *Anaesthesia retinae perfecta* = 0 wird.

Schreitet das Uebel auf einem Auge schneller fort, so beobachtet man, dass unwillkürlich dessen Sehachse von dem Sehobjecte abgelenkt wird, um das deutlichere Bild des anderen Auges nicht zu beeinträchtigen. Der so entstehende *Strabismus* ist stets temporärer Natur und gibt nicht zu *Diplopie* Veranlassung. Wohl aber geschieht dies, wenn bei annähernd gleichmässigem Fortgang der Gesichtsabnahme durch Verlust der motorischen Synergie des *nerv. opt.* die Achsen aus der associirten Stellung weichen. Hierbei ist zu beachten, dass das undeutlichere Doppelbild nicht dem Auge derselben Seite, sondern dem der anderen Seite angehört, also links gesehen wird, wenn es rechts entsteht. Ist die Axendifferenz zu gering, als dass Doppelbilder entstehen könnten, so entsteht nur ein Bild mit doppelten Contouren, das beim Schwanken der bulbi bewegt ist und je nach der Beleuchtung gross oder klein, jedenfalls missgestaltet erscheint (*Metamorphopsie*).

Die objectiven Symptome sind bisher ebenso unmassgebliche gewesen, als die subjectiven unzureichende, um die Diagnose mit voller Sicherheit zu stellen. Mit der Abnahme oder dem Verluste der Sehkraft verliert das Auge Leben und Seele, es wird ausdruckslos, stier, automatisch, in welchem Umstande Beweis genug liegt, dass diejenigen irren, welche behaupten, nicht der Bulbus, sondern die Schutzorgane des Bulbus seien es allein, wodurch Angesicht und Auge charakterische Bedeu-

tung für das Individuum erhielten. Ein Auge, das nicht mehr an der Bewegung der Aussenwelt Theil nimmt, erregt auch, ausser etwa Mitleid, keine Theilnahme mehr. Es bleibt ausgeschlossen von der Harmonie der Conflicte und büsst zugleich die harmonischen Bewegungen ein, die sich vom Auge aus über das Antlitz erstrecken. Es accommodirt sich nicht mehr, fixirt nicht mehr, die Sehaxen liegen parallel oder divergiren. Ausser verschiedenerlei Entartungen an den einzelnen Bulbus-theilen, die von ätiologischen oder complicativen Momenten bedingt sind, ändert sich Haltung des Auges, des Kopfes, des ganzen Körpers. Fast ohne Ausnahme wird bei vollkommner Anästhesie schliesslich das offene blinde Auge mit aufwärtsgerichteter Pupille dem Lichte, das es weder sieht noch empfindet, entgegengehalten, der Körper wird gerade, keck, wie herausfordernd, getragen, der Gang zeigt — Alles im Gegensatz zu cataractöser Erblindung — überflüssige Bewegung der Beine und hat etwas auffallend Zuversichtliches. Je länger die absolute Blindheit gedauert, in um so höheren Grade pflegen Gehör und Tastsinn ausgebildet zu sein; — selten, dass dem Verluste des Gesichtes der Verlust anderer Sinne folgt. Das Erblinden erfüllt mit Angst und Trauer, die Blindheit gibt dem Gemüthe ruhige, sogar freudige Resignation, — im Gegensatze zur Taubheit, bei deren Bestande Misstrauen und Bitterkeit häufiger sich einstellen. Es ist vielleicht nicht unrichtig zu sagen, Taubheit entfremde dem Mitleben mehr, als Blindheit.

Helmholtz hat das unvergängliche Verdienst für die Erkennung der objectiven Symptome innerer Augenkrankheiten, zumal der mit Blindheit drohenden oder verlaufenden, eine neue Zeit, die Epoche der wissenschaftlichen Semiotik dieser Alienationen, aufgeschlossen zu haben. Für Physiologie und Pathologie leistet der Augenspiegel in mancher Hinsicht mehr, als Secirmesser, Mikroskop und chemische Analyse. Denn während früher, da Augenkrankheiten fast nie tödten, nur todte Augen untersucht werden konnten, deren Leiden bereits vor langer Zeit abgelaufen waren und die nur noch als gänzlich entartete, verschrumpfte Reste übrig geblieben, ist es jetzt mit Hülfe der Spiegeluntersuchung möglich, das Werden und Sein dieser Processe mit ungeahnter Sicherheit zu beobachten. Seit *Helmholtz* Erfindung ist es als Vergehen an derselben zu bezeichnen, *Glaucom*, *Amblyopie* und *Amaurose* noch als substantive Krankheitseinheiten ansprechen zu wollen. Die Ophtalmopathologie ist wesentlich bereichert worden, für die Therapie stellen sich andere und rationelle Aufgaben.

Netzhäute mit Hyperästhesie gestatten die Untersuchung mit dem Spiegel nicht stets, zumal wenn, wie gewöhnlich, auch die Ciliarnerven an der Hyperästhesie participiren, wohl aber anästhetische Netzhäute, die hier und die überhaupt mehr in Betracht kommen.

Prognose und Therapie hängen mit der Aetiologie der Retinalanästhesie so innig zusammen, dass es zweckmässig erscheint, diese drei Gesichtspunkte bei der Besprechung der ursächlichen Momente nicht zu trennen. Zugleich sei bemerkt, dass alles hier zu Sagende auch insofern von der *Anaesthesia retinae perfecta* gilt, als es für die Aetiologie derselben das gleiche wissenschaftliche Interesse hat, von prognostischem oder curativen Werthe es aber nicht sein kann für ein Leiden, das nach unserer Definition durch unersetzlichen Verlust der optischen Sinnesaction characterisirt ist.

Die Aetiologie ist ebenso wichtig als sie schwierig ist und um so wichtiger, je unumgänglicher nothwendig sie für differenzirende Diagnostik, Prognose und Therapie erscheint. Substrat der Anästhesie können die verschiedenartigsten Anomalien werden. Meistens combiniren sich mehrere. Sowohl der besseren Uebersichtlichkeit halber, als auch weil diese Gesichtspunkte durch die Natur der Sache geboten scheinen, ordne ich sie in folgende Kategorien:

- 1) Angeborene und ererbte Anästhesie,
- 2) aus mechanischen Ursachen,
- 3) local,
- 4) durch alienirte Blutmischung entstandene,
- 5) aus anderen Nervenprovinzen zugeleitete.

1) Angeboren ist Anästhesie nur in Complication mit anderweitigen Hemmungsbildungen, Wassersucht im verbildeten Bulbus, Gehirn und Schädel u. d. m. beobachtet worden. Bleiben die Individuen am Leben, so gesellt sich der Anästhesie, die fast stets eine vollständige ist, sehr bald *Strabismus* und *Nystagmus* zu.

Hereditär kommt Anlage zur Anästhesie nicht selten vor. In einem bestimmten Lebensalter fängt sie in der Regel langsam an sich auszubilden und widersteht allen Heilversuchen. Divergenz der Sehachsen und Nystagmus bleiben nicht aus, wie sie überhaupt jeder früh erworbenen Blindheit sich regelmässig bald compliciren.

2) Mechanische Ursachen, welche nicht direct auf die Retina wirken, sondern indirect, und zwar durch das Gehirn oder den Sehnerven in der Weise, dass durch sie die Leitungsfähigkeit des *nerv. opt.* beschränkt oder aufgehoben wird. In dieser Hinsicht müssen genannt werden syphilitische Nodi und Tophi, tuberculöse Exostosen und Exsudate, blutige und seröse Apoplexien, rheumatische und arthritische Producte, von denen die ersteren häufiger im Neurilem des *nerv. optic.*, letztere im Bereiche der Choroidea vorkommen, gut- und böartige, krebsige Tumoren und andere organische Veränderungen.

3) Die localen Veranlassungen sind die zahlreichsten und bei den entsprechenden materiellen Alienationen ihres Ortes erörtert worden. Rein idiopathische Genese scheint überhaupt

nicht stattzuhaben, wenn nicht die erbliche Form etwa als solche bezeichnet werden soll. Hervorzuheben sind die Congestion und die partielle wie die totale Entzündung, sowohl in der Retina, als in der Choroidea und Hyaloidea, die intra-oculären Blutergüsse mit den oft auf ihnen beruhenden Glaskörperopacitäten, seröser Erguss aus der Choroidea unter die Netzhaut, Gefässkrankheiten (Obliterationen und Aneurysmen) im Auge, Papillaranomalien, tuberculöse Exsudate, Traumen, fremde Körper, Entozoen (wie der *Cysticercus cellulosae*), Sclerectasien, besonders aus Sclerotico-Choroiditis posterior hervorgegangen. Hierher gehören sodann alle Ursachen der *Hyperaesthesia*, welche in *Anaesthesia* endigt, also auch die bekannte, indess noch nicht mit hinreichender Genauigkeit in ihrer Genese und ihrem Wesen erkannte *Commotio retinae*.

4) Im Blut liegen nicht selten die ursächlichen Momente; besonders wirken, wie bemerkt, Congestion, Meningitis, Exantheme, wie bei *Hysterie*, bei der die *Anaesthesia* aus *Hyperaesthesia* hervorgeht, bei Gravidität, heftigen Nasencatarrhen, Epilepsie, höherem Grade des Rausches u. s. w., aber auch durch Alienation der Mischung; so bei allen Krankheiten, bei denen Galle, Harn, pathologische Secrete im Blute verbleiben, Icterus, Diabetes, Morb, Brightii und andere Nieren-(?) krankheiten, Rücktritt von Fussgeschwüren und -schweissen, Intoxicationen, durch Chinin und andere Amara, Blei, Narcotica (*Digitalis* etc.), ferner alle Säfteverluste mit nervöser Ab- und Ueberspannung, also z. B. Masturbation, doch ist zu merken, dass der Anästhesie aus solchen Ursachen eine zeitweilige *Hyperaesthesia* vorherzugehen pflegt.

5) Von anderen Nerven ist es besonders der Sympathicus, der nicht selten zu vorübergehender *Anaesth. retin.* führt, wie wir dies bei Uterinalreiz, Helminthiasis und anderen Unterleibsaffectionen sehen, wo sich zufolge der gesteigerten, motorischen Erregung desselben die radialen Irisfasern contrahiren und Gesichtsschwäche eintritt. Geht das Causalübel vorüber, so kehrt auch die normale Retinalfunction alsbald zurück. Die Fälle, wo die *Anaesthesia* andauernd blieb, sind nur ausnahmsweise beobachtet. — Reizungszustände des Trigeminus scheinen ebenso auf den Opticus und die Retina paretisch wirken zu können, wie ex juvantibus geschlossen wird. Exstirpation von Geschwülsten, die den Trigeminus drückten, Extraction cariöser oberer Mahlzähne, chronische Entzündung im Nerven-, z. B. dem Supra- oder Infraorbitalaste, durch Quetschung veranlasst und durch Excision gehoben, und ähnliche Beobachtungen werden hiefür als Beweise (von freilich zweifelhaftem Werthe) beigebracht. — Andere Male scheint ein gewisser Zusammenhang mit Spinalirritation, *Tabes dorsualis* und ähnlichen Rückenmarksaffectionen unzweifelhaft; die Erscheinungen der gesteigerten und der verringerten Erregbar-

keit treten in der Retina abwechselnd und in Uebereinstimmung mit dem Symptomenwechsel im Rückenmarke auf.

Hemeralopia, Nachtblindheit,

Unvermögen, anders als bei heller Tagesbeleuchtung deutlich oder überhaupt zu sehen, ist so selten wie *Nyctalopie* und beruht auf *Retinalanaesthesia*, neben der Iristrägheit, Schwindel, Kopfschmerz u. d. m. nur als zufällige Nebensymptome auftreten. Das Uebel stellt sich meist plötzlich ein und verliert sich ebenso plötzlich wieder, doch verliert es auch wohl den typischen Character, um als *Anaesthesia perfecta totalis* constant zu bleiben. Die aufgezeichneten Fälle bieten viele graduelle Abstufungen, manche Kranke scheinen nur Unempfindlichkeit gegen künstliches Licht zu haben, bei anderen erlischt das Sehevermögen mit dem Unsichtbarwerden der Sonne vollständig, um vollständig mit dem Tage wiederzukehren. Als Ursachen werden feuchte, tropische Gegenden, schlechte, nur vegetabilische Nahrung, zu grelles Sonnenlicht u. m. A. aufgeführt; epidemisches Auftreten wird behauptet, in welchem Falle die Prognose günstiger sein soll. Das sporadische Vorkommen führt meist zur Blindheit.

Bei der geringen Kenntniss der Krankheit lässt sich auch für die Therapie wenig Specielles sagen. Ausser Behandlung etwaiger Allgemeinleiden ist Schonung der Augen, Gebrauch blauer Brillen, reine Luft, blande Diät, Bewegung und allenfalls Waschung der Augengegend mit aromatischen Flüssigkeiten zu empfehlen.

Obliteratio art. cent. retinae partialis,

eine Lumensverengung, die, wie Rigidität der Gefässwandungen überhaupt, vorzugsweise dem senilen Alter eigen thümlich ist, bei atheromatösen Processen aber auch im Jünglingsalter vorkommt und, wie unsres Wissens *A. v. Gräfe* zuerst nachgewiesen hat, zu Blutstauungen in den Gefässen des Opticus Anlass gibt. Der Process und die Stauung lassen die optische Papille in centro hügelförmig prominiren, während die peripherische Partie im Retinalniveau bleibt und sich als schmutzigweisser Ring darstellt, von der der Hügel in verschiedenen Nuancirungen vom Gelbweissen, Schiefergrauen, bis zum Schmutzigrothen sich abhebt. Während die Arterienzweige vom Austritt an sichtbar bleiben, verlieren sich die Venen, wie abgeschnitten, sobald sie den Ring um die prominirende Papille überschritten haben, so dass es scheint, als senkten sie sich, von der Substanz derselben überdeckt, unsichtbar in das Gewebe des Opticus ein. Ob dieser im Zustande der Malaxie ist? Ob der atheromatöse Process von der *Art. ophthalmica* aus sich unausgesetzt bis in die centralen Netzhautarterien erstreckt? bleibt einstweilen Problem. Sicher ist, dass bei dieser Entartung Pulsbewegung in den Arterien und Venen auffallend

deutlicher durch den Augenspiegel beobachtet wird und zwar durch längere Perioden hin, so dass von einem acuten Uebel nicht füglich zu sprechen ist.

Es erscheint desshalb gewagt, mit *A. v. Gräfe* in diesem Zustande ein Stadium primum oder prodromorum des Glaucoms zu sehen und dadurch ein Wesen für diesen wesenlosen Namen zu statuiren. Warum dieses glaukopische Gespenst der Vergangenheit noch immer mit Namen nennen? Man gönne ihm seinen Platz im Gebiete der Schatten und Reflexe und lasse sich durch dasselbe bei der Erforschung und Erhebung wissenschaftlicher Schätze fortan nicht beunruhigen.

IX.

Die Augennerven.

Die Nerven, welche zum Auge und seinen Schutzorganen gehen, können hinsichtlich der Energie ihrer Functionen in einen krankhaften Zustand der gesteigerten oder der verringerten und aufgehobenen Thätigkeit versetzt werden, also der Hyperästhesie und der Anästhesie, der Hypercinesis und der Acinesis verfallen. — Was

1) Die sensoriellen Nerven, oder das Sehnervenpaar, den Nerv. opticus betrifft, so vermittelt derselbe unmittelbar ausschliesslich die Sinnesfunction des Sehens, d. h. die Fortleitung der Retinalperception oder der physicalisch in der Stäbchenschicht entstandenen Bilder nach dem Gehirne, das die Perception auf den übrigen Nervenbahnen dem ganzen Organismus mittheilt, d. h. sie zum Gemeingut des Individuum constituirenden Theile macht und sie dadurch zum Bewusstsein bringt. Durchschneidung, wie das Experiment an Thieren und vereinzelte Beobachtung am Menschen nachgewiesen haben, und organische Zerstörung machen diese Vermittlung unmöglich. Es entstehen noch Bilder auf der Retina, es hat aber die sie dem Bewusstsein übermittelnde Action zu wirken aufgehört. Der bekannte Larrey'sche Fall lehrt, dass theilweise Zerstörung der rechten Opticuswurzel nur eine entsprechende Lücke im Sehfelde bewirkte oder dass von dem ganzen Retinalpercepte nur der Theil zur bewussten Wahrnehmung gelangte, für den die Fasern im Fortleitungsapparate nicht zerstört waren. Er selbst schon scheint wie die Cerebralthteile, in die er überleitet (zunächst die corp. quadrig.) einer intuitiven Wahrnehmung fähig, wofür der Umstand spricht, dass Reizursachen, z. B. Blutdruck, unmittelbar und Cerebralerstörungen mittelbar nach dem Gesetze der excentrischen Erscheinung

reelle Empfindung unreeller Lichter und Gestalten zu erzeugen vermögen. Auf die Weise, also durch *Hyperaesthesia nerv. optici*, kommt bei gestörter wie bei nichtgestörter Retinalfunction Wahrnehmung von Helligkeit, die Blinde oft zu dem Irrthum wiederkehrenden Sehvermögens verleitet hat, und von Bildern zu Stande, die zur Fehlerhaftigkeit des Urtheils führen oder auf ihr beruhen. Hierher gehört, was von spontaner Phantasmagorie, von Hallucinationen des Gesichts, von Vor-, Nach- und doppeltem Gesichte u. s. w. gesagt wird.

Die *Anaesthesia nerv. opt.* beruht auf Zerstörung seiner Elemente und äussert sich durch Leitungsunfähigkeit, also auch durch Blindheit. Diese Zerstörung wird durch blutige, seröse und eitrige Heerde, durch Nodi, Tophi, Tumoren und Exsudate, also durch Druck von Aussen, oder durch rheumatische Ablagerungen im Neurilem, durch Entzündung, Erweichung, Verschwärung, Verhärtung etc. des Nerven selbst hervorgebracht. Ophthalmoscopisch ist die entstandene Leitungsunfähigkeit nicht sofort nachweisbar, die Retina scheint oder erscheint wenigstens noch normal und desorganisirt erst allmählig in einem ohne Mikroskop erkennbaren Grade.

Analoge Centralanomalien haben für die Retina denselben Effect ¹⁾.

2) Die motorischen Nerven, das 3., 4., 6. und 7. Paar; der *Nerv. oculomotorius*, dessen kleiner Oberast den *Musc. levator palp.* und *M. rectus sup.*, dessen grösserer Unterast die *Musc. rect. internus*, *rect. inf.* und *obliq. infer.* versorgt und die kurze Wurzel zum *Gangl. ciliare* abgibt, der *Nerv. trochlearis*, der zum *M. obliq. super* geht, der *Nerv. abducens*, der sich im *M. rectus ext.* verzweigt, und der *Nerv. facialis*, der Zweige in den *M. orbicularis* sendet, vermitteln hauptsächlich die Bewegung, während das *Gangl. ciliare*, in der

¹⁾ Im Gehirn und Rückenmarke sind es wässrige und blutige Ergüsse, Erweichung, Entzündung, Abscess-, Tuberkel- und Krebsbildung, die in derselben Weise, wie organisirtes Meningitisexsudat den Sehnerven einhüllt und zur Degeneration veranlasst, rein mechanisch die optische Anästhesie herbeiführen. Unter den essentiellen Erkrankungen des Sehnervenmarkes, die häufiger Erblindung bewirken, kommt ausser sulzigen, krebsigen, tuberculösen Infiltraten, s. g. Neuromen, wie in dem von Böhm abgebildeten Falle, besonders auch ödematöse Schwellung des N. opticus vor und es ist mitgetheilt worden (Stellwag), dass bei Hydrops noch Intermittens, Herzleiden, Alb. Brighii etc. die Schwankungen in den wässrigen Ergüssen mit ab- oder zunehmendem Sehvermögen einen deutlich wahrnehmbaren Causalnexus zeigen. Wahrscheinlich häufiger, was noch durch Sectionen constatirt werden muss, ist die Desorganisation des Nerven durch Zellanbildung und Fettmetamorphose. Der entsprechende Process beginnt in der Regel central und deutet sich für den Patienten durch rauchige Trübung der Mitte des Gesichtsfeldes an, bis früher oder später der ganze Optic. leitungsunfähig wird. Nicht immer ist es möglich, diesen Vorgang schon bald durch Spiegeluntersuchung nachzuweisen; Pigmentschwund ist jedenfalls das erste Symptom, der entweder auf einer beschränkten Stelle grosse Fortschritte macht oder in weiterer Ausdehnung stattfindet und sich dann durch eine lichtere Missfärbigkeit des Augengrundes zunächst manifestirt.

Orbita an der äussern Seite des *Nerv. optic.* befindlich, und vom *Nerv. oculomot.* die kurze motorische Wurzel, vom *Nerv. naso-cil.* des 5. oder *Nerv. trigeminus* die lange sensitive und vom *Plex. caroticus* die sympathische oder trophische Wurzel erhaltend, die s. g. Ciliarnerven in den Bulbus selbst abgibt, um durch sie der Bewegung der Iris und des inneren Accommodationsapparates, der Empfindung und der Ernährung desselben vorzustehen. Behufs Erläuterung der pathologischen Processe muss hier ferner vorbemerkt werden, dass der Oberast des *Nerv. oculomot.* vom *Ram. naso-ciliaris nervi trigemini*, der Unterast vom *Gangl. cil.* auch sensitive Fasern erhält, welche die Coordination der Bulbusbewegung vermitteln, indem sie Abweichungen von derselben als unbequeme Empfindung wahrnehmen lassen. — Sodann ist zu merken, dass während der *Oculomotorius* contrahirend auf die Pupille wirkt, die sympathische Wurzel, welche auch Vagusfasern enthält, umgekehrt der Dilatation derselben vorsteht, woraus erhellt, dass *Anaesthesie* des *Oculomot.* Dilatation und *Anaesthesie* des Rückenmarks und der Unterleibsganglien Contraction, *Hyperaesthesie* der letzteren aber wieder Dilatation der Pupille zur Folge hat.

Acinesen.

Was zunächst die *Anaesthesie* (oder nach *Romberg Acinesis*) der motorischen Nerven betrifft, so kann dieselbe *a)* durch Druck auf den Magen, durch Erschütterung, Verletzung und Entartung des Nerven oder seiner Scheide veranlasst werden und ist je nach dem Grade dieser Anomalie von mehr weniger ungünstiger Prognose, indem der Nerv die Leitungsfähigkeit wiedergewinnen oder sie gänzlich und für immer verlieren kann, — *b)* kann sie von Mangel cerebraler Erregung herkommen, was um so ungünstiger ist, als sich dieser Anästhesie bei längerer Dauer derselbe Zustand in der sensoriellen wie in der sensitiven Sphäre zuzugesellen pflegt.

I. *Acinesis nerv. oculomotorii* 1) *partialis*, d. h. *a)* Abnahme oder Verlust der Energie der Fasern, welche den *m. levat. palp. sup.* versorgen, also Lähmung des Oberlides, *Blepharoptosis paralytica*. Das Oberlid hängt schlaff nieder, ohne dass die Thätigkeit des Schliessmuskels zugleich beschränkt ist. — *b)* der Fasern, welche zum *m. rect. sup.* gehen, wobei das Lid gut gehoben, der Bulbus aber nicht nach Oben gedreht werden kann. — *c)* der Fasern zum *m. rect. inf.*, — *d)* zum *m. rect. ext.*, was paralytisches Schielen nach der entgegengesetzten Seite bewirkt. — *e)* der kurzen motorischen Wurzel zum *Gangl. ciliar.*, was *Mydriasis paralytica*, und *f)* einzelner Ciliarnerven, was Verziehung der Pupille veranlasst.

2) Bei *Acin. n. oculom. totalis* ist der Stamm gelähmt und zwar vollständig (*Paralyse*) oder unvollständig (*Parese*). Ausser der *Ptosis* ist bei *Paralyse Mydriasis* und ein geringer Grad von *Exophthalmos* vorhanden, zugleich mit Wälzung des Bulbus nach Aussen durch uneingeschränkte Thätigkeit des vom *nerv. abducens* beherrschten *m. rect. ext.* Vorübergehend kann auch wohl der vom *n. trochl.* beherrschte *m. obliq. sup.* den Bulbus nach Unten und Aussen drehen. Durch die *Mydriasis*, d. h. die Lähmung der circulären und vorwaltende Thätigkeit der radialen (resp. spinalen) Irisfasern und durch Lähmung des innern und äussern Muskelapparates für die Accommodation ist der Patient nur für die Ferne accommodirt oder presbyopisch, d. h. das kranke Auge befindet sich in dem Zustande, den wir durch Instillation einer starken Atropinesolution künstlich herbeiführen können. Durch myotische Brillen wird sofort besser gesehen. — Die durch Abweichen von der normalen Axe entstehende *Diplopia biocularis* kann bei geringem Grade durch den Gebrauch prismatischer Gläser beseitigt werden.

II. *Acin. n. trochlear.* oder Lähmung des *musc. obliq. sup.* kommt äusserst selten für sich allein vor und ist mit Sicherheit nur durch das Experiment zu erkennen. Man lasse einen Punkt fixiren und dabei den Kopf des Patienten auf die Seite neigen, so zeigt sich, dass das Auge nicht rotirt wird; die Cornea stellt sich tiefer und es entstehen Doppelbilder übereinander, die um so mehr von einanderweichen, je tiefer der Kopf gesenkt wird. Erwägt man, dass der *obliq. sup.* die Pupille nach Unten und Aussen drehen soll, so hat man darin für das Experiment hinreichenden Anhalt.

III. *Acin. n. abducent.* oder Lähmung des *m. rect. ext.* ist sofort durch die Ausweichung der Axe nach Innen, *Strabismus converg.*, zu erkennen, veranlasst durch die nun uneingeschränkte Wirkung des Antagonisten, des *m. rect. int.* — Der Patient kann die Pupille nur mit grösster Mühe bis in die Mitte der Orbita stellen und zwar gelingt dies nicht durch den *m. rect. ext.*; sondern durch combinirte Thätigkeit der für den *ext.* vicarirenden *m. rect. inf.* und *sup.* Will der Patient den Bulbus noch mehr nach der Seite des paralysirten Muskels rotiren, so folgt nur der gesunde Bulbus, es entsteht Doppelsehen nebeneinandergeschobener Bilder, wobei zu merken, dass das recht erscheinende Bild dem linken Auge angehört und ebenso umgekehrt. — Die Häufigkeit des paralytischen *Strab. converg.* ist nicht bloss daraus zu erklären, dass der *m. rect. int.* einer der stärksten Augenmuskeln ist, sondern auch daraus, dass der *m. rect. ext.* zahlreiche sympathische Zweige erhält, deren Anästhesie auch die Muskelwirkung verringert, wie dieselbe ebenso bei sympathischer Hyperästhesie (durch Uterinalreiz, Wurmbeschwerden etc.) der Art gesteigert werden kann, dass der *m. rect. ext.* über den *int.* prävalirt und jener vorüber-

gehende *Strab. diverg.* eintritt, der bei hysterisch erregten Frauenzimmern wohl beobachtet wird.

Combinirt sich die Lähmung der vier geraden und der zwei schiefen Augenmuskeln durch *Acinesis* der *nn. oculomot. trochl.* und *abduc.*, so rückt der unverwandte Bulbus nach Vorn, als erlitte er Druck von einem in der Tiefe der Orbita liegenden Tumor (*Ophthalmoptosis*).

IV. *Acin. rami ophthalm. nervi facialis*, Lähmung des Ringmuskels (*Lagophthalmus paralyticus*) kommt nicht vereinzelt, sondern mit Lähmung aller der Theile vor, die vom *n. fac.* versorgt werden, also mit halbseitiger Gesichtslähmung. Der *m. orbicular. palp.* leistet seinem Antagonisten, dem *lev. palp. sup.* keinen Widerstand mehr und so steht das befallene Auge stets offen. Beim Versuche es zu schliessen, ebenso im Schlafe, wälzt sich nur der Bulbus nach Oben, so dass die Cornea theilweise vom Oberlide bedeckt wird.

V. *Mydriasis paralytica* ist ebenfalls als *Acinesis* nach den Einleitungsbemerkungen anzusprechen. (S. bei der Lehre von den Erkrankungen der Iris pag. 90.)

An die Aetiologie dieser Acinesen schliesst sich die Therapie unmittelbar. Gewöhnlich ist Rheuma die Veranlassung, wesshalb zuerst antiphlogistisch und demnächst diaphoretisch zu verfahren ist. Bei bereits längerer Dauer des Uebels sind die bekannte *Antirheumatica* am Platze: Colchicum, Aconit etc. — Ebenso muss gegen Hyperämie des Gehirns und Neigung zu Apoplexie das entsprechende Verfahren eingeschlagen werden, wenn gleichzeitig Schwere, Schwindel und ähnliche Symptome auf dieses Grundleiden hinweisen. Exsudate auf der Hirnbasis erfordern Resorbentia (Jodkali und Mercur), Syphilis Antisyphilitica, Intermittens Chinin, organische Destructionen ebenso das entsprechende, meistens nur palliative Curverfahren.

Dabei ist örtlich das Nerven- und Muskelleben zu bethätigen durch spirituöse und aromatische Waschungen, durch reizende Einreibungen und Pflaster. Unmittelbaren Reiz kann man durch Electropunctur ausüben, auch durch Betupfen der Bindehaut unmittelbar über der Insertion des gelähmten Muskels mit Höllenstein (*Dieffenbach*). Die *ultima ratio* ist die Durchschneidung des Antagonisten. — Die Anwendung von Strychnin (zu $\frac{1}{16}$ gr.) hat sich in vielen Fällen als unersprießlich, die Heilgymnastik noch nicht als ersprießlich erwiesen, doch lässt sich von ihr auch für das paralysirte oder paretische Auge Heil erwarten. Weitere Erfahrungen über ihre Wirksamkeit wie über den Nutzen der Kreke'schen Augenprismen stehen der Ophthalmiatrik noch bevor.

Zu den Acinesen ist auch zu rubriciren die

Accommodationsparese,

d. h. Beschränkung oder gänzlicher Mangel der Accommodation

durch Lähmung des ihr vorstehenden mikroskopischen Muskelapparates; sie ist ein auffallend oft vorkommendes Uebel, auf das die Aufmerksamkeit der Aerzte bisher zu wenig gerichtet war. Der Fernpunkt des Auges ist ein relativer und hängt von dem vorwiegenden Gebrauche des Auges für die Nähe oder die Ferne ab. Nomadenvölker, Jäger, Seeleute sind mehr für die Ferne, Gelehrte, Künstler, Arbeiter in feinen Objecten mehr für die Nähe accommodirt und dieser habituelle Zustand ändert sich bei dem entgegengesetzten Gebrauche der Augen, als der gewohnte war, nur sehr allmählig oder nie. Gegen diesen ausgearteten Accommodationszustand ist nur der Gebrauch geeigneter Brillen zu empfehlen und zwar meistens von Convexgläsern von den verschiedensten Nummern, so dass das Experiment am besten entscheidet, für welche Distanz richtig accommodirt wird, um demgemäss die Nummern zu versuchen. Oft sind für das Sehen auf Abstand sogar schwache Concavgläser am erspriesslichsten. Entsprechende Regelung des Gebrauches der Augen für Nähe und Ferne darf dabei nicht versäumt werden. Ebenso sei man auf Beseitigung etwaiger Complicationen, wie der Mydriasis, bedacht. — *Ruete* gab einem derartigen Patienten eine convexe Brille für die Nähe, eine concave für die Ferne.

Hypercinesen.

Die Hypercinesen oder die Motilitätsneurosen mit gesteigerter Action der motorischen Nerven geben sich durch Zusammenziehung der von ihnen versorgten Muskelfasern kund und zwar ist diese Zusammenziehung entweder eine beharrende (tonischer) oder eine wechselnde, rythmische (klonischer Krampf).

I. Hypercinesen der Lidmuskeln und zwar

a) Der klonische Lidkrampf; er wird in geringem Grade auch bei gesunden Personen beobachtet und gibt sich nur als leichtes Hautzucken zu erkennen, das selten länger als eine halbe Minute währt. Bis zu dem krampfhaften Blinzeln, der Nictitatio spastica, kommen verschiedene Abstufungen vor, an denen der *m. levat. palp.* und der *orbicul.* theilhaftig sind. Es kann sich das Uebel auch mit klonischem Krampfe anderer, scheinbar aller Gesichtsmuskeln compliciren. Die geringeren Grade des Uebels sind einseitig, die höheren meist doppelseitig, wenn auch auf der zweiten Seite nur durch Association. — Als Ursachen werden Erkältung, Wurm-, Uterin- und andere Unterleibsreize, Gehirnleiden, Schreck, Imitation und Imagination bezeichnet, gegen welche das Heilverfahren zu richten ist. Gegenreize, Ableitungen und andere *topica* sind meist erfolglos. Die subcutane *Myotomie* und *Neurotomie* habe ich von *Dieffenbach* ohne Erfolg anwenden sehen.

b) Der tonische Lidkrampf im *m. orbicularis* oder *Blepharospasmus* ist eine meist auf Reflexreiz beruhende, von Irritation der Trigeminaläste im Auge herrührende Zusammenziehung des Orbicularis, die in höheren Graden vom Willenseinfluss nicht mehr beherrscht wird. Idiopathischer Lidkrampf dieser Art kommt nicht vor, doch begleitet er fast ohne Ausnahme die sehr häufigen Hyperästhesien der sensitiven Ciliarnerven bei s. g. *Ophthalmia scrophulosa* und die in dieser Hyperästhesie begründete Photophobie oder Lichtscheu. Die Patienten suchen deshalb, um dem Schmerze zu entgehen, das Dunkel, während das Auge mehrweniger vollständig geschlossen ist. Bei längerem Bestande kann *Entropium*, Verkrümmung des Lidknorpels, *Trichiasis* und *Phimosis palp.* durch Atrophirung von Orbicularisfasern eintreten, wie bei vernachlässigten Patienten nicht selten beobachtet wird.

Therapeutisch ist es von grösster Wichtigkeit, nicht durch Nachgiebigkeit gegen den klagenden Patienten das Uebel zu steigern, wie es vielfach geschieht. Man wasche die Augen und das ganze Gesicht häufig mit frischem Wasser ab und exponire die Kranken, meist Kinder, ausser der Schlafzeit, dem Lichte und der Luft und man wird meistens überraschend schnell Lichtscheu und Lidkrampf sich verlieren sehen.

c) Der tonische Lidkrampf im *m. levator palp. sup.* oder *Lagophthalmus spasticus* beruht auf andauernder Contraction des Lidhebers, welcher vollkommenen Schluss des Auges, auch im Schlafe, verhindert, wesshalb sich bei längerer Dauer periodisch Conjunctivitis einstellt. Die häufigste Ursache ist rheumat. Affection des Muskels, in seltenen Fällen sind es entzündliche, traumatische, psychische Reize, Abscesse u. d. a., auf deren Beseitigung hingewirkt werden muss.

II. Hypercinesen der Augenmuskeln und zwar:

a) Der klonische Augenmuskelkrampf oder *Nystagmus*; er äussert sich durch stetiges, dem Willen und Bewusstsein des Kranken entzogenes Hin- und Herrollen des Augapfels und wird durch abwechselnde klonische Zusammenziehung der antagonistischen Muskelpaare bewirkt, des *m. rect. int.* und *ext.*, des *sup.* und *inf.*, des *obliq. sup.* und *inf.* oder auch des *ext.*, des *obliq. sup.* und des *int.* etc. Kurz entstanden verhindert oder erschwert er das Fixiren eines bestimmten Sehobjectes, welches bei längerem Bestande indess durch die Gewöhnung, nur das Sehobject zu percipiren, doch und sogar in dem Grade möglich wird, dass Nadeleinfädeln u. dgl. gelingen, dass der Patient sich der Anomalie nicht mehr bewusst ist und von den subj. bewegten Bildern auf obj. ruhende oder anders bewegte Gegenstände richtig folgert. — Das Uebel ist selbst bei unilateraler Ursache durch Association der Bewegungen stets bilateral und in seltenen Fällen bei übrigens gesunden Augen an-

geboren und dann unheilbar. Bei Unvermögen zu sehen hat es seinen Grund darin, dass das Individuum keine Sehobjecte wahrnimmt, welche ihm als Regulatoren der Bewegungen der Augenmuskeln dienen könnten. Der Beweis hierfür liefert der Umstand, dass dieselbe Operation, welche dem Patienten Sehkraft gibt, ihn auch vom *Nystagmus* befreit. Sind Trübungen im dioptrischen Apparate oder Lücken im Sehfelde durch partielle Retinalanästhesie vorhanden, so geht oft der anfänglich willkürliche *Nystagmus* allmählig in unwillkürlichen über, um mit Beseitigung des Sehhindernisses sich wieder zu verlieren. Andere Male sind Erkältung, Wurm-, Uterinal-, Zahnreiz, seröse Ergüsse im Schädel, Entzündungen u. d. m. Ursachen, die beseitigt werden müssen; in der Regel verliert sich dann der *Nystagmus* schnell. — Der seltene idiopathische *Nystagmus* ist durch Myotomie nicht geheilt.

b) Der tonische Augenmuskelkrampf, das krampfhaftes Schielen, *Strabismus spasticus*, besteht darin, dass ein Bulbus oder beide durch Contraction gewisser, die Antagonisten überwältigenden Muskelpartien aus der normalen Sehachsenrichtung gewälzt werden. (S. *Strabismus*.) Isolirt sich, worauf *Stromeier* zuerst hingewiesen hat, die krampfartige Muskelaction von der Ursache, welche sie erzeugt hat, und zwar durch Degeneration der Muskeln, so wird der *Strabismus* constant und ist nur durch die Operation zu beseitigen. So lange Krampf, wie dies besonders in den vom Oculomotorius versorgten Muskeln beobachtet wird, Ursache des *Strabismus* ist, darf man hoffen, mit der Hebung der Ursache auch die Wirkung zu heben.

III. Hypercinesen der Irismuskelfasern und zwar

a) Der klonische Sphincterkrampf oder Hippus (s. pag. 89).

b) Der tonische Krampf der circulären Fasern und des Sphincters oder Myosis spastica (s. pag. 89).

c) Der tonische Krampf der Radialfasern oder Mydriasis spast. (s. pag. 90), der vielleicht nur auf *Acinesis* der circulären Fasern beruht, wenigstens nicht ohne dieselbe vorkommt.

IV. Hypercinesen des inneren Accommodationsapparates sind noch nicht mit hinreichender Sicherheit beobachtet worden, doch darf es wohl als zweifellos hingestellt werden, dass sie ebenso wie *Acinesen* dieses motorischen Gebildes vorkommen und diejenigen Degenerationen vorbereiten, auf denen manche Formen von Presbyopie und Myopie beruhen. (Siehe diese.)

3) Die sensitiven Nerven des Auges stammen von dem *Ram. ophthalmicus nerv. trigemini* und vertheilen sich direct an den einzelnen Gebilden oder indirect, indem sie hauptsächlich vermittelt des *Gangl. ciliare* einzelne Fasern an die mo-

torischen und trophischen Nerven abgeben. Die sensitive *Anästhesie* und *Hyperästhesie* sind wegen dieser Anastomosirung vielfach mit *Hyper-* oder *Acinesen*, z. B. mit *Nictitatio*, *Blepharospasmus*, *Nystagmus*, *Myosis*, *Hippus*, *Mydriasis*, ebenso mit Störung des Stoffwechsels, die sich hauptsächlich durch *Conjunctivalhyperämie* und *Conjunctivitis* verschiedener Arten kund gibt, verbunden und stehen, wie es häufig genug vorkommt, zu letzteren in ursächlicher Beziehung. Der Beweis liegt darin, dass Beseitigung der *Hyperästhesie* die Zertheilung der Entzündung nach sich zieht, auf welchen Umstand bisher kaum hinreichend Gewicht gelegt ist.

Die *Anästhesien* zerfallen vorwiegend dem Grade nach in zwei, die *Hyperästhesien* mehr den Gebieten nach, in welchen höhererregte Fasern verlaufen, in vier Unterarten.

Anaesthesia.

I. *Anaesthesia ciliaris imperfecta* s. *Hebetudo visus*, Augenschwäche, Abnahme der Energie der Ciliarnerven des Auges, ist jener Zustand der Augen, während dessen das Gesichtsvermögen für die Nähe und auf Abstand gut erscheint, aber beim Gebrauch in der Nähe alsbald ermüdet und oft schon in wenig Minuten unbrauchbar wird. Diese Anomalie kommt in der Regel bilateral vor. Während man den Sitz des Leidens früher im *Nerv. opt.* suchte, verlegte ihn *Böhm* in den motorischen Nerven- und den Muskelapparat, aus deren Schwäche die *Hebetudo* als Accommodationskrankheit resultire. Störung in der Ciliarnervensphäre ist, wie *Romberg* zuerst aufgestellt hat, Wesen der Krankheit, aber nicht *Hyperästhesie*, sondern ein geringer Grad von *Anästhesie*, der nur kurzdauernden Gebrauch der Augen zu feinen Arbeiten und zum Lesen gestattet und bei anhaltender Anstrengung zu optischen *Hyperästhesien* von gewisser Dauer hinführen muss. Bei anhaltender und anstrengender Accommodation für die Nähe wirkt der optische Reiz direct nicht störend, wohl aber der Gefühlsreiz, indem er sich in Minuten, Stunden oder Tagen bis zu dem Grade steigert, dass ein höherer Grad von Empfindlichkeit und durch Irradiation auf die sensorielle und motorische Sphäre eigentliche Gebrauchsscheu, ähnlich der Lichtscheu, eintritt. Die Functionsanomalie in den sensoriellen und motorischen Nervenbahnen ist mithin nur eine indirect oder secundär zu Stande gebrachte.

Wird trotz der Ermüdung der Augen der Gebrauch fortgesetzt, so gesellen sich das Gefühl von Schwere und Schmerz hinzu, dann Thränenschiessen mit Trockenheit abwechselnd, Ausweichen der Sehaxen und Diplopie, bald auch Verfinsterung und Verworrenheit im Sehfelde, welche durch Blinzeln, kalte Bähungen u. d. nur für Momente beseitigt werden kann. Bei fortgesetzter Anstrengung muss auf synergischem Wege optische

Hyperästhesie eintreten, die einige Male in Anästhesie, also in vollständige Erblindung, übergegangen sein soll.

Die objectiven Merkmale sind ausser einer gewissen Unstätigkeit des Blickes unwesentlich und zufällig. Bei durch Gebrauch gesteigerter Empfindlichkeit stellt sich wohl Thränschiessen, leichte Conjunctivalinjection, geringer Lidkrampf und dergleichen ein, verliert sich aber beim Nichtgebrauch oder beim Sehen in die Ferne bald.

Aetiologische Momente sind ausser Beschäftigung mit feinen Objecten alle Vorgänge, die Säfteverlust und damit allgemeine Körperschwächung bewirken, also geschlechtliche Excesse, schlechte Ernährung, anhaltende Gemüthsdepression, Helminthiasis, Störungen in den Uterinfunktionen etc. Auch locale Entzündungen von chronischem Verlaufe können Anlass werden. Missbrauch der Augen ist aber fast stets unter den Ursachen nachweisbar, so auch der Nichtgebrauch bei *Strabismus*. In der Zeit der Pubertät sind beide Geschlechter prädisponirt. Angeboren oder ererbt soll diese Schwäche einige Male beobachtet worden sein.

Die Prognose ist insofern ungünstig, als sich das Uebel meist schwer heben lässt, oft Jahre hindurch andauert; zum Verlust des Gesichtsvermögens führt es nur bei grober Vernachlässigung.

Therapeutisch ist zu sorgen, dass der Gebrauch der Augen in der Nähe möglichst beschränkt oder für längere Zeit gänzlich ausgesetzt werde. Besonders müssen beim Eintritt der Ermüdung die Augen sofort geschont werden. — Das Allgemeinbefinden ist durch entsprechende Curen zu corrigiren, besonders muss plötzlicher Lichtwechsel gemieden und an hellen Tagen das Licht durch blaue Brillen gemildert werden. Bei Anlage zu Congestionen nach dem Kopfe wiederholte Schröpfung des Nackens u. dgl. *Jüngken* empfiehlt mit Recht Augendouchen mit kohlensaurem Wasser, die täglich $\frac{1}{2}$ Stunde lang angewendet werden sollen. — Die von *Bennet* gegen dieses Uebel, dessen Ursache er in übermässigem Muskeldrucke sah, ausgeführte und empfohlene Myotomie verdient keine Empfehlung und Nachahmung. — Wirklichen Nutzen haben in einzelnen Fällen Concentrationsmeniscen von geringer Stärke geleistet, d. h. wenn es für den Patienten unumgänglich nöthig war, das Gesicht für einige Zeit in der Nähe zu gebrauchen.

II. *Anästhesia rami ophthalmici n. trigem. perfecta*, vollständiger Verlust der Energie der Empfindungsnerven des Auges hat ihren Grund darin, dass die hintere Wurzel des Trigeminus ihres Leitungsvermögens beraubt ist und äussert sich durch mehrweniger verbreitete Unempfindlichkeit der Gesichtshälfte. Je näher der Peripherie die Störung der Leitung ihren Sitz hat, um so beschränkter ist die unempfindliche Partie, je näher dem Centrum, um so aus-

gedehnter. Ist das *Gangl. Gasseri* erkrankt, so stellen sich alsbald auch erhebliche und schliesslich den Bulbus vernichtende Ernährungsstörungen ein. Leidet nur der Augenast des Trigeminus, so beschränkt sich die Anästhesie auf die Lid- und Bindehaut, die dann auf Berührung weder durch Blinzeln noch durch Thränenfliessen etc. reagiren. Es wirkt dies übrigens seltene Uebel zugleich auf den Lidschlag, der oft gänzlich cessirt, so dass die Erkrankung des Bulbus ausser durch die Ernährungsstörung auch durch Mangel regelmässiger Anfeuchtung befördert wird.

Für die s. g. *Anästhesia dolorosa*, bei der die für Berührung unempfindlichen Theile doch schmerzhaft erregt sind, dient als Erklärung, dass centrale Hyperästhesie nach dem Gesetze der excentrischen Erscheinung als in der Peripherie befindlich zum Bewusstsein kommt. Auch können sich vereinzelte Fasern hyperästhetisch verhalten.

Aetiologisch werden Neoplasmen, Extravasate, Traumen, Erschütterungen, Erkältungen, dann auch schleichende Entzündungen im Neurilem und Degenerationen des Trigeminus und des Gangl. Gasseri selbst beschuldigt, in welchen Fällen ausser dem Verlust des Auges durch Atrophirung mancherlei Motilitätsneurosen, masticatorische Lähmung etc. beobachtet worden.

Die Therapie ist nach den ätiologischen Momenten einzurichten, was meist sehr schwierig und so lange erfolglos ist, als der natürliche Verlauf ungünstig bleibt. Die bekannten örtlichen Reize neben allgemeiner Restauration sind jedenfalls zu versuchen, während durch Adstringentien in der Cornea der Erweichungsprocess aufzuhalten ist.

Hyperaesthesia.

An der Spitze der *Ciliarhyperästhesien* steht ihres sehr häufigen Vorkommens wegen mit Recht

I. Die *Hyperästhesia ciliaris photophobica* s. *Photophobia* oder Lichtscheu, d. h. das Unvermögen, im innern Auge Lichtreiz ohne sehr heftige Schmerzen und ohne Thränenschiessen und tonischen Lidkrampf zu ertragen. Fälschlich hat man deren Ursache in den sensoriellen Augenorganen gesucht, bei deren vollkommenen Anästhesie diese gesteigerte Empfindlichkeit gegen Licht beobachtet wird. Sie ist vielmehr Symptom der Hyperästhesie derjenigen Ciliarfasern, welche mit der Retina und dem N. optic. in unmittelbarer Verbindung stehen und in den meisten Fällen allerdings durch deren Vermittlung den Lichtreiz empfangen, um ihn sofort im Orbicularis als *Blepharospasmus tonicus* und in der *glandul. lacrymalis* als Thränenschiessen sich manifestiren zu lassen, die aber auch direct vom Lichte afficirt werden können. Centrale Störungen und Irradiationen von anderen Trigeminuszweigen, z. B. solchen,

die zu kranken Zähnen gehen, sind seltner Veranlassung, als periphere Reize, durch fremde Körper oder Entzündungen in der *Conj. Corn. Iris*, im *Corp. ciliare* etc. Neben der Behandlung dieser Ursachen müssen vorzüglich Licht, Luft und Wasser, wie bei Lidkrampf, als directe Heilmittel zur Wirkung gebracht werden.

II. *Hyperästhesia ciliaris dolorosa*, zum Schmerz gesteigerte Empfindlichkeit des Auges, gewöhnlich Ciliarneuralgie genannt, ist durch minuten- bis stundenlangen, plötzlich auftretenden Augenschmerz characterisirt, der oft mit dem Fothergill'schen Gesichtsschmerz Alles ausser dem Sitze gemein hat. — Was im Allgemeinen den Augenschmerz betrifft, so gesellt er sich bei peripherischen Anlässen besonders denjenigen Entzündungen der vordern Augentheile zu, von denen arthritische, syphilitische und scrophulöse Individuen befallen werden und befällt, wenn nur ein Auge erkrankt ist, nur dieses. Andere Male kommt er bei örtlichen Reizen vor, die von cariösen Zähnen, organischen Krankheiten, Traumen u. dgl. m. mitgetheilt werden. Die eigentliche Neuralgie beruht auf allgemein gesteigerter Nervosität und erscheint gleichzeitig mit deren Ursachen, Symptomen und anderweiten Folgen: *Anaemie*, *Hysterie* und *Hypochondrie*, *Migraine*, Säfteverlusten durch Onanie und Excesse in Venere, Unterdrückung gewohnter Ausscheidungen (Ohrenflüsse, Fussgeschwüre, habituelle Fusschweisse, Hautausschläge etc.) Diese excentrisch entstandene Form ist häufig bilateral.

Die richtige Behandlung der Ursachen nach rationellen Grundsätzen wird topisch unterstützt durch Schonung der Augen, Abhaltung jedes Reizes, zumal des Licht- und Farbenreizes, durch Anästhetica (Chloroform), Morphium, Verratrin, dann durch Sublimat, Electropunctur, Augendouche. — In einigen Fällen soll der innerliche Gebrauch von Arsenik, Belladonna, Ferr. carb. u. d. Erfolg gehabt haben, Chinin bei intermittirendem Character, Landluft, Seebäder. — Ob auch Neurotomie? —

III. *Hyperästhesia supraorbitalis dolorosa* und

IV. *Hyperästhesia lacrymal. dolorosa* unterscheidet sich von der letztgenannten nur dadurch, dass diejenigen Fasern ergriffen sind oder excentrisch ergriffen werden, welche sich in der Supraorbitalgegend oder nach der Thränendrüse hin verzweigen.

Die Aderhaut.

Choroidealcongestion.

Den hyperämischen Zustand der Aderhaut fassen wir zunächst und besonders in's Auge, weil er ebenso lästig als häufig ist. Er entsteht entweder nach häufiger Reizung activ oder aus Beeinträchtigung des Rückflusses passiv und gibt sich subjectiv durch Trübung und Störung des Gesichtsvermögens zu erkennen, zu denen sich gern das Gefühl von Druck, Spannung, Stechen, Funkensehen und andere Symptome von Retinalirritation hinzugesellen. Alles, was bei Kopfcongestionem geklagt wird, kann gleichzeitig vorhanden sein, Stirnschmerz, Schwere, Schwindel, Ohrenklingen. Desshalb verschlimmern Körperarbeiten, besonders mit gesenktem Kopfe, geistige Thätigkeit, Gemüthsaffecte, spirituöse Getränke, schwerverdauliche, starkgewürzte und jede zu reichliche Nahrung beide Uebel in derselben Weise. Das Auge ist dabei gegen Licht empfindlich, heisse Tage verschlimmern das Uebel. Umstände, welche durch längere Zeit diese Congestion veranlassen, sind Abdominalplethora, Amenorrhoe, sitzende Lebensweise, Hämorrhoidalstase u. dgl., wesshalb man die mäandrisch gewundenen Gefässe der Conj., welche bei chronischer Choroidealcongestion objectives Hauptmerkmal sind, mit Fug und Recht Abdominalgefässe genannt hat (seit *Beer*). Ein anderes Characteristicum ist der blaue Ring um die normale Cornea, zu dem die Blutüberfüllung des canalis Fontanae, eines Sinus für venöses Blut, Anlass ist. Er liegt bis $\frac{1}{4}$ Linie von der Hornhaut entfernt. Nicht selten leidet nach längerer Dauer des Uebels die Sclera mit und verdünnt sich durch gleichmässige Atrophirung, wobei sie ein bläuliches Aussehen gewinnt, oder partiell und gibt dann zur Entstehung von Ausbauchung (*Sclerectasie*) Veranlassung, bei deren Ausbildung einige Male Nachlass der congest. Beschwerden im Auge beobachtet worden ist. Entwickelt sich eine solche Ausbuchtung mit Ausdehnung der Sclera in höherem Grade an der hinteren Seite des Bulbus, so beginnt gleichzeitig ein entsprechender Grad von Vortreten oder Schiefstehen des Augapfels.

Therap. So wichtig Antiphlogose bei Entzündung der Aderhaut ist, so wenig wäre sie bei blosser Congestion derselben am Platze. Oertlich reicht es hin, die Augen möglichst zu schonen und vielleicht von Vornherein einige Blutegel an die *proc. mastoid.* zu setzen. Nachher sind sie besser am After am Platze, wo sie von Zeit zu Zeit wiederholt werden können. Angemessene Ableitung durch Laxanxen, Fussbäder, Wasser-

trinken, besonders von auflösenden Brunnen, viel Bewegung in freier Luft, Vermeiden der sitzenden Lebensweise, spirituöser Getränke, vielleicht eine Bade- und Brunnencur mit entsprechender Zerstreung und Aehnliches ist gegen dies Uebel zu verordnen.

Choroiditis,

Entzündung der Aderhaut, ist eine gefährliche und weit häufiger vorkommende Krankheit, als die Aerzte vor *Schröder van der Kolk's* trefflichen Mittheilungen ¹⁾ gewusst haben. Sie entwickelt sich entweder für sich, meistens aus länger bestandener Congestion oder gesellt sich consecutiv zu *Keratitis, Iritis, Kyklitis* hinzu. Je nach den ursächlichen Verhältnissen variiren die Symptome in mannichfacher Art, ebenso sind die Ausgänge, wie sie sich in Nachkrankheiten oder bei der Section ergeben, nach der serösen, croupösen oder fibrinösen Beschaffenheit des Exsudates sehr verschiedener Natur. Bald ist die *Choroidea* in ihrer Totalität, bald partiell ergriffen, der Eintritt und Verlauf der Entzündung ist entweder acut oder chronisch. Nach diesen Differenzen bieten sich verschiedene Eintheilungsprincipien dar, so dass man nach den Ursachen von einer *Choroid. traum. congest. venosa (Glaucoma), pyaemica, scroph., syphil., rheum.* u. s. w. sprechen könnte, nach dem Exsudate von *Ch. serosa, crouposa* und *fibrinosa*, nach der Ausdehnung von *Ch. totalis* und *partialis*, nach der Dauer von *Ch. acuta* und *chronica*, ferner nach den Complicationen etc. Der besseren Uebersichtlichkeit halber theilen wir sie nach der Dauer in:

a. Choroiditis acuta, welche durch die plötzliche Heftigkeit aller Erscheinungen die Diagnose erleichtert. Da das vordere Auge mitleidet, so muss man Acht haben, die eigentliche Krankheit neben den Epiphänomenen nicht zu übersehen. Diese sind: Röthung und leichtes Oedem der Palbebräländer, Injection beider Bindehäute, Anfüllung des venösen Kreissinus und der daher rührende schiefergraue Ring um die Cornea (*Annulus arthriticus Beerii*), letztere wie angehaucht, die Iris anfänglich geschwellt, vorgedrängt (und träge, später retrahirt, unbeweglich, verzogen, verfärbt und endlich in Atrophirung übergehend). Die Schwärze der Pupille geht verloren und erscheint anfänglich wie von Rauch durchzogen, später wird sie mattgrau. Neben diesen objectiven müssen die Reflexsymptome der inneren Entzündung, Lichtscheu, Thränenfluss, Lidkrampf etc. und besonders die subjectiven auf die richtige Diagnose hinleiten: Trübung und schnelle Abnahme des Gesichtsvermögens, Licht-

¹⁾ Vgl. dessen *Pathol. anatomische opmerkingen over de onsteking van eenige invendige deelen van het oog, en bizonder over Choroiditis als oorzaak van Glaucoma etc.* —

erscheinungen im Auge, Ohrensausen mit nervöser Gehörschwäche, Benommenheit des ganzen Kopfes, besonders aber heftig stechender Schmerz im Auge, der nach dem Verlaufe der Supra- und Infraorbitalnerven ausstrahlt. Der Bulbus wird von einem solchen Druckgeföhle eingenommen, dass Patient die Orbita als verengert bezeichnen möchte. Dazu kommt die Störung des Allgemeinleidens: Zungenbelag, Appetitlosigkeit, Magendruck, Brechneigung und Erbrechen, Gemüthsverstimmung, Mattigkeit, Fieber u. d. m. — Oft ist in 24 Stunden das Gesicht zeitweilig oder für immer vollständig verloren, doch kann das Leiden sich Tage und Wochen lang hinziehen, um zunächst in die chronische Form oder direct in einen der Ausgangszustände überzugehen.

Im weiteren Verlaufe bleibt *Iritis*, *Kyklitis*, *Keratitis* nicht aus, ebenso kann bei exquisitem Gefässsturm durch Ruptur *Hämophthalmus int.* oder bei Ausgang in Eiterung Hypopyon eintreten, bei deren Eintritt ödematöse Verschwellung der Lider erfolgt.

b. Choroiditis chronica. Die chronische Form geht stets aus der Congestion allmählig hervor und ist durch das Unmerkliche ihres Auftretens um so verderblicher für den Patienten. — In der Regel klagt er anfänglich nur über Nebel- und Mückensehen, besonders in der zweiten Hälfte des Tages, erst nach Monaten geräth er wegen beträchtlicher Störung bei Gebrauch der Augen in Sorge, doch können vor vollständiger Erblindung Jahre vergehen. Die subjectiven Symptome steigern sich überhaupt langsam, es sei denn, dass die chronische Form in die acute umschlägt. Die partielle Erkrankung gibt sich im Verlaufe durch bläuliche Erhebungen der Sclera kund, über denen auch die *Conj.* injicirt erscheint und unter denen meist flüssiges Exsudat, selten, vielleicht nie, Blut (?) sich angehäuft hat, das durch Druckreiz Atrophirung mit Erschlaffung und Verdünnung der Lederhaut bewirkt (*Staphyloma sclerae*). An der hinteren Bulbushemisphäre sind diese Ectasien oft nur durch Ortsveränderung des Bulbus zu erkennen; selten wird derselbe in seiner Totalität ausgedehnt (Glotzauge).

Ursachen.

a) Traumatische Veranlassungen haben selten reine *Chor.* zur Folge. Schon die Natur der Verletzung bringt es in der Regel mit sich, dass Cornea, Sclera, Iris sich gleichfalls entzünden, so dass meist der ganze Bulbus erkrankt (*Panophthalmitis*) und Phthisis desselben eintritt. (Siehe diese.) Die reine traumat. *Chor.* stellt sich nach einfachen Stich- und Hiebwunden in selten sehr gefährlicher Weise ein, was aber stets der Fall ist, wenn fremde Körper zurückbleiben. Als ein solcher muss die deprimirte oder reclinirte Linse gelten, die häufig, wenn auch erst nach Jahren, partielle *Chor.* herbeiführt, aus welchem

Grunde allein viele neuere Oculisten der Extraction vor jeder anderen Methode den Vorzug geben ¹⁾. Nicht selten habe ich mit dem Augenspiegel die Linse auf dem Augengrunde gesehen, umgeben von Choroidealexsudat, das in einzelnen Fällen bei passender Beleuchtung auch mit dem blossen Auge als glänzende, meist gelbliche, verschiedengeformte, meist membranartige Masse sichtbar und sogar für Kapselstaar gehalten worden war. Folgt auf Nadeloperationen *Choroiditis* bald, so ist entweder ein zu tiefes und zu festes Senken des Staares auf die innere Seite der Bulbushülse oder starkes und schnelles Aufquellen der frei gewordenen Staarsubstanz Ursache. In solchen Fällen stellt sich acute *Choroiditis* ein, ebenso nach Stössen u. d.

Therapie. Fremde Körper sind, wenn es irgend möglich ist, auszuziehen, da sie fast ohne Ausnahme zur Eiterung oder zu Exsudationen und Verlust des Auges führen. Sodann Blutegel, selbst Aderlass, Kälte, kühlende Laxanzen, Ung. ciner. u. dgl. — Gegen die Schmerzen Opium innerlich und äusserlich und trockne oder feuchte Wärme. Letztere ist bei Uebergang in Eiterung mit Recht empfohlen, damit sich baldigst eine Incisions- und Entleerungsstelle des Eiters zeige und, wenn das Gesicht nicht zu retten ist, ein für ein künstliches Auge günstiger Bulbusstumpf entstehe.

b) Heftig und plötzlich auf den erhitzten Kopf wirkende kalte Luft, also Erkältung, ist wiederholt, besonders bei bestehender *Choroidealcongestion* als Anlass zu Entzündung und zu baldiger Absetzung serösen oder fibrinösen Exsudates beobachtet worden. Die Erblindung kann schon in wenig Tagen eine totale sein. Ausser den oft geringen sichtbaren Zeichen, Injection, Thränenschiessen, Lichtscheu, Lidkrampf, seröser Conjunctivalinfiltration kommt wohl Luscitas, Schiefstehen des Bulbus, vor, wenn nämlich die Erkältung zugleich auf Augenmuskeln gewirkt hatte. In der Regel ist der *M. rectus externus*, auch wohl der *M. levat. palp. sup.* gelähmt, welcher Lähmung entsprechend die Antagonisten früher oder später ihr Uebergewicht geltend machen. Hieraus erklärt sich denn sofort die Entstehung von Doppelbildern oder einem Schattenbilde neben dem guten. Ausser diesem subjectiven Symptome und der Empfindung von Druck und oft sehr empfindlichen reissenden Schmerzen klagt der Patient über Verschwommenheit, Verzogenheit, Halbheit der Bilder, die er mit dem erkrankten Auge erhält, — Beweis der *Chor. partialis* und einer daher rührenden, entsprechend verringerten Retinalenergie. — Bei längerem Bestehen kommt es zu Exsudatergüssen,

¹⁾ Einige hieher gehörige Fälle habe ich bereits für spätere Veröffentlichung gesammelt und würde für entsprechende Mittheilungen den Herrn Collegen dankbar sein.

die sichtbar werden können, zum Mitleiden der Iris, Verfärbung, Trägheit, Retraction, Starrheit derselben. Vorkommen meist in den Blüthejahren relat. gesunder Individuen.

Therapie. Keine Kälte! — Leichte Diaphorese bei Ruhe im Bett oder im verdunkelten, wohltemperirten Zimmer, Blutegel an Stirn und Schläfe, Schröpfköpfe im Nacken und am Kreuze, Ung. cin. cum opio, warme Servietten über den Kopf, diaph. Thee, Tart. stib. in refr. dosi, pulv. Ipecac. opiat. — Späterhin Derivantien, an jede Schläfe ein Vesicat., oder fliegende Anwendung derselben, Ung. Kalii jod. und Ung. cin., Crotonöl etc. — Endlich dauernde Schonung und grösste Vorsicht, um Recidive zu verhüten und den Congestivzustand der *Choroidea* zu beseitigen oder doch zu mildern.

c) Tuberculöse Ablagerungen in der *Choroidea* mit oder ohne serösen Erguss sind unzweifelhaft, wenn auch noch erst in vereinzelten Fällen als Entzündungsursache constatirt. Die Fälle betreffen meist jüngere, blonde, blauäugige Kinder mit den Zeichen scroph. Cachexie und endigen ohne Möglichkeit der Rettung des Auges mit Blindheit. Schreitet die Ablagerung längere Zeit und reichlich vor, so dehnt sich der Bulbus aus und birst, in anderen Fällen drängt das Exsudat durch den Glaskörper, den es zerstört, vor, worauf Schrumpfung erfolgt. Die ersten Symptome sind die reflectiven und täuschend; nur die Unsicherheit des Sehens, ein auffallender Glanz aus der Augentiefe, oft als Leuchten bezeichnet, und die Spiegeluntersuchung sind im Stande, auf die Diagnose dieses traurigen Uebels hinzuführen. Von Retinalkrebs ist es erst in späteren Stadien zu unterscheiden. — Die Form ist stets die chronica.

Die Therapie bleibt auf Behandlung des Grundleidens und Bekämpfung der im Verlaufe eintretenden Schmerzhaftigkeit beschränkt, fruchtet aber vielleicht nie.

d) Pyämische Zustände, besonders puerperale, auch typhöse reflectiren sich, besonders nach einiger Zeit des Bestehens wohl auf der *Chor.* und pflegen unter Schmerz, Feuererscheinungen im Auge und rascher Erblindung auf baldigen tödtlichen Ausgang hinzuweisen. Zögert der Tod, so tritt mehr weniger starkes Oedem in der *Conj.* und in den Lidern ein, *Iritis* gesellt sich hinzu, *Hypopyon*, *Ruptora corn.* u. dgl.

Die Therapie beschränkt sich auf Behandlung des Grundleidens und allenfalls Entleerung des Eiters, um den Druckschmerz zu mildern.

e) Bei Arthritis und venöser Constitution stellt sich *Choroiditis* bald acut, bald chronisch ein, um zu jenem Ausgange hinzuführen, der als ophthalmologisches Problem seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Augenärzte in ungewöhnlichem Grade gefesselt hat, nämlich zum s. g. *Glaucome*. Für diesen Zustand ist das Fehlen oder Vorhandensein des grünlichen Reflexes gleichgültig, was wir vorausschicken, um

über den durchaus unpassenden und zu verlassenden Namen den Stab zu brechen und damit die ohnehin nicht leichte Diagnose zu erleichtern. Denn auch die übrigen Erkennungsmerkmale sind vielfach variabel je nach der Rapidität des Auftritts. Die bereits erweiterten vorderen Ciliargefässe injiciren sich stärker, ebenso die Conjunctivalgefässe und umgeben die Cornen mit einem doppelten, dunkelrothen Hofe, die Iris verfärbt sich vom Ciliarrande aus, retrahirt sich und verliert ihre Beweglichkeit allmählig gänzlich, bei partieller Entzündung in der Nähe dieser Partien früher, zugleich drängt sie sich auf Kosten der *cam. ant.* nach Vorn. Die Pupille verliert ausser ihrer Rundform auch ihre Purpurschwärze, erscheint rauchig und spielt bei später nicht ausbleibender gelblicher Tingirung der Linse in's Meergrünliche, woher der Name *Glaucom*. Diese Färbung kann auch durch eine grünliche Färbung eines der durchsichtigen Augenmedien entstehen, z. B. des Glaskörpers, andere Male ist es nur grünlicher Reflex und nicht optische Farbe nach Göthe'scher Theorie. Vielleicht ist sie in der Mehrzahl der Fälle Stokes'sche Farbe, zu deren Hervorrufung die Entmischungsart ähnlich wie Chininsolut. auf das Spectrum wirkt. — Die Schmerzen sind gering oder sehr heftig, intermittirend, von der Witterung abhängig, auch auf die Umgegend des Auges übergehend, vom Lichte bedingt, das Sehvermögen frühzeitig beeinträchtigt, neben den Decrepiditätssymptomen betrüglich hinsichtlich der Farben und Formen, ohne Ausdauer, von wechselnder Güte in bestimmten Stunden oder nach Tagen und Wochen besser oder schlimmer. Gewöhnlich erlischt es bald unter heftigen Schmerzen gänzlich, nach neuer Erkältung, Diätfehlern, Gemüthsaffecten oder auch ohne nachweisbare Ursache und zwar auf einem Auge früher als dem andern, dem Patienten wohl unbemerkt. — Alle neuen Anfälle nach längerer oder kürzerer Intermission werden durch Exsudationen bezeichnet, die wieder auf die Intensität des Schmerzes grossen Einfluss haben, und für Patient und Arzt doppelt lästig sind, weil diese Zufälle nach der Erblindung noch vorkommen und den Mitteln den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzen. Oft tritt Fieber hinzu und Gemüthsverstimmung bis zum Wahnsinnigwerden. Der schliessliche Ausgang und Ruhepunkt, der aber wohl Jahre auf sich warten lässt, ist Difformität, Vergrösserung mit Ectasien oder Atrophia bulbi; Linsentrübung stellt sich in der Regel früh ein.

Die Behauptung erblichen und beim anderen Geschlechte häufigeren Vorkommens scheint nicht ungegründet; das höhere Alter ist ohne Zweifel prädisponirt, zumal nach einer sorgenvollen, verderbten oder verschwelgten Vergangenheit.

Die Prognose ist selbst in den Anfängen der Krankheit stets durchaus ungünstig. Man darf allerhöchstens hoffen, durch

zweckgemässe und consequent durchgeführte Behandlung den deletären Process von dem zweiten Auge abwenden zu können.

Therapeutisch vermag man örtlich wenig zu leisten, da durch antiphlog. Mittel (Blutegel) auch geschadet werden kann. Kälte, Augewässer, spirituöse Einreibungen würden den Eintritt der Blindheit höchstens beschleunigen und auch das noch gute Auge in Gefahr setzen.

Ausser der Vermeidung aller Schädlichkeiten, als: Gebrauch der Augen, besonders bei sitzender Lebensweise und in kaltefeuchten Räumen, von Diätfehlern, Gemüthsaffecten ist auf das Grundleiden, den kranken Unterleib und die porta malorum i. e. vena portae zu wirken. Mittelsalze, auflösende und eröffnende Pflanzenextracte, Antarthritica überhaupt, Cucurbitulae im Nacken, Hirudines am After, Fontanellen, ung. Autenr., scharfe Fussbäder, Curen in den böhmischen Bädern etc. müssen nach Umständen in Anwendung gezogen werden.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle hat der Arzt nur die Aufgabe, die ausserordentlichen Beschwerden, unter denen der Patient erblindet ist oder erblindet, zu bekämpfen. Selten, dass das zweite Auge länger als einige Jahre dem Schicksal des zuersterkrankten entzogen werden kann. Zu diesem Behufe eignet sich bei dem intermittirenden Character der Krankheit neben den narkotischen Mitteln und in Verbindung mit ihnen besonders das schwefelsaure Chinin. zu mehreren Granen täglich. Morphium acet., Extr. Opii aq. wendet man innerlich und endermatisch oder in Salbenform an. *Cunier* sah von Cyanuretum Zinci einige Male Erfolg. Von schneller Hülfe pflegt trockne Wärme zu sein, die deshalb auch von den Patienten oft instinctmässig angewendet wird. Lassen alle diese Mittel im Stich, so hilft oft noch die Punction und Entleerung, freilich auch nur in den Fällen, wo hochgesteigter Spannungsgrad Schmerzveranlassung war.

Apoplexia choroideae,

Die an zarten Gefässen überreiche *Chor.* ist häufiger der Quell innerer Blutung, als man bisher angenommen hat, und zwar ergiesst sich das Blut meist nach der Sclera zu, doch auch zwischen Retina und Choroidea, ebenso in die Choroidea-substanz selbst, obgleich bisher verlässliche Sectionsbefunde hierüber nicht vorliegen. Dringt es bis in das corp. vitr., so muss die Retina vorher durchbrochen sein, die dann auch blutet, so dass die *Apoplexia* eine combinirte beider Membranen wird. Meist stammt der im corp. vitr. vorgefundene Blutheerd aus der Retina allein. Verletzungen, besonders Stich- und Hiebunden, als Ursache führen meist zu reichlichem Erguss bis in die Kammern, wenn es nicht zu allgemeiner Zerstörung, Verlust der Linse und des Glaskörpers kommt. Allgemeine Erschütterungen durch Stoss, Fall, Schlag oder Brechen, Husten,

Niesen u. dgl., dann auch plötzliche Temperaturveränderung, Luftzug etc. können zu zahlreichen kleinen Heerden Anlass werden, die objectiv durch den Spiegel nachweisbar sind, subjectiv durch mehr weniger starke, partielle oder totale Verdunkelung des Gesichts, oder roth-, braun-, schwarzfarbige Schattenbilder sich anzeigen, die entweder zu Lücken im Sehfelde oder zu totaler Anästhesie führen. Entzündliche Reaction bleibt nicht aus und führt bei kleinen Extravasaten zur Resorption und Genesung; einigermassen starke Ergüsse compliciren sich sofort mit Anästhesia retin. und geben stets eine ungünstige Prognose, sind auch meist mit anderweitigen Symptomen von Cerebralcongestion oder Apoplexie verbunden.

Therap. Da in der Regel Prädisposition vorhanden ist, so hat man diese zu bekämpfen, habituelle Blutungen u. dgl. herzustellen, durch blutige Schröpfköpfe im Nacken abzuleiten; örtlich Kälte und adstringirende Mittel (Alaun, Tannin, Eisen-salze, Plumb. acet.), dabei Ruhe und Antiphlogose gegen beginnende Entzündung. Endlich zur Beförderung der Resorption spirituöse Waschungen und Bähungen mit verdünnter Arnica-tinctur, Einreibungen von Mercur- und Jodkalisalbe, vielleicht auch Electricität. Innerlich ist Calomel, Polygala, Digitalis, Arnica und Jodkali empfohlen. Besonders vorsichtig sei man hinsichtlich der Anwendung des Brechweinsteins.

Hydrops choroidealis,

Erguss seröser Flüssigkeit aus der Choroidea und zwar nach Innen, nach der Retina zu, (desshalb auch *Hydr. subretinalis* genannt) wird mit Hülfe ophthalmoscopischer Untersuchung nicht so sehr selten da gefunden, wo früher Amblyopie oder Amaurose diagnosticirt wurde, deren usurpirtes und sehr umfangreiches Gebiet sie also glücklich beschränken hilft. Der seröse Erguss erfolgt auf Irritation der Choroidea bei vorhandener Prädisposition primär oder es ist der Erguss ursprünglich ein blutiger oder wenigstens mit Blutfarbstoff durchtränkter und wird nur missfarbig, molkig mit der Zersetzung und Verfärbung der färbenden Bestandtheile. Oft reicht eine mehrweniger heftige Verletzung des Bulbus hin, um den Reizzustand und den serösen, resp. blutfarbigen Erguss zu bewirken. Wie in Vesicatorblasen liegt die Flüssigkeit meist an den tiefgelegenen Stellen, während die Abscheidung, mithin auch die Ablösung der Retina von der Chor. in weiterer Ausdehnung stattfand. Haften beide Membranen mehr nach unten fest aneinander, so bleibt der Erguss über dieser Partie stehen. Es kann sich die ganze Retina ablösen und trichterförmig von der Eintrittsstelle des *nerv. optic.* bis an die *Ora serrata* vorbauchen, in welchem Falle sie dann mit blossem Auge hinter der Pupille sichtbar wird. Mittels des Augenspiegels kann man das Uebel nun auch in den ersten Anfängen

beobachten, kleine Ergüsse hinter der Retina deutlich bestimmen, Sitz, Farbe, Form und deren Fortgang und Veränderung verfolgen. Frische Retinalsäcke sind noch durchscheinend, später werden sie, während auch die Function der Retina endlich ganz aufhört, undurchscheinend, grau, faltig, schattenwerfend; die Säcke können sich vor intacte Retinalpartieen drängen und dadurch zu Farbenerscheinungen Anlass geben.

Die Resorption von Exsudaten im Glaskörper kann durch die dabei stattfindende Volumensverkleinerung des letzteren ebenfalls zur Ablösung der Retina von der Choroidea und zum Erguss von seröser Flüssigkeit zwischen beiden Membranen Anlass geben.

Subjectiv wird meist plötzlich, ohne Schmerz und wohl ohne nachweisbare Ursache Verfinsterung, wie von Wolken Schatten herrührend, beobachtet; da der Erguss unten stattzufinden pflegt, in der oberen Partie des Sehfeldes und im Anfange röthlichschimmernd oder doch mit röthlichem Saume. Diese Färbung verliert sich allmählig und geht mit der Entmischung des Ergusses und der Functionsbeeinträchtigung der Retina in's Gelbe, Graue, Schwärzliche bis zur absoluten partiellen Blindheit, d. h. Lähmung und Atrophirung der Retina über. Die Entartung dieser Membran kann man in günstigen Fällen objectiv beobachten; anfänglich fungirt sie noch, wenn auch beschränkt, das Retinalblut circulirt noch, schliesslich ist sie undurchscheinend und von obliterirten Gefässen durchzogen. Das Gesichtsvermögen bleibt in den der intacten Retinalpartie entsprechenden, d. h. entgegengesetzten Richtungen ungestört und oft überraschend scharf. Wenn rings um den *nerv. optic.* Ablösung stattgefunden hat, hört auch in den nicht abgelösten peripherischen Theilen jede Sinnesthätigkeit auf; wenigstens ist deren Fortleitung unterbrochen und das Auge blind. Der Zustand von *Hemiopie*, d. h. das Fehlen eines Theiles des Sehfeldes dauert oft lange Zeit hindurch, kann aber freilich auch durch anderweitige die Retina lähmende Ursachen bald in Fehlen des ganzen Sehfeldes, d. h. in vollständige Blindheit übergehen.

Von den mannichfachen subjectiven Erscheinungen, welche die Patienten angeben, erklärt sich die Difformität mancher Sehobjecte, das schiefe Auslaufen gerader Linien, das Unterbrochensein derselben etc. aus theilweiser Ablösung oder Faltung der noch fungirenden Netzhaut.

Im Verlaufe stellen sich verschiedene Complicativkrankungen in den Nachbarorganen ein. Ausser Retinalparese und Atrophie eine punkt- und fleckgrosse Entzündung in der Substanz derselben, oft mehrfach vorhanden, maculöser Ecchymosirung nicht unähnlich, von der sie aber bei mikroskopischer Betrachtung durch zahlreiche Gefässneubildungen wohl zu unterscheiden sind. Steigert sich diese Retinitis, so folgt ihr nicht gar selten *Iritis*, *Synechia posterior*, *Cataracta mollis*,

dehiscens, accreta, Atrophie und Entartung des *corp. vitreum* u. dgl. m., worüber, wie über Aetiologie und Therapie weitere Beobachtungen belehren müssen.

Erguss nach der Sclera hin führt bald zu Ectasie derselben (s. d. p. 77). Erguss mit Perforation der Retina zu *Hydr. corp. vitr.* (s. d. p. 110).

Laesiones Chor.

sind entweder leichte Stichwunden, deren bei der Blutung der *Chor.* Erwähnung geschah, oder mit weitergreifenden Bulbuszerstörungen complicirt. Demgemäss ist die Behandlung. Man sorge für Reposition, so weit sie möglich ist, Verschluss des Auges, energische Antiphlogose. Ist das Linsensystem sehr verletzt, so entferne man die Linse, da sie sich doch trüben und als fremder Körper schaden würde.

Albinismus, Pigmentmangel,

ein nicht gar seltner, äusserst interessanter angeborener Fehler, darauf beruhend, dass weder die Pigmentzellen der *Uvea* noch die der *Chor.* wirkliches Pigment enthalten, wodurch der optische Apparat des Auges einer wesentlichen Bedingung normalen Fungirens beraubt ist. Indem der das Licht absorbirende Belag den undurchsichtigen Membranen (Iris und Chor.) fehlt, dringen die Strahlen als weisses Licht durch Iris und Sclera und lassen im Auge, wie in einer mangelhaft verdunkelten camera obscura, das Entstehen deutlicher Bilder nicht zu. In Folge des steten Reizzustandes gewöhnen sich solche Augen leicht an *Nystagmus*, das Gesicht ist mangelhaft, im Dunkeln besser. Oft sind andere Fehler gleichzeitig vorhanden: *Hebetudo visus, Myopie, Iridodonesis, Dyscorie* u. s. w. Das Pigment fehlt auch den Haaren, Brauen und Wimpern. Erblichkeit ist constatirt.

Dr. *Liebreich* (v. *Gräfe's* Archiv. I. Bd. 2. Abth. p. 334) konnte bei einem albinotischem Mädchen ein die Sclerotica schräg durchbohrendes Gefäss der Choroidea längs des kurzen Weges durch die Sclerotica hin verfolgen und sah also die Substanz der Sclerotica vor dem ihr als Hintergrund dienendem Gefäss, dessen im weiteren Verlaufe intensiv rothe Farbe an dieser Stelle durch das herüberziehende Scleroticalgewebe beträchtlich gedämpft wurde.

Therap. Mehr als farbige Brillengläser nützen, wie ich im Jahre 1853 in Bonn bei herumreisenden Kakerlaken (*Helio-phoben*) nachzuweisen Gelegenheit nahm, die myotischen Brillen, indem sie einfach an der Stelle der durchscheinenden Sclera und Iris in Function treten und alles überschüssige und nachtheilige Licht abhalten.

Coloboma Chor., angeborene Choroidealspaltung ist mit *Iriscoloboma* in entsprechendem Grade wohl stets gleichzeitig vorhanden.

Echinococcus im Bereiche der Chor. ist einige Male be-

obachtet, doch sind von Spiegel- und Sectionsuntersuchungen noch weitere Bestätigungen zu erwarten.

Medullare und melanotische Ablagerungen scheinen in der Chor. nur secundär, d. h. von der Retina und anderen Nachbarorganen aus, vorzukommen.

XI.

Der Strahlenkörper.

Kyklitis,

Die Entzündung des corp. ciliare ist erst in der letzten Zeit näher untersucht und häufiger beschrieben worden. Jedenfalls ist sie eine Seltenheit, insofern nämlich, als sie selten für sich auftritt, sondern meistens erst im Verlaufe von Entzündungen der Iris, Hornhaut, Choroidea etc. Stellt sie sich primär ein, so gesellen sich Iritis und Choroiditis fast stets schnell hinzu, dass die Kyklitissymptome alsbald verdeckt sind. Sie zeigt sich nicht immer ringförmig, wie ihr Name sie bezeichnet, sondern auch wie ein halber Ring und ist dann nur partiell vorhanden. Meistens aber ist der *annulus subconjunctivalis* vollständig ausgebildet und zwar schmal, scharf abgegränzt, scheinbar erhaben, von zahlreichen, feinen Gefässen intensiv roth und dunkler als bei einfacher Congestion oder bei Iritis. Der Blutreichthum des entzündeten Ciliarkörpers soll den äussern Irisrand sichtbar vordrängen, so dass der Pupillarrand zurückgezogen erscheine. Setzt sich plastisches Exsudat ab, so verhartet der Ciliarkörper (*Kykl. chron.*) in geschwollenem Zustande, ist das Exsudat serös, so drängt es sich zwischen *Corp. vitreum* und *Sclerotica*, in der nach Umständen *Ectasien* Folge sein können. Als wesentliches Merkmal der *Kyklitis* müssen noch die Reflexsymptome, Schmerz, Lichtscheu, Lidkrampf, Thränenschiessen, Sehstörung hervorgehoben werden, ohne welche Entzündung dieses gefäss- und nervenreichen Organes nicht auftreten kann. — Bei längerem Bestande trübt sich die hintere Cornealwand oder entzündet sich die Cornea selbst (*Kerato-Kyklitis*), noch häufiger folgt Entzündung der Iris (*Irido-Kyklitis*) und Choroiditis mit ihren Ausgängen, neben der dann die *Kyklitis* in den Hintergrund tritt. Bei solcher Steigerung bleiben Fieber und gastrische Störungen nicht aus, ebensowenig der charakteristische Supraorbitalschmerz mit seinen Ausstrahlungen in den Nervenbahnen.

Bei rechtzeitiger ernstlicher Antiphlogose kann *Kyklitis* coupirt werden, sonst droht sie durch Complicationen Gefahr. *Hasner* rühmt sich, durch Blutegel, trotz des Veto's der Augenärzte, in der Nähe des Auges gesetzt, rasche Linderung erzielt zu haben. Schnellgeleistete Hülfe ist jedenfalls hauptsächlich, um serösen Ergiessungen vorzubeugen.

Staphyloma corp. ciliaris

wird die Ausdehnung des Scleralfalzes genannt, welche bei reichlichem Serumerguss im Verlaufe von *Kyklitis* eintritt. Da die vorgebauchten Partien dunkelblau erscheinen, wie von venösem Blute herrührend, so hat man den irreführenden Namen *Varicositas orbicul. cil.* für diesen Zustand missbräuchlich angewendet. Bei der Punction entleert sich Serum, nie Blut. (Vgl. übrigens *Sclerectasie* pag. 77.)

XII.

Die Augenmuskeln.**Ophthalmomyitis,**

Entzündung des Augenmuskelapparates kommt selten und nur nach Einwirkung kalten Luftzuges auf den erhitzten Kopf oder in Folge von Verletzungen als selbstständiges Leiden vor, begleitet aber häufig hochgradige Entzündungen der Augenhöhle oder der Bindehäute. Die Bewegung des Auges ist sofort gestört und schmerzhaft, unter allgemeinen Reflexerscheinungen, Conjunctivalinjection, Pupillenverengung und Verminderung des Sehvermögens stellt sich bald als charakteristisches Symptom *Strabismus*, entsprechend den befallenen Muskeln, ein, der in vernachlässigten Fällen zu permanentem Schiefstehen des Apfels führen kann. Der Verlauf ist nur nach den erstgenannten Ursachen acut und prognostisch nicht ungünstig. Die chronische, meist complicirte Form führt gern zur Hypertrophie und Verwachsung der Muskeln mit einander oder zur Degeneration der Scheiden und des Zellgewebes, was die Fixation des Bulbus nach der kranken Seite zur Folge hat. Besteht diese *Lusitas* lange, so atrophirt die Muskelsubstanz schliesslich, so dass sie bei der Section nur noch schwer nachweisbar ist. In den Fällen, welchen *Lusitas* nach der entgegengesetzten Seite folgt, waren die motorischen Nerven mehr als die Muskeln befallen, bewirkten Lähmung derselben und gaben den antagonistischen Muskeln das Uebergewicht.

Bei traumatischer Veranlassung muss antiphlogistisch verfahren und bei beginnender *Lusitas* versucht werden, durch geeignete Stellung des Bulbus nach der entgegengesetzten Seite, vielleicht auch durch Benutzung prismatischer Gläser diesem Ausgange vorzubeugen. Acutes Rheuma erfordert sofortige Diaphoresis, die das Uebel oft in wenigen Tagen beseitigt, indess grosse Neigung zu Recidiven auf geringe Erkältungen hinterlässt. Begleitet *Ophthalmomyitis* Entzündungen benachbarter Gebilde, so bedarf sie keiner Specialbehandlung.

Cystenbildung innerhalb der Augenmuskelsubstanz ist einige Male als Ursache von *Lusitas* beobachtet worden, doch fehlen zur Zeit noch bestätigende Mittheilungen.

Strabismus, Schielen,

ist der Zustand des Unvermögens, beide optischen oder Sehaxen des Auges, d. h. die Linien von der *macula lutea* durch das Centrum der Linse und Hornhaut, vermittelt des Augenmuskelapparates dergestalt willkürlich und gleichzeitig auf einen Punkt gerichtet zu halten, dass sie in demselben behufs scharfen Sehens vereinigt bleiben. Liegt immer die Sehaxe desselben Auges ausserhalb der normalen Richtung, so heisst der **Strabismus** einseitig, *Str. monocularis*; fixirt bald das eine, bald das andere Auge das Sehobject, *Str. alternans*, s. *duplex*. Da Neugeborene überhaupt nicht fixiren, so ist bei ihnen temporäres Schielen Regel, verliert sich aber, so bald bei ihnen das Gesetz der Association der Bewegungen zur Geltung kommt und sie einen bestimmten Gegenstand sicher in's Auge zu fassen lernen. Unvollständigkeit des Augenmuskelapparates, die erblich beobachtet wird, ist wohl die einzige Ursache angeborenen Schielens.

Gemäss der Art der Axenabweichung unterscheidet man

1) *Str. convergens* s. *int.*, Schielen nach Innen, die häufigste Art,

2) *Str. divergens* s. *ext.*, Schielen nach Aussen, seltener,

3) — *descendens* s. *inf.* und

4) — *ascendens* s. *sup.*, sehr selten, sowie die Mischformen,

5) — *intern. inf.* und *int. sup.* — Ferner

6) — *terribilis*, d. h. der Zustand, wo das eine Auge nach Oben und das andere nach Unten gerichtet ist. Verlassen die Axen nur im Affect die normale Stellung, so ist nicht genuiner **Strabismus** vorhanden, sondern Anlage zum sogen. falschen Blick. Unter

7) *Str. mobilis* versteht man gemeinhin den **Strabismus**, bei dem das schielende Auge, während das andere verdeckt ist, alle Bewegungen ausführen kann, unter *Str. immobilis*, auch *Lusitas* genannt, den, wo nicht alle oder keine Bewegungen mit dem schielenden Auge gemacht werden können, z. B. bei Parese oder Defect einzelner Muskeln. Letzterer kommt auf beiden Seiten nur ausnahmsweise vor.

Der grössern oder geringeren Abweichung der Axen gemäss pflegt man 4 Grade zu unterscheiden, von denen der erste wenig störend ist, während bei dem vierten nur das Weisse des Auges sichtbar ist.

Aetiologisch betrachtet, kann

1) angeborene Fehlerhaftigkeit des Muskelapparates Anlass sein, indem Muskeln fehlen, in zu hohem oder zu niederem Grade entwickelt, an sich zu lang oder zu kurz sind oder durch abnorme Insertion am Bulbus als zu lang oder zu kurz thätig werden.

2) erworbene Fehlerhaftigkeit des Muskelapparates, indem nach Verletzungen, Druck von Geschwülsten oder Extravasaten, durch Narbenwirkung, durch fremde Körper oder durch Atrophie die normale Beschaffenheit und Function der Muskeln beeinträchtigt wird.

Zu den entfernten Ursachen gehört:

3) Gewohnheit, einseitig zu sehen, in Folge von Vernachlässigung oder von Fehlern des schielenden Auges, z. B. *Dyskoria* (auch *Pupille artific.*), *Cornealneoplasie*, *Catar. centr.*, *Ptosis*, *Epicanthus*, *Ankyloblepharon partiale*, *Synechia*, differente Sehweite auf beiden Augen, Uebersichtigkeit eines Auges u. d. m., wodurch der Patient verführt wird, ein Auge unthätig aus der Sehaxe weichen zu lassen, um nicht ein undeutliches Bild, welches das deutliche Bild des andern Auges auch undeutlich machen würde, mit demselben zu erhalten. (Optisches Schielen.) Diese Fehler haben indess keineswegs immer *Strabismus* zur Folge. Der ursprünglich freiwillige und temporäre *Strabismus* wird allmählig unfreiwillig permanent.

4) Innervationsanomalie und zwar sowohl spastische, durch Verletzung, rheumatische und andere Affecte herbeigeführt (*Str. activus*), als besonders paralytische (*Str. passivus*), wobei zu beachten, dass der in Krampf befindliche Theil des Muskelapparates noch eine beschränkte Bewegung ausführen kann, während paralysirte Muskeln gegen die Thätigkeit ihrer Antagonisten durchaus kraftlos sich verhalten.

5) Irritationszustand in der sensiblen Sphäre, also durch den *Nerv. sympathicus* und den *Nerv. quintus* vermittelt, kann zu *Strabismus* sehr leicht Anlass geben, also bei Wurm- und anderen Darmreizen, Uteruskrankheiten, Schwangerschaft, in der Zahnperiode, bei Zurücktritt von acuten Exanthemen, Convulsionen etc. Sodann aus cerebrocentraler Ursache bei heftigen Affecten und besonders bei organischen Fehlern, Tumoren, Exsudaten, nach Hydrocephalus u. dgl. (Symptomatisches Schielen.)

6) In wiefern Incongruenz der Netzhäute, d. h. angeborene Ungleichartigkeit der s. g. identischen Retinalpunkte zu *Strabismus* führen kann, ist noch nicht mit ganzer Sicherheit erwiesen und muss durch fortgesetzte Beobachtungen vor und nach Schieloperationen festgestellt werden, sowohl mit Hülfe des Spiegels, um die Beschaffenheit der Retina vergleichungsweise zu ermitteln, als auch durch Prismen, blaue Gläser etc., um die Stellung und Verstellung der Doppelbilder zur Diagnose zu benutzen.

Mag die Ursache des *Strabismus* ursprünglich, wie es fast stets der Fall ist, im Muskelsysteme begründet sein oder nicht, im Verlaufe ist immer dieser Bewegungsapparat des Bulbus alienirt und somit als Hauptsitz des Uebels anzusprechen.

Um sich zu überzeugen, welches Auge das schielende Auge sei, lasse man ein bestimmtes Object fixiren und verdecke abwechselnd jedes Auge, um dasjenige, welches beim Verdecken des anderen eine Rückbewegung zum Einstellen auf das Object zu machen hat, als das schielende zu erkennen. Schielende haben die Gewohnheit, eine Gesichtshälfte, oft zugleich mit der gleichseitigen Körperhälfte mehr nach Vorn vorzukehren, meist die des gesunden Auges, doch nicht in allen Fällen. Seitliche Haltung zeigen sie in der Regel; oft auch ein unsicheres und schwankendes Einstellen des guten Auges. Naturheilungen können nur zu Stande kommen, wo die Muskeln noch nicht entartet waren, wenn die ursächlichen Momente zu wirken aufgehört hatten. Diese Entartung, d. h. überwiegende Entwicklung einer Antagonistengruppe, erfolgt aber meist in kurzer Zeit, wesshalb die Prognose, abgesehen von den Erfolgen der Operation, als ungünstig zu bezeichnen ist. Nur bei frischen Fällen der ersten Grade ist eine weniger ungünstige zulässig.

Auch compliciren sich mit älterem *Strabismus* verschiedene andere Zustände gern, die den *Strabismus* selbst wieder hartnäckiger machen. Zu *Str. converg. Myopie*, *Asthenopie*, besonders auch *Diplopie*, d. h. Entstehung von Doppelbildern, wenn die Abweichung und die grössere Schwäche des schielenden Auges nur gering ist und der Patient dasselbe nicht vollständig unthätig hinstarren lässt. Die *Diplopie* verliert sich mit dem Eintritt höherer Grade — zur Bequemlichkeit der Kranken. Nach der Operation stellt es sich indess wieder ein und muss dann durch passende Vorrichtungen (Prismen) und Sehübungen bekämpft werden. Die Gesichtsschwäche des schielenden Auges, die fast ohne Ausnahme beobachtet wird und auf verringerter Vitalität der Retina beruht, ist häufiger Ursache als Folge des Schielens.

Die Cur ist im Beginn des *Strabismus* gegen das Grundleiden zu richten und in geeigneten Fällen wohl von Erfolg. Würmer müssen entfernt, Rheumatismen, Lähmungen, Krämpfe etc. durch Ableitungen beseitigt, zugleich der Wille des Kranken, gerade zu sehen, angeregt werden. Bei Kindern ist es wichtig, alle Sehobjecte aus der Nähe der Augen zu entfernen (Haare, Locken, Bänder etc.), sie viel auf Abstand, also besonders im Freien, sehen zu lassen, die Lagerstätten und Stühle der Kinder nicht seitlich zum Lichte zu stellen, sie abwechselnd auf dem rechten und linken Arme tragen zu lassen, dann auch mit Strenge ihnen das Schielen zu verbieten.

Frischer *Strabismus* aus Gebrauchsvernachlässigung, in Folge von Entzündungen, Hornhauttrübung u. d. lässt sich oft durch periodisches Verschliessen des gesunden und bis zur Ermüdung fortgesetzten Gebrauch des kranken Auges heben. Nach *Rognetta* soll wenigstens Besserung dadurch erzielt wor-

den sein, dass man in seitwärts gehaltenen Büchern anhaltend lesen liess. *Böhm* liess Brillen tragen, deren Gläser, dem Zustande der verschiedenen Sehkraft beider Augen angemessen, verschieden gefärbt (blau) waren, so dass das kranke Auge ein helleres Glas erhielt, also gleiches Lichtquantum auf beide Netzhäute gelangte und von diesen die Muskelaction gleichmässig stark angeregt wurde. *Krecke* in Utrecht stellte die Idee auf, durch prismatische Brillengläser bei *Strabismus* niederen Grades die Sehaxen in entsprechende Direction zu bringen. Bei *Str. convergens* sollten die Uebungen mit Prismen von solcher Stärke vorgenommen werden, dass die Axen durch sie zu einiger Divergenz gezwungen würden, um nach Entfernung der Gläser allmählig in die normale Richtung zu treten. Die Resultate sind indess bisher ebenso ungenügend, als die Uebungen mit den Prismen beschwerlich, wesshalb man den Gebrauch derselben auf Correction der Axenstellung nach der Operation zu beschränken pflegt. Die sogen. durchbohrten Nusschaalen, früher illusorisch als Schielbrillen benutzt, haben jetzt als myotische oder stenopäische Brille eine andere Aufgabe zu erfüllen. (Cfr. pag. 61.) Das sicherste Heilmittel ist die *Myotomia ocularis*, unter den Operationen eine der schätzenswerthesten Errungenschaften der heutigen *Ophthalmiatrik*, 1838 von *Stromeyer* empfohlen, 1839 von *Dieffenbach* zuerst ausgeführt.

XIII.

Die Thränenorgane.

Dacryadenitis, Entzündung der Thränendrüse, erfolgt auf Verletzungen oder in Complication mit Entzündung des Orbitalzellgewebes und ist jedenfalls sehr selten. Der acute Verlauf ist durch Schmerz, Geschwulst und Verhaltung der Thränen ausgezeichnet, deren reichlicherer Erguss auf Rückgang der Entzündung oder auf Eintritt der chronischen Form hinweist. Letztere ist wohl mit Hyperästhesie der Empfindungsnerven complicirt, was *Schmidt* zu der Benennung *Dacryoadenalgia asthenica* veranlasste. Tritt der Ausgang in Verhärtung oder Hypertrophie ein, so wird die Drüse exstirpirt, kommt es zur Eiterung, so stellt sich nach Entleerung des Eiters der Normalzustand meist bald wieder her. Nur in den seltenen Fällen, wo durch den Eiter einzelne Drüschchen oder Drüsengänge zerstört waren, hinterbleibt eine haarfeine Fistelöffnung, aus der sich Eiter und Thränen entleeren, besonders bei Reiz zum

Weinen. Borsten dringen bis tief in die Drüse, die nach *Schmidt* in 24 St. über 2 Pfund Thränen entleeren kann. — Die Therapie ist einfach antiphlogistisch, die Fistel heilt in der Regel bald ohne ärztliches Zuthun. Zögert die Verschlussung, so kann man durch potentielle oder actuelle Cauterisation, durch reizende Einspritzungen, Spaltung und Druckverband dieselbe beschleunigen.

Dacryops, Thränengeschwulst am Oberlide, scheint ein Name für verschiedenartige Uebel zu sein. *Schmidt*, der sie zuerst genau beschrieb, erklärt sie als Ausdehnung im Zellgewebe der Drüse durch blindes Endigen eines Drüsenanges in demselben. Sie ist unschmerzhaft, fluctuirend, von bläulicher Farbe, bis baumnussgross und wird voluminöser und praller bei stärkerer Thränenbildung in der Drüse. *Chelius* will ihre Entstehung aus allmählicher Vergrößerung eines beim Weinen ausgedehnten Ausführungsganges beobachtet haben. Auch Cystenbildung in der Drüse wird mit Unrecht als *Dacryops* beschrieben.

Selten angeboren, meist nach mechanischen Insulten entstanden, nachtheilig für das Auge nur bei enormer Grösse. Die Entfernung durch die Operation ist ohne Schwierigkeit hinsichtlich der Ausführung, sichert aber vor Recidiven nicht stets, wesshalb es oft nothwendig ist, durch eingelegte Fäden entweder adhaesive Entzündung im Balge zu erregen oder eine Fistel künstlich zu etabliren, durch die das Secret Ausfluss behält. Von der Lage des *Dacryops* bleibt es abhängig, ob die Fistel auf der Innen- oder Aussenseite des Lides mündet.

Hydatis gland. lacrymalis, Cystengeschwulst der Thränen-drüse, mit Serum, auch mit *Akephalocysten* gefüllt beobachtet, gehört zu den seltenen Erkrankungen am Auge, beginnt mit Spannung, Druckschmerz, verringertem Thränenfluss und kann solche Ausdehnung erlangen, dass der Bulbus hervorgeedrängt wird (*Exophthalmus*). Wird die Natur des Uebels rechtzeitig erkannt, so kann man die wässrige Feuchtigkeit durch Punction entleeren und durch eingelegte, mit reizenden Salben bestrichene Wicken den Balg zur Eiterung bringen und zerstören. Weil die Reizmittel die Integrität des Bulbus beeinträchtigen können, ist es besser, aber nicht stets ausführbar, den Cystenbalg mit der Pincette zu erfassen und ihn auszulösen. Wird die degenerirte Drüse zugleich zerstört, so ist der Verlust gering, da, wie *v. Gräfe* jun. zuerst, auch durch Experimente, nachgewiesen hat, der Thränenmangel nur wenig Beschwerden mit sich führt: schnellere Trockenheit des Auges im Winde, die durch häufigeren Lidschlag beseitigt wird, und geringeren Widerstand gegen Reiz durch fremde Körper. Die Zerrung des *n. optic.* bei vorgetriebenem Bulbus kann *Anästhesia* desselben verursachen, die sich aber wieder zu verlieren pflegt, wenn die Cyste zerstört und der Bulbus wieder in die Orbita

zurückgekehrt ist. Bei dem versteckten Sitze der Cyste ist sie oft nicht zu diagnosticiren; sie entwickelt sich auf Kosten des Bulbus, der exophthalmisch zu Grunde geht und kann durch Druck auf die *dura meninx* wohl auch *Meningitis* und Tod veranlassen.

Dacryocystitis, Thränensackentzündung,

stellt sich in der Regel gelinde und schleichend ein, um auf Erkältung, durch angehäuften Secret und andere Reize plötzlich acuten Verlauf zu nehmen und als jene bekannte bohnen-grosse Geschwulst an der inneren Nasenseite ärztliche Hülfe erforderlich zu machen. Bei torpiden Individuen tritt diese Geschwulst auch ohne Entzündungssymptome auf, erregt wenig Schmerz und entleert beim Fingerdruck Schleim und Thränen durch die Thränenpunkte und durch den Nasencanal. Häufiger aber wird sie schmerzhaft, livideroth und ist bald von entsprechender Schwellung der Lider, Injection der Bindehäute und rosen-artigem Zustande der Wange begleitet. Bei weiterem Fortgange mehrt sich die Spannung und es tritt grosse Schmerzhaftigkeit mit Fieber hinzu. Die nicht mehr aufgesogenen und in Folge des Reizes reichlicheren Thränen fließen unausgesetzt über die Wange ab.

Während des chronischen Verlaufes, der Jahre hindurch zu währen pflegt, ist die Entzündung auf die Schleimhaut des Thränensackes beschränkt, in der sie sich bis in den Nasencanal und die Thränenpunkte, selbst bis auf die Bindehaut fortsetzen kann, ohne dass die Zellgewebshülle, Knochen und Haut complicirt werden. Periodisch füllt sich der Sack mit mehr Secret, das aus Thränen, Schleim und wenig Eiterzusatz besteht. Wird dasselbe nicht entfernt, so erschlaffen die Sackwände, verharren in der Ausdehnung (Atonie, Ectasie, Blennorrhoe, Hernie [*Beer*] des Thränensackes) und können durch gleichzeitige Hyperästhesie der Empfindungsnerven in einen neuralgischen Zustand gerathen (*Dacryocystalgia*, *Schmidt*). Die Thränen gelangen nicht in die Nase, sondern fließen über die Wange; die dabei eintretende Trockenheit der Nase rührt indess mehr von gleichzeitigem Katarrh etc. derselben her (*Hasner*). Geringer Grad dieses Zustandes ist oft nur aus dem verringerten oder aufgehobenen Abfluss des Secrets zu erkennen, die höheren Grade, besonders intercurrent auftretender acuter Verlauf bewirken Schmerz, Röthe, Geschwulst und Mitentzündung von Haut, Zellgewebe, Knochen, ebenso Mitvereiterung derselben und Fistelbildung. (s. d.)

Bei sofort angewandter energischen Antiphlogose bildet sich die reine acute Form in der Mehrzahl der Fälle günstig zurück; Blutegel, kalte Aufschläge, nach Umständen warme mit aq. sat. oder Goulardi, Laxanzen, ruhiges Verhalten genügen.

Gesellte sich acuter Verlauf zu der chronischen Form, so

muss nach Bekämpfung der Entzündungssymptome der atonische und blennorrhische Zustand der Schleimhaut auf die Norm zurückgebracht werden, zu welchem Behuf die Entleerung täglich mehrere Male vorzunehmen und nach jeder Entleerung eine Solution von Arg. nitr., Lap. divin., Zinc. oder Cuprum sulph. (bei grosser Empfindlichkeit mit Zusatz von Laudanum) dergestalt und bei Rückenlage des Kranken zu instilliren ist, dass die Thränenpunkte die Solution auch wirklich aufsaugen. Gleichzeitig lege man ein zertheilendes Pflaster (Cicuta, Diachyl. comp. etc.) fest über die Geschwulst, Sorge für Ruhe, Diät, Behandlung der complicativen und causalen Anomalien, besonders auch für Vermeidung jedes örtlichen Reizes.

Saugen die Thränenpunkte die Solution nicht ein, so wird dieselbe auf operative Weise eingespritzt, mittelst der Anel-Jüngken'schen Spritze von den Thränenpunkten oder des Gensoul'schen Katheters vom Nasencanale aus. (S. im operat. Theile.)

Bleibt diese Behandlung ohne Erfolg, weil mechanische oder mechanisch wirkende organische Hindernisse vorhanden sind, so wird operativ eine Thränensackfistel zu Wege gebracht und die Behandlung derselben eingeschlagen.

Continuirlicher Druckverband, auch die Anwendung von Compressorien führen nie zum Ziele, da die Knochentheile die Wirkung des Druckes auf der unteren Partie nicht zulassen.

Fistula sacci lacr., Thränensackfistel,

eine bleibende, widernatürliche Oeffnung des Thränensacks mit Entleerung der Secrete in die Nasenhöhle, in das antr. Highm. etc. (*F. interna*) oder nach Aussen auf die Wange (*F. externa*), kommt besonders als Ausgang derjenigen chron. Dacryocystiden vor, welche auf organischer Entartung des Sackes oder seiner Umgebung beruhen, und ist dann stets schwer heilbar oder unheilbar, wenn Complication mit Caries des Thränenbeins oder eines andern benachbarten Knochens vorhanden ist. — Abscesse nach acuter Entzündung des Schlauches oder des ihn umgebenden Zellgewebes (s. g. *Ankylops*) können bei Vernachlässigung zur Perforation des Schlauches führen, die anfänglich unschwer wieder zur Verheilung der Oeffnung gebracht werden kann, aber bei längerem Bestehen desshalb eine ungünstige Prognose gibt, weil das Secret corrodirend auf das Periosteum wirkt und zu Caries Anlass wird. Der Verlauf des Fistelganges ist entweder einfach, direct vom Schlauche auf die äussere Haut führend, oder es verläuft der Gang gewunden, z. B. um den Schlauch herum, weit am Knochen abwärts etc. Auch können mehrere Fisteln gleichzeitig bestehen und ein Fistelsystem bilden, die verschiedentlich communiciren und tiefgehende Knochenzerstörung bewirken. Eigentliche Verwachsung des Uebergangs

des Schlauches in den Nasengang ist seltner, als man lange angenommen hat, in der Regel ist Verdickung, Falten- und Divertikelbildung in der Schleimhaut, besonders in der unteren Schlauchpartie Ursache der Verengerung oder absoluter Undurchgängigkeit. Andere Male wird letztere durch Nodi, Tophi, Tumoren, Excrescenzen u. d. m. bewirkt.

Es steht fest, dass Weiber von 20—40 Jahre prädisponirt sind, ebenso, dass der linke Thränenschlauch häufiger befallen wird, als der rechte. Jener soll im Allgemeinen enger sein; *Hasner* leitet die grössere Prädisposition der linken Seite von einer nicht seltenen Anomalie im Bau der linken Schädelhälfte her. — Liegt nachweisbar dem örtlichen Uebel eine Allgemein-krankheit zu Grunde (*Syphil.*, *Tubercul.*), so muss dieselbe energisch in Behandlung genommen werden. Die Fistel selbst suche man bis in den Schlauch und durch alle Nebengänge rein zu erhalten sowohl durch Einspritzung reizender Flüssigkeiten, als durch Einlegung von Pressschwamm, durch Extraction von nekrotischen Knochenfragmenten u. s. w. — Zugleich stelle man den natürlichen Abzugscanal durch eingelegte Darmsaiten wieder her. Im Falle des Misslingens, der sehr oft vorkommt, quäle man den Kranken nicht lange durch Versuche, einen neuen Weg zu bahnen, sondern zerstöre und veröde den verdorbenen Schlauch vollständig. Das Abfließen der Thränen über die Wange hört meist bald von selbst auf, weil bei Defect der thränenabführenden Canäle nur noch so viel Thränen gebildet zu werden pflegen, als zur Feuchterhaltung der *Conj.* erforderlich sind und als von ihr verdünsten können. Bei stärker wirkendem Trigeminalreiz durch fremde Körper, Drang zum Weinen etc. werden die Thränen so reichlich producirt, dass sie doch von den Thränenpunkten überhaupt nur zum geringsten Theile aufgenommen werden. Ist ein solcher Reiz krankhaft perpetuirlich oder periodisch vorhanden, so kann Herstellung der normalen Abzugsgänge begreiflicher Weise das Thränenträufeln nicht beseitigen.

Atonia und Atresia punct. und canaliculorum lacrym., abnorme Weite und Enge oder gänzliche Verschlössung der Thränenpunkte und Röhrchen bleibt nach Entzündung häufiger zurück, als bisher beachtet zu werden pflegte. Die *Atonie* kann eine bis viermalige Erweiterung des Lumens bewirken und ist als Folge zu häufiger und ungeschickter Sondirung beobachtet worden. — An der Verengerung ist meist Schleimhauthypertrophie Schuld, doch kann auch callöse Entartung und Pseudomembranbildung Anlass sein. (Man hat vollständiges angeborenes Fehlen der Thränenpunkte und ebenso überzählige beobachtet.) — Beseitigung der *Atonie* durch reizende und adstringirende Collyrien und Salben gelingt nicht leicht, zumal wenn, wie *Hasner* be-

obachtet hat, Schrumpfung nach *Blepharadenitis* und excentrische Zerrung an den Wänden der Röhren zu der Erweiterung derselben Hauptursache war.

Um die Verengerung zu beseitigen, legt man zuerst konische Sonden (nach *v. Gräfe's* Vorgange) 10—15 Minuten ein, um durch mechanische Erweiterung die Anwendung von Luftdouchen vorzubereiten. Bei angeborener Verschlussung der Punkte muss der Einlegung von Sonden, Borsten, Darmsaiten eine blutige Operation vorhergehen. — Liegt nur ein Häutchen über den Punkten, so gelingt die Herstellung wohl durch Beseitigung desselben allein.

Findet bei mangelhafter Aufnahme der Thränen in den Punkten lästige Epiphora statt, so ist wohl in allen Fällen ein anhaltender gleichzeitiger Reizungszustand der Thränendrüse hierzu mehr Anlass, als Enge der Punkte.

Polypi ductuum lacrymalium,

polypöse Excrescenzen werden besonders im Thränenschlauche nicht selten angetroffen. Doch ist die Erkennung vor der Eröffnung der Canäle schwierig, weil durch keine besonderen Merkmale die entstehende Geschwulst von der gewöhnlichen Schlauchgeschwulst ausgezeichnet ist. Ihrer Structur nach verhalten sich diese Polypen wie andere Schleimhautexcrescenzen; besonders mit den in der Nase häufig begegnenden haben sie grosse Aehnlichkeit. Gestielte werden einfach mit der Cooper'schen Scheere entfernt, bei breitaufsitzenden ist es erforderlich, die Basis wiederholt zu cauterisiren, worauf die Wunde geschlossen wird.

Auch aus den Thränencanälchen hat *Desmarres* kleine Polypen hervordringen sehen und zu evulsiren versucht. Da sie abrissen, musste aufgeschlitzt, excidirt und cauterisirt werden, worauf wahrscheinlich Verwachsung erfolgte. — *v. Gräfe jun.* hat Pilzbildung im untern Thränencanälchen beobachtet und mit Glück entfernt. Die Masse war concrementartig, bestand aber einzig aus eng verfilzten Fadenpilzen, deren Phallusfäden, Sporen und Sporidien den Favuspilzen ähnlich erschienen. Weniger selten sind sogenannte Dacryolithen (Thränensteine); ausser organischer Substanz bestehen sie hauptsächlich aus kohlen- und phosphorsaurem Kalk und etwas Chlornatron. Sie haben unregelmässige Form, oft eine gekörnte Oberfläche, finden sich entweder in den Gängen, wo sie gebildet zu werden scheinen, oder in den Bindehautfalten. Bei der Untersuchung eines solchen Dacryolithen, den ich zwischen den entzündeten Lidern des rechten Auges einer alten Bäuerin hervorzog, fand ich, dass sich das Concrement über einem groben Sandkorn, das vermuthlich in ein Thränenpüktchen gedrängt und daselbst längere Zeit festgehalten worden war, abgesetzt hatte. Die Frau gab an, dass seit einem Jahre entzündliche Reizung mit

Thränenträufeln auf diesem Auge trotz verschiedenerlei Mittel nie ganz hätten weichen wollen. Nach der Entfernung des Steines, der in der unteren Uebergangsfalte sowohl durch Schleim als durch Schwellung ziemlich fest sass, genas das Auge sehr bald.

Encanthis, Carunkelgeschwulst.

erstreckt sich je nach der Natur der Geschwulst weiter über die Nachbargebilde, die *membr. semilunaris*, Bindehaut etc. oder bleibt beschränkt. Fremde Körper z. B. Aehrengrannen, Splitter, Cilien, erregen nicht so sehr selten Encanthis, die nach Entfernung der Ursache sofort zurückgeht. Bei rein chronischer Entstehung kann die Carunkel selbst hypertrophiren oder die Geschwulst ist eigentliches, aus Bindegewebe, einem gleichmässigem Lager von länglichen Kernen und Spindelzellen bestehendes Neoplasma. Bei scrophulöser, gichtischer u. a. Allgemeinerkrankung steigert sich die Entzündung, zumal vernachlässigt oder misshandelt, wohl zu höheren Graden, geht in Eiterung über, entleert sich, kehrt aber wieder und endigt nach chronischem Verlaufe endlich mit Schwund der Carunkel (*Rhyas*), mit fungöser Entartung derselben (*Enc. fungosa, carcinomatosa*), mit der Ausbildung von Hydatiden, (*Enc. hydatidea*), polypösen Excrescenzen (*Enc. polyposa*) oder kalkiger Concretionen (*Enc. calculosa*). — Schmerz, Thränenfluss etc., besonders aber Inspection sichert die Diagnose. Die Prognose ist bei recenten Fällen günstig, die Therapie beseitigt fremde Körper, Eitermassen, Excrescenzen durch Antiphlogose, Punction, Exstirpation. Die entartete Carunkel wird meist leicht und mit gutem Erfolge ganz weggenommen, wobei nur vorsichtig die Thränenpunkte, die *musc. Horneri* und *orbicular.* zu schonen sind. Zur Ligatur ist nicht leicht Indication vorhanden, wohl aber zur Anwendung des Lapis nach der Operation.

XIV.

Der Augapfel.

Anophthalmus, angeborener Augenmangel,

ist eine der häufigeren Hemmungsbildungen und kommt nur mit anderen hochgradigen Verkümmierungen gleichzeitig vor, wesshalb diese Früchte höchstens Monate alt werden. Die Orbitae fehlen dabei meist gänzlich, von den Wimpern und Lidern sind nur Spuren vorhanden.

Monophthalmus, s. **Cyclopie**, angeborene Einäugigkeit,

besteht in der Regel in mehr weniger vollständigem Zusammenfliessen zweier Augen in eines, das sich in der Mittellinie des übrigens sehr verbildeten Schädels findet und zum Sehen untauglich ist, wie denn auch diese Früchte wohl lebend geboren werden, aber nie lebensfähig bleiben.

Mikrophthalmus, angeborene Atrophie der Augen, ist nicht so sehr selten und fast stets bilateral, wenn auch in verschiedenem Grade. Die oft nur erbsengrossen Augen sind zum Sehen untauglich; ist geringe Lichtperception möglich, so verliert sich dieselbe in der Regel sehr bald.

Megalophthalmus, s. **Buphthalmus**, Ochsenauge, angeborene abnorme Grösse der Augen, kommt ebenfalls mit anderen Missbildungen gemeinschaftlich vor, z. B. als cyclopisches Auge, ist aber meist bilateral und Folge einer vor der Geburt entstandenen Wassersucht des ganzen Auges, also *Hydrophthalmus*.

Myopia, Kurzsichtigkeit,

bezeichnet denjenigen abnormen Zustand des Bulbus, bei dem der Fernpunkt des deutlichen Sehens statt 12 und mehr nur bis c. 6 Zoll beträgt. Meist ist *Myopie* beiderseits vorhanden, wenn auch in verschiedenem Grade, und beruht in der Mehrzahl der Fälle auf dem Gewohnheitsfehler, nur für die Nähe zu accommodiren, woraus die Unfähigkeit entsteht, auch für die Ferne accommodiren zu können. Die Strahlen von entfernten Objecten, welche weniger convergent, fast parallel das Auge treffen, werden bei constanter Accommodation für die Nähe der Art gebrochen, dass sie ein deutliches Bild vor, nicht auf der Netzhaut formen, so dass auf der Netzhaut von den wieder divergirenden Strahlen Zerstreuungskreise entstehen, d. h. mehr weniger undeutliche Bilder der entfernten Objecte oder überhaupt nichts scharf Contourirtes. Nahe Objecte werden dagegen mit einer oft sogar abnormen Schärfe wahrgenommen, weil die Objecte, was besonders bei schwacher Beleuchtung, in der Dämmerung auffällig ist, aus der Nähe mehr Strahlen in's Auge senden und unter grösserem Gesichtswinkel erscheinen. Durch diesen Umstand unterscheidet sich *Myopie* wesentlich von Stumpfsichtigkeit, die auf Functionsverringerung der Retina beruht. Um ausserhalb der myopischen Sehweite liegende Punkte deutlich zu sehen, müssen die störend wirkenden Strahlen benachbarter Objecte, ebenso die durch secundär eingetretene Abflachungen in den Krümmungsoberflächen entstehenden Doppelbilder abgeschnitten werden, zu

welchem Behufe Kurzsichtige beim Scharfsehen die Lidspalte durch Kneifen zu verengern pflegen, wodurch annähernd dasselbe erreicht wird, wie durch den Gebrauch myotischer Brillen. Das Schutzorgan kommt dem fehlerhaften Accommodationsvermögen zu Hülfe.

Ausser der genannten häufigsten Ursache der *Myopie*, dass nämlich die Accommodationsorgane durch Missbrauch nur für die Nähe in Kraft bleiben, kommt es vor, dass das Refraktionsvermögen a priori zu stark ist und zwar entweder wegen zu bedeutender Wölbung der Hornhaut und Linse oder wegen höheren Dichtigkeitsgrades dieser optischen Theile. Kehrt diese zu starke Refraction im mittleren Alter auf die Norm zurück, gelangt sie im höheren unter dieselbe, so verliert sich die *Myopie* für einen Zeitraum von höchstens einem Jahre, worauf dann allmählig *Presbyopie* eintritt. Vollsichtigkeit an und für sich bedingt *Myopie* nicht, an der dann ziemlich alle Kinder leiden müssten. Wohl aber können entzündlicher *Hydrops anterior*, *Keratoconus* und ähnliche Anomalien, welche die Augenaxe über die Norm verlängern, Ursache einer *Myopie* sein, die mit dem Ende dieser Zustände wieder aufhört. Ist *Strabismus converg.* Ursache, so hilft die Operation des *Strabismus* in der Regel auch der *Myopie* ab. Nervöse Leiden werden in seltenen Fällen von *Myopie* begleitet, die sich mit der Wiederkehr der Gesundheit wieder verliert. — In Folge anhaltenden Nahesehens in Dämmerlicht entsteht ausser der *Myopie* zugleich Hyperästhesie oder auch Torpor der Retina, worauf hinsichtlich der Behandlung, die hauptsächlich in angemessenem Gebrauch bestehen muss, Rücksicht zu nehmen ist. *Myopie*, einzig aus Missbrauch von Hohlgläsern oder ausschliesslicher Accommodation für die Nähe entstanden, wird durch Naturheilung nie oder selten beseitigt, selbst nicht bei zunehmenden Jahren. Werden behufs deutlicheren Sehens immer stärkere Concavbrillen nöthig und wirklich gebraucht, so steigert sich die *Myopie* nicht bloss, es können sogar Congestion, Hyperästhesie oder Torpor der Retina, Glaskörperopacitäten u. dgl. folgen. Grosse Schonung der Augen, besonders in der Landluft, und consequentes Zurückgehen zu schwächeren Nummern kann allein hülfreich sein. Besonders wichtig für solche Myopische ist, den Blick auf Abstand zu üben, nicht bloss in der Nähe, sondern auch durch Lesen grober Schrift ohne Brillen und in allmählig grösserer Ferne, zu dessen Erleichterung *Berthold* ein lästiges Instrument mit einem lästigen Namen, *Myopodiorthoticon*, erfand, welches diese Entfernung regulirt. — In die Nothwendigkeit versetzt, Concavbrillen gegen *Myopie* gebrauchen zu müssen, sei man zuerst bedacht, sehr gute Gläser von der Schärfe zu wählen, dass deutliches Sehen möglich ist, sie nur zu gebrauchen, wenn es nothwendig ist, und nicht zu schärferen, sondern, sobald es thunlich ist, zu schwächeren überzugehen. (Siehe Brillen.)

Presbyopia, Weitsichtigkeit,

bezeichnet den der Myopie entgegengesetzten Zustand, bei der der Punkt des deutlichsten Sehens über 12, also 20, sogar 30 und mehr Zoll vom Auge entfernt ist. Meist beiderseits in ziemlich gleichem Grade vorhanden, beruht die *Presbyopia* darauf, dass die Strahlen naher Objecte nicht hinreichend convergiren, um schon auf der Netzhaut ein deutliches Bild zu formen, das erst hinter ihr zu Stande kommen würde. Auf ihr entsteht ein ähnlich undeutliches Bild, wie durch den Zerstreuungskreis, den Myopische bei der Betrachtung ferner Objecte erhalten. Die Ursachen sind denen der *Myopie* entgegengesetzte: *a)* zu geringes Refractionsvermögen des dioptrischen Apparates, *b)* aus einseitigem Gebrauch der Augen für die Ferne entstandene Unfähigkeit, für die Nähe zu accommodiren (deshalb bei Hirten, Jägern, Schiffern etc. häufig), *c)* abnorme Kürze der Augenaxe, wie sie bei Abflachung der Cornea, nach Entfernung der Linse, bei mangelhafter Turgescenz des Bulbusinhaltes vorkommt. Diese verringerte Turgescenz wird besonders im höheren Alter, aber auch nach Consumtionskrankheiten, Verletzungen und in seltenen Fällen plötzlich, über Nacht eintretend, beobachtet. In der Regel tritt die *Presbyopia* aber allmählig auf und zwar wird sie von den Patienten zuerst in der Dämmerung wahrgenommen, weil die fernen Objecte stärker beleuchtet sein müssen, um deutlich gesehen zu werden, und um so weniger intensive Strahlen in das Auge senden, je ferner sie sind. Verminderte Convexität der Linse, die *Catar. incip.* oft begleitet, führt zur *Presbyopia*, weil durch sie die Refractionskraft verringert wird. Alles was lähmend auf den Muskelapparat wirkt, also auch die mydriatischen Mittel, machen weitsichtig, weil bei verringertem Muskeldruck die Pole einander näher rücken, die Axe mithin sich verkürzt. Am häufigsten scheint Verfettung und durch sie bedingte Functionsstörung in dem Accommodationsapparate, als Attribut des Alters, Ursache zu sein. Als Palliativhülfe müssen Convexgläser benutzt werden, um mehr Licht in das Auge zu sammeln und den einfallenden Strahlen eine grössere Convergenz zu geben, doch gebrauche man sie nur beim Sehen in der Nähe. Uebrigens sind spirituöse Einreibungen, Schonung und vorsichtige Uebungen im Nahesehen zu empfehlen.

Diplopia, Doppelsehen,

kommt aus sehr verschiedenen Ursachen zu Stande, sowohl beim Sehen mit beiden Augen, *Dipl. biocularis*, als auch beim Sehen mit einem Auge, *Dipl. monocularis*.

a. Diplopia biocularis ist die häufigere Form und beruht darauf, dass die Objectbilder nicht auf identischen Netzhautstellen entstehen, weil die Sehaxen sich nicht auf dem Object-

punkte kreuzen. Demnach müsste Doppelsehen stets bei *Strabismus* vorkommen, was aber nicht geschieht, da zum Doppelsehen erforderlich ist: 1) dass beide Augen ziemlich dieselbe Sehkraft haben; 2) dass Patient gewohnt sei, die Bilder beider Netzhäute zu percipiren und 3) dass die Abweichung der Axenrichtung von der Norm nur eine sehr geringe sei, indem das in einem starkschielenden Auge entstehende Bild auf einer Netzhautstelle von zu geringer Empfänglichkeit entsteht, als dass es deutlich und wahrnehmbar sein könnte. Günstig ausgefallene Schieloperationen erzeugen deshalb oft ein vorübergehendes Doppelsehen. — In anderen Fällen erscheint die Richtung der Axen auf das Object normal und es wird doch doppelt gesehen. Der Grund liegt dann darin, dass wegen überwiegender Thätigkeit eines der schiefen Muskeln, gewöhnlich des *m. obliq. sup.*, der eine Bulbus um die Sehaxe rotirt ist, die Meridiane beider Bulbi also nicht mehr einander parallel liegen. Auch hierdurch müssen Bilder auf Stellen entstehen, die für gewöhnlich nicht identische sind. Das Identitätsverhältniss in verschiedenen Stellen beider Netzhäute muss aber der durch Gewohnheit ausgebildeten Urtheilskraft als ihrer fortwirkenden Ursache zugeschrieben werden.

Je nach der Dauer dieser Anomalieen der Axen ist das Doppelsehen mit beiden Augen ein dauerndes oder vorübergehendes, oft nur momentanes. Bei rheumatischer Augenmuskelaffectio pflegt es als erstes und lästigstes Symptom von den Patienten bezeichnet zu werden. Da selten beide Augen gleiche Schärfe haben, erscheint das zweite Bild meistens undeutlicher. Das rechts erscheinende Bild gehört dem linken Auge an, das links erscheinende dem rechten.

b. *Diplopia monocularis*, doppeltes und mehrfaches Sehen mit einem Auge, wird durch Facettirung oder difforme Bildung der Krümmungsoberflächen der Cornea und Linse bewirkt, so bei Geschwürsfacetten, bei *Keratoconus* etc. Ebenso sollen solche Opacitäten in den dioptrischen Organen, welche den Lichtkegel spalten und zur Entstehung von zwei oder mehreren Lichtkegeln, deren bildformende Spitze auf die Retina fällt, zur *Diplopia monocularis* Veranlassung geben können. Luxation der gesunden Linse, *Cataracta incipiens*, Cornealneoplasieen (auch die doppelte Pupille, und zwar analog dem Scheiner'schen Experimente) werden in dieser Hinsicht genannt.

Beseitigung der Ursache des Doppelsehens beseitigt stets sofort das Uebel selbst. War es durch Verkrümmung einer Linsenfläche nach zu angestrengtem Sehen entstanden, so verschwindet es bei absoluter Schonung der Augen in Monaten. Bei gleichzeitig vorhandener *Myopie* kann man die Heilung durch fortgehend schwächere Concavgläser unterstützen (*Szokalski*). — *Fick* in Zürich hat neuerdings die Erscheinung des einäugigen Doppelsehens aus Diskontinuität der Zerstreuungs-

bilder zu erklären gesucht, deren hauptsächlichsten Grund er in der ungleichmässigen Vertheilung der Thränenflüssigkeit auf der vorderen Hornhautfläche findet, ohne indess auch anderweite kleine Unregelmässigkeiten (Höckerchen oder Vertiefungen) von stabilerer Natur in der Hornhaut oder anderen brechenden Flächen als Ursachen zur Hervorbringung dieser Erscheinung in Abrede zu stellen. — In einem Falle, wo durch Jahre lang fortgesetzte Helligkeitsbestimmungen auf dem zu diesen beschwerlichen Untersuchungen benutzten Auge Doppelsehen eintrat, schien sie einer Beeinträchtigung der übrigens normalen vordern Krümmungsoberfläche der Linse zugeschrieben werden zu müssen. Die Erscheinung verschwand nach mehrmonatlicher Schonung des Gesichts bei der Befolgung allgemeiner Gesundheitsvorschriften. — *Stellwag von Carion* will diese Diplopie aus doppeltbrechenden Eigenschaften herleiten, die er dem durch die Adaptionsanstrengung einseitig gedrückten Glaskörper zuschreibt.

Hydrophthalmus bulbi s. universalis,

Wassersucht des ganzen Bulbus ist die Vereinigung des *Hydr. ant. u. post.* Die Volumenzunahme des Bulbus drängt denselben aus der Orbita hervor, worauf er, weil die Thränen-drüse nicht mehr absondert, der Lidschlag die Feuchtigkeiten auch nicht mehr vertheilt, bald unter fortschreitender Degeneration der Bindehaut sich entzündet, vereitert und gänzlich zerstört wird, wenn man nicht durch theilweise Entleerung und Antiphlogose diesem Ausgange zuvorkommt.

Cancer bulbi, Krebs des Auges,

in der Mehrzahl der Fälle Markschwamm und häufig melanotisch, beginnt entweder in den inneren oder in den äusseren Theilen und äussert sich demgemäss verschieden. Geht er von der Orbita aus, so fehlen die charakteristischen lancinirende Stiche nicht; zu ihnen gesellt sich Schwere, Spannung in der Tiefe, bis endlich der Bulbus hervorgetrieben wird und exophthalmisch entartet. Die intraoculäre Form entsteht meist im Retinal- und Choroidealgewebe primär (seltner in der Iris, dem N. opticus oder dem Corp. ciliare), wo sie intumescirt und von Gefässen durchzogen entweder in das Corp. vitreum verdrängt, Linse und Iris dislocirt und zur Berstung des Bulbus führt oder mehr nach der Orbita hin sich entwickelt, dieselbe durchbohrt und durch Zerstörung des Gehirns lethalen Ausgang bewirkt, wenn derselbe nicht durch Localisation des Krebses in einem andern edlen Organe früher erfolgte. Ueber zwei Jahre nach Beginn der Krankheit bleiben die Patienten selten am Leben.

Vorwiegend werden Kinder ergriffen, nach *Lebert* in $\frac{1}{3}$ der von ihm constatirten Fälle; nach dem 35. Lebensjahre localisirt sich der Krebs nur in $\frac{4}{9}$ der Fälle im Auge und zwar

kommt bei Kindern nur Markschwamm vor, nur bei älteren Individuen pigmentirter Krebs. Höchst selten wird die medullare Masse in die Knochensubstanz eingelagert beobachtet (bösesartiges Ostoid).

Temporäre Hülfe ist bei Pigmentkrebs von der Exstirpation zu erwarten, die nur ausnahmsweise partiell sein darf. Recidive zu verhüten, ist es gerathener, den ganzen Bulbus sofort zu entfernen, oft zugleich auch Lider, Thränendrüse etc., was von der Ausbreitung des Krebses abhängt. Kehrt das Uebel nicht wieder, so ist mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen, dass eine gutartige melanotische Geschwulst und nicht Krebs vorhanden war. — Den intraoculären Markschwamm betrachtet man mit Recht als ein *Noli me tangere*.

Laesiones bulbi, Bulbusverletzungen,

erfordern stets die grösste Achtsamkeit, da selbst scheinbar geringe Insulte Erblindung und Atrophie nach sich ziehen können, besonders wenn ein fremdes Körperchen zurückbleibt. Gesunde Augen überstehen eine einmalige bedeutende Verletzung im Allgemeinen besser, als wiederholte geringfügigere, welchen Umstand *v. Gräfe* jun. mit Recht bei operativen Unternehmungen verwerthet wissen will. — Eindringende feste Körper, auch heftige Erschütterungen können Fracturen und Fisturen der Orbita bewirken, deren Erkenntniss um so schwerer ist, als die Theile der Untersuchung unzugänglich sind und selten Crepitation vorhanden ist. Später eintretende Ecchymosen leiten oft zuerst auf die richtige Diagnose. — Ist Reposition der Fragmente möglich, so muss dieselbe sofort vorgenommen, Ruhe und ernstliche Antiphlogose verordnet und Eiter baldigst entleert werden. Ebenso wenig dürfen Splitter und fremde Körper liegen bleiben. Wird der Opticus zerstört, so hört seine Leitungsfähigkeit auf und Blindheit erfolgt. In *Larrey's* vielfach citirtem Falle war eine Rappirspitze tief durch die rechte Orbita bis über die verletzte äussere Wurzel des rechten Optic. in die linke Hemisphäre eingedrungen und hatte *Hemiopie* zur Folge, die bis zu dem nach drei Monaten erfolgenden Tode andauerte. Verlust einer Partie des Glaskörpers bewirkt erfahrungsgemäss nicht immer Störungen des Sehevermögens. Commotion der Retina hat meistens, doch nicht immer, bleibende *Anästhesie* zur Folge.

Therapeutisch ist strengste Antiphlogose, stetes Reinhalten und absolute Ruhe des Bulbus erforderlich. Klaffende Wunden, sowohl in den Lidern als in der Bulbushülse müssen sofort geschlossen werden. — Wird das verletzte Auge atrophisch, so muss auf die Erhaltung des anderen um so grössere Vorsicht gewandt werden, als dasselbe spontaner Erkrankung in höherem Grade aus noch nicht hinreichend erforschten Ursachen ausgesetzt bleibt.

Panophthalmitis, Gesammtentzündung des Auges (Phlegmone oculi),

erstreckt sich auch über die Schutzorgane, welche stark schwellen und die *Inspectio bulbi* erschweren. Verletzungen sind seltner Ursache, als eine Specialentzündung (*Conjunctivitis, Iritis, Choroiditis*), die durch entzündliche, starkprominente *Chemosis*, hochgradigen Schmerz, Pupillengerade, Verfärbung der Iris, Verdunkelung der Cornea und Eiter- oder Lymphergüsse in den Kammerraum den begonnenen Uebergang zur *Panophthalmitis* bezeichnet. Unter Thränenschiessen, Photopsie, heftigem Kopfschmerz, Fieber, Convulsionen und Delirien vergrößert sich der Bulbus, so dass er die Orbita, deren Zellgewebespelster selbst entzündlich intumescirt ist, verlassen muss und vortritt (*Exophthalmia*). Unter Zutritt weitverbreiteten Oedems platzt gewöhnlich die Cornea (*Rhexis bulbi*), der Eiter ergiesst sich nach Aussen, worauf die Erscheinungen nachlassen und Atrophie erfolgt. Verloren ist das Auge indess auch ohne *Rhexis*, indem der Bulbus mit der Resorption des Eiters collabirt. Bei acutem Verlaufe ist sehr energische Antiphlogose, wiederholtes Aderlassen, Blutegel, Eis, Laxanz, am besten Calomel (gr. 2 mit $\frac{1}{3}$ gr. Opium) erforderlich. Sehr günstig wirkt schon im Beginn Paracentesis, um die Entzündung zu mässigen, später baut man durch sie nur den spontanen Perforationen vor. Vollständige Zertheilung gelingt selten, häufiger hat man *Rhexis* oder *Gangraena oculi*, sogar Tod durch *Meningitis* folgen sehen. Noch vor Ablauf des Processes kann man bedacht sein, durch Excision und theilweise Entleerung einen für ein künstliches Auge günstigen Stumpf zu erzielen. — Diese Indication entsteht z. B. wenn durch die noch ungetrübte Linse in den Glaskörper ergossener Eiter grünlich hervorschimmert.

Atrophia s. Phthisis bulbi, Augapfelschwund,

als Endpunkt vieler zerstörender Krankheitsprocesse am Auge, besonders der *Panophthalmitis*, ist der Zustand des Bulbus, in welchem er, der Sehkraft beraubt, verschrumpft, verkleinert, fester oder weicher als normal, nur noch als unbrauchbares, entstellendes Rudiment vom Organismus ernährt wird, als dessen schönste Zierde er früher dem edelsten Sinne vorstand. Die Scleroticalhülle, dessen dioptrische und katoptrische Theile das Individuum als Angehörigen der Aussenwelt sich erkennen liessen, ist des aus den zartesten Gebilden geformten optischen Apparates beraubt, sie hat ihre Kugelgestalt verloren und liegt tief in der Augenhöhle, von den Augenmuskeln, wie von roher Elementarkraft, zu einer unförmlichen Masse eingedrückt. Meist sind an dem seines kunstreichen Inhalts beraubten Stumpfe die Furchen, in welche sich nun die Muskeln einsenken konnten,

deutlich wahrnehmbar. Die einzelnen Organe haben Eiter- und Blutresten, Körnchenzellen und Narbengewebe Platz gemacht oder sie sind verschiedentlich entartet, der *nerv. optic.* dünn, schlaff, missfarbig, die Choroidea der Gefässe und des Pigmentes beraubt, oft mit Knochenplättchen (mit wirklichen Knochenkörperchen) belegt, die Retina erweicht oder verdickt, Glaskörper und Linse defect und trübe, im Glaskörper wohl cavernöse Concremente, die Cornea faltig, grau; nur die Linsenkapsel findet sich oft noch durchsichtig. Und vor dem zerstörten Augapfel, über dessen Wölbung sie früher sich hoben und senkten, bleiben auch die Lider unthätig; oft hängt das obere über das untere schlaff nieder; häufiger zeigt es die Zerstörung, indem es verschrumpft, sich nach Innen einzieht und die Entstellung noch vermehrt. Sank der Bulbus schon in der Kindheit zusammen, also bevor die Schädelknochen ausgewachsen waren, so wird, wie überhaupt die Weichtheile gestaltend auf die harten Theile wirken, die Augenhöhle nicht zu der Ausdehnung erweitert, durch welche sich der schöne von dem unschönen Schädel unterscheidet.

Aber nicht, weil nun für die Entwicklung der vordern Hirnlappen mehr Raum bleibt, steigern sich die übrigen Sinne früh Erblindeter zu höherer Fähigkeit, wie *Ruete* meint, sondern weil das materielle Substrat, welches bei gesundem Gesicht von dem Gesichtsansatz verbraucht wird, bei Defect des Gesichtes und des Gesichtesorgans nun den übrigen Sinnesorganen und dem Gehirn, als dem geistig mit den Sinneswahrnehmungen vermittelndem Organe, zu Gute kommt.

Die Aufgabe des Arztes ist eine zwiefache, eine wissenschaftliche, er hat antiphlogistisch gegen Congestion, Entzündung, Eiterung, Gangrän u. s. f. zu wirken, um Fortgang der Zerstörung zu verhüten und um den Schwund dahin zu beschränken, dass das frühere schöne Auge wenigstens ein günstiger Stumpf, ein passendes Polster werde zur Ermöglichung der zweiten, der künstlerischen Aufgabe, nämlich eine Boissonneau'sche Augenscheibe vorzusetzen und, nachdem das Wesen verloren ist, den — Schein zu retten.

OPERATIONSLEHRE.

Zu der Lehre von den Augenoperationen gehören sowohl diejenigen Eingriffe, deren Zweck Heilung ist, als auch diejenigen Manipulationen und Thätigkeiten, welche zum Behufe genauer Diagnostik vorgenommen werden. Das auf die Untersuchung kranker Augen Bezügliche ist im Allgemeinen bereits in der Einleitung gesagt, so dass hier nur übrig ist, von den einzelnen physicalischen Experimenten und den Apparaten zu reden, die für bestimmte diagnostische, theilweise auch therapeutische Zwecke in Anwendung kommen.

Physicalischer Theil.

Die Loupe.

Die Loupe ist für den Augenarzt eines der unentbehrlichsten Instrumente, da selbst für scharfsehende und wohlgeübte Augen die genaue Wahrnehmung kleiner fremder Körper und einer grossen Zahl von Alienationen an den vorderen Augentheilen mit Schwierigkeiten verbunden ist, die nur durch Benutzung der Loupe vermieden werden. In einem einfenstrigen Zimmer wird der Patient so gestellt, dass das Licht über die Nase in das zu untersuchende Auge fällt, der Arzt tritt von der Seite dieses Auges halb vor den Patienten und bringt mit dem Daumen und Zeigefinger der gleichnamigen Hand die Loupe in die entsprechende Nähe des Auges, indem er die übrigen Finger auf die Wange legt und nöthigenfalls das Unterlid mit dem Mittelfinger abzieht. Die andere Hand, die auf die Stirn des Kranken gelegt wird, dient hauptsächlich dazu, den Kopf zu fixiren; der kleine Finger liegt dabei zuhöchst, der Daumen auf dem Oberlide, das er vorsichtig fixirt oder auch, wenn es erforderlich ist, nach Oben verschiebt. Währt die Untersuchung länger als den Zeitraum zwischen zwei Lidschlägen, so versäume man nicht, das Lid von Zeit zu Zeit über den Bulbus zu führen, um ihn feucht zu erhalten. Das Trockenwerden des Auges würde einen die Untersuchung störenden Reiz herbeiführen, der auch durch zu kräftiges Aufsetzen des Daumens

hervorgerufen werden kann. Der zeitweilige Verschluss des Auges ist auch besonders bei Irisuntersuchungen erforderlich, um die Contractilität derselben beurtheilen zu können. — Behufs Auslösung kleiner, festsitzender Splitter, Auspinselung von Staub und ähnlicher Verrichtungen, zu deren Ausführung man eine Hand frei haben muss, habe ich mir eine Augenloupe in eine Art Brillengestell fassen lassen und kann so bequem mit den Fingern der einen Hand die Lider fixiren, während die andere Hand das Instrument scharf auf den Punkt führt, den das bewaffnete Auge sicher als den geeignetsten Angriffspunkt erkennt.

Vor den gewöhnlichen Loupen hat die Brücke'sche Augenloupe den Vorzug, dass der Kopf des Beobachters von dem kranken Auge soweit entfernt bleiben kann, dass Beschattung desselben unmöglich ist. Sie ist nach der Theorie des Galilei'schen Fernrohrs construirt und vergrössert um so mehr, je weiter das Ocular vorgezogen ist, doch wird das Sehfeld und der Objectivabstand bei dem Vorziehen des Oculars kleiner.

Von dem Bryson'schen Polariskop, das zur Untersuchung der Hornhaut angegeben ist, sagt *Ruete*: in einem Rohre hinter einer Linse von grosser Brennweite ist ein Nicol'sches Prisma angebracht, welches um seine Axe drehbar ist, um der veränderlichen Ebene des von der Hornhaut polarisirten Lichtstrahles folgen zu können. Der Umstand, dass der Glanz der Oberfläche gänzlich beseitigt ist, setzt den Augenarzt in den Stand, das kleinste fremdartige Körperchen auf der Hornhaut mit Leichtigkeit wahrzunehmen.

Das Purkinje-Sanson'sche Experiment.

Das Purkinje-Sanson'sche Experiment besteht in der Beobachtung des von einem vor das Auge gehaltenen Lichte entstehenden Reflexes in diesem Auge. Derselbe ist ein dreifacher. Das erste oberflächliche und sehr deutliche Reflexbild entsteht auf der als Convexspiegel wirkenden Hornhaut, das zweite, dessen Wahrnehmung die meiste Schwierigkeit macht, auf der ebenfalls als Convexspiegel wirkenden vorderen Kapselwand. Beide Reflexe sind aufrechtstehende Spiegelbilder der vor das Auge gehaltenen Kerzenflamme. Das zweite ist bei gesundem Linsensystem schwer zu sehen, weil es von der Spiegelfläche in grössere Tiefe projecirt und nicht als leuchtendes, sondern nur als schwach gelb gefärbtes Bild mit sehr undeutlichen Contouren erscheint. Der dritte Reflex, welcher heller und scharf contourirt ist, entsteht auf der hinteren Kapselwand, die als Concavspiegel wirkt und deshalb das Bild verkleinert und verkehrt stehend zeigt. Um die drei Reflexe bald zu finden, ist es zweckmässig, die Kerzenflamme hin und her und auf- und abzubewegen. Dabei folgen die beiden ersten

Reflexe der Kerze, während der dritte im Concavspiegel entstehende Reflex die entgegengesetzte Bewegung macht,

Der Werth des Experimentes für die Diagnostik ist vielfältig ebenso überschätzt, als unterschätzt worden, und wenn es gegenwärtig seltner in Anwendung gebracht wird, so liegt der Grund weniger darin, dass es durch weitere Cultivirung nicht noch nutzbarer gemacht werden könnte, als darin, dass der Augenspiegel auf leichtere Weise zu zuverlässigeren Resultaten führt.

Von unläugbarem Werthe ist das Experiment, wenn Verdacht auf Linsendefect vorhanden ist, indem in diesem Falle die beiden hinteren Reflexe nicht entstehen. Dasselbe ist der Fall, wenn Exsudate vor der vorderen Kapsel abgelagert sind, die, im Fall sie pigmentirt sind, mit blossem Auge oft schwer erkannt werden. *Cataracta nigra* lässt nur das Entstehen der Bilder aus den beiden Convexspiegeln zu. Das dritte Bild wird auch dann nicht entstehen, wenn die hinteren Linsenschichten getrübt sind. Bei Opacitäten, die ausschliesslich dem Glaskörper angehören, werden dagegen alle drei Reflexe sichtbar. *Catar. incip.* wird weit sicherer durch entoptische Untersuchung und den Augenspiegel diagnosticirt. — Der Fall, dass vollkommen schwarze Iris auf Irideremia fälschlich schliessen lassen könnte und dass hier das in Rede stehende Experiment Aufschluss geben würde, wie *Ruete* meint, dürfte nur sehr selten vorkommen. Bei Pigmentflecken, die schon häufig das Vorhandensein mehrerer Pupillen fürchten liessen, entscheidet der Augenspiegel sofort.

Was den *Cramer'schen* Beweis betrifft, dass bei der Accommodation die vordere Linsenfläche ihre Form verändere, so erfordert die Gerechtigkeit zu erklären, dass *Langenbeck* schon im Jahre 1849 diese Thatsache seinen Beobachtungen gemäss behauptet hatte und dass *Donders* derselben Ansicht war und von einer weiteren Untersuchung dieses Gegenstandes erhebliche Resultate erwartete. *Cramer's* Methode, um den fraglichen Gegenstand mit zweifelloser Richtigkeit zu beweisen, ist folgende.

Erstens lässt er das Licht von der einen Seite einfallen und beobachtet die von der Hornhaut, der Vorder- und Hinterfläche der Linse zurückgeworfenen Bilder auf die gewöhnliche Weise von der anderen Seite. Am Rande der Pupillarfläche sieht man nun das von der Cornea zurückgeworfene Bild (Fig. I, a); meistens ungefähr in der Mitte derselben Fläche das tiefliegende von der Vorderfläche der Linse zurückgestrahlte (I, b); an der *a* gegenüberliegenden Seite das auf der Hinterfläche der Linse oder auf der Vorderfläche des Glaskörpers entstandene umgekehrte kleine Bildchen *c*. Zum Wahrnehmen der Veränderungen im Stande dieser Bildchen bei der Accommodation ist es erforderlich, dass die Richtung der Gesichtsaxe dieselbe bleibt



und dass das Licht in dem beobachteten Auge unverändert denselben Platz behält, während es dagegen wünschenswerth ist, dass das beobachtende Auge die Bilder vergrößert sieht. Um diese Bedingungen zu erfüllen, construirte *Cramer* ein Instrument, dem er den Namen Ophthalmoscop gab. Die wesentlichen Bestandtheile desselben sind:

- 1) eine kurze kegelförmige Büchse mit zwei Seitenöffnungen, an dessen breites Ende das zu beobachtende Auge gebracht wird;
- 2) eine Flamme mit einem Diaphragma, die ihr eine bestimmte Form gibt und durch eine der genannten Seitenöffnungen Licht in das zu beobachtende Auge wirft;
- 3) ein bewegliches Mikroskop, welches auf die zweite Seitenöffnung gerichtet ist und durch welches das beobachtende Auge die Reflexbilder wahrnimmt.

Man lässt nun das zu beobachtende Auge sich für den Kreuzungspunkt zweier ganz in der Nähe ausgespannter Fäden accommodiren und sieht die Bilder *b'* und *c* (projicirt auf eine

Fig. I.

Fig. II.



Fläche, die lothrecht auf der Gesichtsaxe des beobachtenden Auges steht) fast unmittelbar bei einander (cfr. Fig. II). Lässt man nun aber in derselben Richtung über die Fäden hinaus¹⁾ in die Ferne sehen, dann entfernt sich das Bild *b* von *c* und stellt sich fast mitten zwischen *a* und *c* (cfr. Fig. I), während *a* und *c* unverändert ihren Platz behalten. Bei dieser Platzveränderung wird das Bild *b* zugleich grösser und matter. Die Accommodation für die Nähe bringt es sofort wieder nahe bei *c* und macht es zugleich wieder kleiner und heller.

¹⁾ Man ist auf diese Weise niemals sicher, vollkommen dieselbe Richtung zu erhalten, weil bei dem Sehen auf grösseren Abstand das Fadenkreuz sich mehrfach darstellt (polyopia monocularis). Für scharfe Messungen wird es deshalb nöthig sein, erst durch eine kleine, mitten vor die Pupille gehaltene Oeffnung zu sehen, um das Fadenkreuz und einen entfernteren Punkt in entsprechende Lage zu bringen und nun abwechselnd das Kreuz und den Punkt zu fixiren.

Cramer stellte diese Beobachtungen bei 20maliger und selbst bei 10maliger Vergrößerung an.

Donders, der Gelegenheit hatte, ein von Mechanicus *Epkens* in Amsterdam verfertigtes *Cramer'sches* Ophthalmoscop zu untersuchen, fand es in mehrfacher Hinsicht unpraktisch. Er liess mit seinem von *Epkens* ausgeführten Augenspiegel ein Ophthalmoscop in Verbindung bringen, vermittelst dessen nicht allein die Wahrnehmung der von *Cramer* angeführten Erscheinungen keine Schwierigkeit hat, sondern auch solche Messungen bewerkstelligt werden können, als nöthig sind, um zu berechnen, um wieviel die Vorderfläche der Linse nach Vorn getreten ist. Wer im Besitz des genannten Augenspiegels ist, kann dieses zweite Instrument für einen sehr geringen Preis an demselben anbringen lassen, während das *Cramer'sche* 56 Gulden kostet und ohne Zweifel viel unvollkommener ist.


Es ist bekannt, dass ein hohlerer Spiegel ein kleineres Bild gibt und dass deshalb die Veränderung in der Form und Helligkeit bei der Accommodation für ein nahes Object auf eine stärkere Wölbung der vorderen Linsenfläche hinweist. Die Beobachtungen liessen bezüglich der Verkleinerung des Bildes keinen Zweifel übrig und *Donders* legte darauf deshalb grossen Werth, weil daraus eine verstärkte Wölbung offenbar bewiesen ist. Die Lageveränderung des Bildes ist bei dieser Beobachtung aber noch mehr für die Messung zugänglich, als die Veränderung hinsichtlich der Grösse des Bildes. Die Lageveränderung an und für sich selbst gibt uns wohl nicht das Recht, auf eine veränderte Wölbung der vorderen Linsenfläche zu schliessen, aber sie weist doch unwiderleglich nach, dass die vordere Linsenfläche nach Vorn getreten ist, sei es nun durch stärkere Wölbung oder durch Verschiebung der ganzen Linse.

In Bezug auf diesen Punkt kommt es ganz besonders auf deutliche und strenge Beweisführung an. Man sieht bald ein, dass die Lageveränderung des Reflexbildes in einer veränderten Form oder Lage der reflectirenden Fläche begründet ist, aber es bedarf der Erklärung, dass und wesshalb die bei der Accommodation für die Nähe wahrgenommene Lageveränderung des Bildes *b* nach *a* hin eine Vorwärtsbewegung der reflectirenden Oberfläche anzeigt. Diese nähere Entwicklung soll hier folgen.

Wenn sich in *L* (Fig. III) ein leuchtender Punkt befindet, dann müssen die bei 1 auf der Cornea in derselben Fläche, unter gleichem Winkel mit der Gesichtsaxe *GA* reflectirten Strahlen das in *O* befindliche Auge erreichen, das Reflexbild muss also in der Richtung *O1*, auf die Pupillarfläche *PV* projecirt, als *a* gesehen werden. Von demselben leuchtenden Punkte *L* müssen auch die bei 2 von der vorderen Linsenfläche zurückgeworfenen Strahlen das Auge *O* erreichen und sich in

der Richtung $O2$ als b darstellen. Endlich müssen die von L kommenden und von der hinteren Linsenfläche bei 3 zurückgeworfenen Strahlen in der Richtung $O3$ das Auge erreichen

Fig. III.



und in c wahrgenommen werden. Auf diese Weise sieht man die Bilder als $a b c$ in der Pupillarfläche (cfr. Fig. 1). Tritt nun die Vorderfläche der Linse bei der Accommodation für die Nähe bis nach $2'$ vorwärts, dann werden auch die bei $2'$ zurückgeworfenen Strahlen O erreichen und das Reflexbild wird nicht mehr in b , sondern in der Richtung $O2'$ in b' wahrgenommen, — also bei der Vorwärtsbewegung der vorderen Linsenoberfläche näher bei a . Wir haben hierbei vorausgesetzt, dass das Licht in demselben Winkel mit der Gesichtsaxe einfällt, in welchem das Auge das reflectirte Licht wahrnimmt, — eine Voraussetzung, die *Cramer* in seiner Untersuchung versäumt hat. *Donders* behauptet, dass sein mit dem Augenspiegel verbundenes Werkzeug Gelegenheit gebe, beide Winkel genau zu bestimmen und also gleich zu stellen. In dieser Art also kann man die Lageveränderung wahrnehmen, ebenwohl ganz so, wie *Cramer*¹⁾ es will. Seine Annahme, dass die vordere

¹⁾ Der Stand der Bilder ist bei der Beobachtung unter gleichen Winkeln (c. 35°) und bei verschiedenen Objecten nicht ganz derselbe. Zuweilen ist er, wie in Fig. I und II, wo er der in Fig. III entspricht. Nicht selten ist er, wie bei *Cramer* (Fig. 7 u. 8), der Art, dass b im Zustande der Ruhe nahe bei c steht und bei der Accommodation für die Nähe ungefähr in die Mitte zwischen a und c rückt. Bei diesem Stande liegt die vordere Linsenfläche sicher weiter vor der Cornea, als in Fig. I und II, — ein Ab-

Linsenfläche bei der Accommodation für die Nähe nach Vorn trete, war also wohlbegründet. Wir dürfen aber nicht versäumen, daran zu erinnern, dass bei unserer Beweisführung der Einfluss der Cornea unberücksichtigt geblieben ist, da die Strahlen nicht in dem Krümmungsradius durch diese Membran treten, eine für die einfallenden und ausfallenden Strahlen gleiche Abweichung zur Folge hat, und wohl eine grössere, wenn die Vorderfläche der Linse der Cornea näher gerückt ist. Daraus geht aber nur hervor, dass die Lageveränderung grösser erscheint (bei Vergl. von Fig. I und II), als sie wirklich ist (Fig. III von b zu b'), aber nicht, dass sie in anderer Weise statthat. Die Thatsache bleibt also mit derselben Sicherheit bewiesen.

Die Oeconomie dieses Werkes erlaubt nicht, auf die weiteren Details dieser äusserst wichtigen Untersuchungen einzugehen, wesshalb einfach auf meine Bearbeitung der beiden holländischen Schriften verwiesen wird. (Das Accommodationsvermögen der Augen etc. Lahr, J. H. Geiger (M. Schauenburg) 1854. p. 14 et seq.)

Entoptik.

Die Platten zu entoptischen Untersuchungen können durch Kartenblätter mit nadelstichfeinen Oeffnungen ersetzt werden, bestehen aber passender aus in der Mitte dünn-geschlagenem, geschwärztem und entsprechend perforirtem Messingblech und dienen dazu, um das Vorhandensein und die Vertheilung etwaiger Binnenkörperchen des Auges darzuthun. Man hält die Platte zu dem Zwecke möglichst nahe vor das Auge, welches auf eine helle Fläche, am besten auf den weissbewölkten Himmel gerichtet ist, und erblickt ein fast kreisrundes Gesichtsfeld, in welchem sich die Binnenkörperchen durch dunkle Stellen von entsprechender Form und Intensität markiren. Der optische Vorgang ist folgender. Durch die Oeffnung treten von allen Seiten her Lichtstrahlen und gelangen so zum Auge, als ob sie von der Oeffnung in derselben ihren Ursprung nähmen, d. h. so, als ob die Oeffnung ein leuchtender Punkt wäre. Die Lage der Oeffnung kann eine dreifache sein, entweder befindet sie sich im vorderen Brennpunkte des Auges oder vor oder hinter demselben. Im ersten Falle gehen die Strahlen nach dem Durchgang durch die Linse parallel unter sich zur Netzhaut fort und erhellen daher dort einen Kreis von der Grösse der Pupille. Nur die Binnen-

stand, der sich nach Donders Beobachtungsmethode ohne Schwierigkeit berechnen lässt. Soviel scheint klar, dass die Lageveränderung von b keineswegs der Verschiedenheit der Accommodation und der Grösseveränderung des Bildes entspricht, so dass es höchst wahrscheinlich ist, dass die Linse unter gewissen Umständen nach Hinten ausweicht. Der Untersuchung bietet sich hier noch ein weites Feld.

körperchen halten die Strahlen auf und lassen Schattenpartien auf der Netzhaut entstehen, die daselbst, wie Bilder in dem s. g. Schattenspiel als Schatten empfunden und wahrgenommen werden. Der helle Kreis auf der Netzhaut erscheint in der Wahrnehmung als das erwähnte Gesichtsfeld, die dunklen Stellen in derselben repräsentiren die Projectionen der Binnenkörperchen und lassen also durch ihre Lage und Entfernung von der Mitte deren Richtung und Entfernung von der Augenaxe erkennen. Nur hat man zu beachten, dass bei der subjectiven Projection des Netzhautindrucks nach Aussen die rechts und die oben im Netzhautfelde liegenden Stellen im objectiven Sehfelde resp. links und unten und umgekehrt erscheinen, dass also eine dunkle Stelle über der Mitte des Sehfeldes auf ein Binnenkörperchen ebensoweit unter der Augenaxe deutet etc.

Befindet sich die Oeffnung vor dem Brennpunkte, so convergiren die Strahlen nach dem Durchgang durch die Linse gegen einen Punkt hinter der Netzhaut und erhellen somit einen Kreis auf der letzteren, dessen Grösse von der Gestalt der Pupille abhängig, aber um so kleiner als die Pupille wird, je stärker die Convergenz ist, also je weiter die Oeffnung der Platte vor dem Augenbrennpunkte liegt. Die Schatten der Binnenkörperchen treten dann natürlich auch in demselben Verhältniss der Mitte der Scheibe näher und lassen demnach, als dunkle Stellen im Gesichtsfelde gesehen, wiederum ihre Lage gegen die Augenaxe erkennen.

Befindet sich endlich die Oeffnung hinter dem Brennpunkte des Auges, so divergiren die Strahlen nach dem Durchgange durch die Linse gegen die Netzhaut; der erhellte Kreis ist grösser, als die Pupille, und die Schatten der Binnenkörperchen erscheinen in eben dem Masse von der Mitte weiter entfernt. Jedenfalls erblickt man also ein naturgrosses, resp. ein verkleinertes oder ein vergrössertes Bild der Pupillaröffnung und die orthogenalen Projectionen der Binnenkörperchen auf der Pupillarebene. Der Grad der Dunkelheit der dunklen Stellen gibt den Grad der Undurchsichtigkeit der Binnenkörperchen zu erkennen.

Es wurde hierbei vorausgesetzt, die Oeffnung der Platte werde mitten vor die Pupille gehalten, so dass die Mitte des Gesichtsfeldes der Augenaxe entspricht. Die Entfernung der dunklen Stellen von der Mitte lässt dann auf die Entfernung der Körperchen von jener Axe schliessen. Wie tief dieselben aber im Auge liegen, wird dadurch nicht erkannt.

Man erhält indess auch über diesen Punkt Aufschluss, wenn man die Platte etwas seitwärts verschiebt, insofern dann der auf der Netzhaut sich bildende helle Kreis seitlich auf dieselbe fällt und eine schiefe Projection der Pupille mit den ebenso schief projecirten Binnenkörperchen darstellt. Die Schiefe


der Projection wird bestimmt durch die von der Oeffnung der Platte nach dem Kreuzungspunkte gehenden Graden. Damit ist das Mittel gegeben, die Tiefe der Körperchen zu bestimmen, indem man die neue Vertheilung der dunklen Stellen mit der bei der ersten Plattenstellung vergleicht. Am bequemsten aber kommt man zum Ziele, wenn man sich nach der modificirten *Brewster'schen* Methode einer Platte mit zwei $1\frac{1}{2}$ mm von einander befindlichen Oeffnungen von $\frac{1}{10}$ mm Durchmesser bedient.

Man erhält dann zwei schiefe Projectionen der Pupille und der opaken Körperchen.

Es ist zunächst klar, dass ein Körperchen, welches in der Mitte der Pupille liegt, in beiden Sehfeldern in der Mitte zu liegen kommen wird. Ist das nicht der Fall, so verschafft man sich Kenntniss davon, ob ein solches nah oder fern, vor oder hinter der Pupillarebene liegt, wenn man die Platte so in ihrer Ebene dreht, dass beide Schatten desselben Körperchens mit den Centren der beiden Sehfelder in einerlei Geraden zu liegen kommen, und darnach folgende Construction macht: Sind *A* und *B*

die Sehfelder, *a* und *b* deren Centren, *abc* ein beliebiges über *ab* beschriebenes gleichschenkliges Dreieck; ist ferner *de* eine durch *c* gezogene mit *ab* gezogene parallele Gerade, *mn* ein Perpendikel auf *de* und sind *f* und *g* die beiden Schatten des Binnenkörperchens, so ziehe man *gh* $\parallel$ *bc*, *fh* $\parallel$ *ac*.

— Je nachdem nun der Durchschnittpunkt *h* unter, in oder über *de* zu liegen kommt, befindet sich das Körperchen vor, in oder hinter der Pupillarebene: je nachdem er in oder ausserhalb *mn* fällt, befindet es sich in oder ausserhalb der Augenaxe. Je grösser die Entfernung des Punctes *h* von *de*, resp. *mn* ist, desto grösser ist die Entfernung von der Pupillarebene, resp. der Augenaxe. Es wird folglich das Körperchen vor der Pupille in der Augenaxe liegen, wenn *f* und *g* in gleichen Entfernungen von den Centren nach Aussen liegen; hinter der Pupille in der Augenaxe, wenn sie in gleichen Entfernungen von den Centren beide nach Innen liegen; in der Pupillarebene, wenn sie in gleichen Entfernungen von den Centren, der eine nach Innen, der andere nach Aussen liegt. Haben sie gleiche Entfernung von den Centren und liegen beide Schatten nach Innen, oder der eine nach Innen, der andere nach Aussen, dabei aber der äussere dem Centrum seines Seh-



feldes näher, so liegt der Körper hinter der Pupillarebene ausserhalb der Axe; — in den entgegengesetzten Fällen vor der Pupillarebene.

Richtet man die Platte statt auf den weissbewölkten Himmel auf ein stark reflectirendes weisses Papier, so kann man bei gehöriger Fixirung des Kopfes, der Platte und beider von dem Papiere auf letzterem alle gesehenen Schatten mit einem hohen Grade von Sicherheit zeichnen. Solche (Bleifeder-) Zeichnungen, von Monat zu Monat angefertigt, geben lehrreiche Auskunft über die Entwicklung der entoptischen Körper, z. B. bei *Cataracta incipiens*.

Diese Körper nun sind entweder wenig veränderlich und gehören dann meist dem Linsensysteme an (Perlflecken, dunkle Punkte, Streifen oder Figuren, bei *Catar. incip.* oft nach den Sektoren geordnet, weisse Streifen etc.) oder sie sind von veränderlicher Beschaffenheit und weisen auf Unreinlichkeit der Cornea hin, die mit Drüsensecreten (*spectrum muco-lacrymale*) oder Staub bedeckt sein kann oder in Runzelung derselben auf Druckwirkung beruht. Am häufigsten aber zeigen sich auf- und absteigende, zellenartige und verschieden figurirte Gebilde, die für gewöhnlich dem Glaskörper angehören, wenn sie sich langsam, dem Kammerwasser, wenn sie schneller sich bewegen. Meist sind die im Kammerwasser schwebenden specifisch leichter als dasselbe, und heben sich nach den Bulbusrotationen, während sie als niedersinkend wahrgenommen werden. Diese letzteren geben besonders zu den s. g. *Mouches volantes* Anlass.

Perspicilli, Brillen.

Die Brillen kommen von Jahr zu Jahr mehr und in grösserer Vollkommenheit in Anwendung. *Roger Baco* hat sich ihrer schon zu Ende des 13. Sacc. bedient, vielleicht war der Gebrauch biconvexer Gläser schon länger bekannt. Je nach der Art der optischen oder organischen Anomalie, der durch den Brillengebrauch abgeholfen werden soll, werden die Brillen verschiedenartig construirt.

1) Gegen *Myopie* sind Gläser erforderlich, welche die bei myopischem Augenbau zu starke Convergenz der Strahlen verringern. Dieser Zweck wird durch Concavgläser erreicht, die, indem sie an und für sich die eingefallenen Strahlen zerstreuen, wesshalb sie Dispersionsgläser heissen, gemeinschaftlich mit dem myopischen Auge den Strahlen diejenige Convergenz geben, die geeignet ist, den Conicidenzpunkt der Strahlen in die Retinalfläche zu verlegen. So verschieden die Grade der Kurzsichtigkeit, d. h. die Fernpunkte des deutlichsten Sehens sind, so verschieden müssen auch die zur Correction der Strahlenbrechung dienenden Gläser sein. Principiell würde es richtig sein, myopischen Augen durch Concavgläser die normale Entfernung des

deutlichsten Sehens zu geben, doch leiden bei Durchführung dieses Principes die Augen, indem die *Myopie* zunimmt. Man begnügt sich desshalb bei starker *Myopie* die Sehweite um wenige Zoll zu verlängern. Dabei wird durch tagelangen Gebrauch erprobt, ob das für jedes Auge besonders zu wählende Glas wirklich geeignet ist, d. h. die Objecte weder grösser noch kleiner erscheinen lässt und keine Empfindlichkeit erzeugt. Durch Optometer (s. d.) gelangt man sicherer zum Ziele, als durch Probiren vieler Gläser nacheinander, wodurch der Accommodationsapparat zu einer erhöhten und irreführenden Thätigkeit veranlasst wird. Noch weniger darf man einfach nach den Gläsernummern die Bestellung machen, da die Glasschleifer bald nach der Focaldistanz, bald nach dem Radius der Kugel, aus dem das Concavglas einen Abschnitt darstellt, die Nummern geben. Die Focaldistanz kann aber nicht immer aequal der Länge des Radius sein, da die Refraktionskraft der Brille wesentlich von der Dichtigkeit des Materials, aus der sie gearbeitet ist, abhängt. Im Allgemeinen gebraucht man für das dem Planglase nächste Concavglas 100 als Einheit, geht dann aber wegen der anfänglich zu geringen, schliesslich zu bedeutenden Differenz nicht in der gewöhnlichen Zahlenfolge zu den stärksten Nummern vor, sondern springt zuerst über und gibt zuletzt den Concavitätsgrad in gebrochenen Zahlen an, also (nach *Plössl* in Wien) ungefähr folgendermassen: 100, 80, 60, 48, 40, 36, 33, 30, 27, 24, 22, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, $7\frac{1}{2}$, 7, $6\frac{1}{2}$, 6, $5\frac{1}{2}$, 5, $4\frac{3}{4}$, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{4}$, 4, $3\frac{3}{4}$, $3\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$, 3, $2\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, 2. *Prokesch* hat 33, 22, 17 nicht, statt 40 und 48 hat er 45 und 90 als Einheit.

Kurzsichtige, die Brillen gebrauchen wollen, beginnen mit Mittelnummern; zu schwächern als 36 gelangt man meist nur, wenn man zur Heilung der *Myopie* dieselben nöthig hat. Zu stärkeren, als 12 und 10 rathe man nur in Nothfällen. — Ein bekanntes Calcül zur Bestimmung des erforderlichen Grades gibt *Ruete* so an: „Man multiplicire die wirkliche Entfernung des deutlichen Sehens mit der gewünschten, dividire in das Product mit der Differenz beider Entfernungen und versuche zuerst den Quotienten als die Brennweite der erforderlichen Brille, um demnächst zu niedrigeren Nummern überzugehen.“

Gewöhnlich werden die Gläser biconcav, und zwar auf beiden Seiten gleich stark concav, geschliffen. Ein Uebelstand ist, dass sie nur beim Geradeaussehen für das Auge centriert sind, d. h. dass die Krümmungscentren der Gläser nur bei dieser Augenstellung mit den Krümmungscentren der Augenmedien in einer Geraden liegen. Bei einer Wendung des Auges behufs der Erkennung seitlicher Gegenstände trifft der Vereinigungspunkt der Strahlen daher nicht mehr ohne nachhelfende Accommodation die Netzhaut, und andererseits erscheinen die Objecte dann etwas transplacirt. Dieser Nachtheil trifft

sehr stark die Biconcavlinen. Sehr gemindert ist er bei den seit 50 Jahren in Aufnahme gekommenen Wollaston'schen periscopischen Brillen, deren Gläser bei prävalirender Concavkrümmung biconcav sind, die concave Seite dem Auge zugewendet. Die Augenaxe trifft nämlich bei solchen, auch bei geringen Wendungen des Augapfels, noch ziemlich nahe senkrecht auf die beiden Glasflächen. Um die Wirkung zu vervollkommen, hat man überdies verschiedene Stellen des Glases aus verschiedenen Centren geschliffen, so dass die Augenaxe die Glasflächen an mehr als einer Stelle genau senkrecht trifft. Störend bei den periscopischen Brillen sind die von der äusseren Fläche herkommenden stärkeren Reflexbilder, vortheilhaft aber wieder, wie *Ruete* bemerkt, dass sich die Augen nicht so sehr an stieres Geradeaussehen gewöhnen, was beim Nichtgebrauch der Brille den Gesichtsausdruck entstellt.

Um nicht zum Sehen in der Nähe und auf Abstand verschiedene Brillen nöthig zu haben, hat *Franklin* vorgeschlagen, vor jedes Auge zwei Halbgläser von verschiedener Stärke und jedes mit einem oder mehreren optischen Centren versehen zu setzen, das stärkere für die Ferne oben, das schwächere für die Nähe unten im Brillenringe. — Pantoskopische Brillen nennt man in England schräg eingesetzte, so dass das Auge beim Sehen in die Ferne, ähnlich wie bei den s. g. Nasenkneifern, über die Brille wegsieht. Das geeignetste Material ist Crown Glas, das aber von möglichster Reinheit sein muss. Gläser aus Bergkrystall haben den Vorzug, ihrer grösseren Härte wegen nicht so leicht kritzig zu werden, wie Crown- und besonders Flintglas; da sie aber der doppelten Lichtbrechung wegen aus senkrecht zur Axe geschnittenen Scheiben geschliffen werden müssen, so haben sie einen enormen Preis (2 Ld'or). — Hinsichtlich des Gestells ist es in optischer Hinsicht nur wichtig, dass die Gläser genau vor beiden Pupillen liegen, was keineswegs alle Brillenträger beachten. Individuen mit hohen Nasenrücken müssen demgemäss das Brillengestell construiren lassen.

2) Gegen *Presbyopie* gebraucht man Gläser von der entgegengesetzten Wirkung, biconvexe oder Sammelgläser, besser Concentrationsmenisken¹⁾, um den Conicidenzpunkt der Strahlen, der bei presbyopischem Augenbau hinter die Netzhaut fiel, vorzurücken und genau in die Retinalfläche zu verlegen. Erlischt bei reiferem Alter die Accommodationskraft des Auges, so ermüdet es beim Nahesehen und kann erheblich organisch erkranken, wenn man nicht durch geeignete Gläser abhilft.

¹⁾ Mit den Namen Dispersions- und Concentrationsmenisken bezeichnet man Linsen, die auf beiden Seiten eine verschiedene Krümmung haben, auf der einen eine concave, auf der andern eine convexe, aber von verschiedenem Radius, so, dass bei den Dispersionsmenisken die Concavität, bei den Concentrationsmenisken die Convexität prävalirt.

Dieselben dürfen indess ebenfalls nur mässig hülfreich wirken, um nicht auf die Dauer zu schaden. — Bei optischer und Ciliaranästhesie dürfen convexe Brillen nicht oder nur mit äusserster Vorsicht in Gebrauch gezogen werden und um so weniger, als die augenblickliche Hülfe in der Regel für späterhin schadet.

Was die s. g. Schutz- oder Conservationsbrillen betrifft, so können sie nur dann das Auge schützen, wenn dasselbe entweder ungewöhnlichen Schädlichkeiten ausgesetzt werden muss oder wenn es nicht normal, schutzbedürftig ist. Die Schädlichkeiten sind besonders Staub, Splitter, Funken, Wind, grelles Reflexlicht von weiten Schneeflächen und weissglühende, starkleuchtende und starkausdünstende Arbeitsobjecte, vor deren nachtheiliger Einwirkung auf die Augen dieselben sicher gestellt werden sollen. Dies geschieht durch Plangläser in ledernen Halbmasken, durch Krepp, Drahtnetze, bei grellem Lichte durch farbige Brillengläser, die das Licht temperiren.

Wegen Schutzbedürftigkeit der Augen hat man letztere bei jeder Empfindlichkeit gegen helles Licht angewendet und zwar nach *Scoresby* zuerst grüne, später auf *Adams* Rath blaue Gläser genommen und zwar deshalb, weil nach Gebrauch grüner Gläser die Sehobjecte subjectiv roth erscheinen. Dieser Nachtheil beruht indess mehr auf starker Farbenintensität, denn blaue Gläser erzeugen subjectives Orange, wesshalb man gut thut, für Einzelfälle zwischen verschieden nüancirten blauen Brillen angemessen zu wählen. In England gibt man gegenwärtig Gläsern den Vorzug, deren Farbe aus Grau und schwachem Blau gemischt ist, da sie nur die Lichtintensität abschwächen, nicht aber die Farbe der Sehobjecte ändern und zur Seite oder nach Wegnahme der Gläser gesehene Gegenstände in keiner Complementärfarbe erscheinen lassen. — Für Myopische oder Presbyopische werden Concav- oder Convexbrillen aus farbigem Glas geschliffen.

Isochromatische nennt man diese Gläser dann, wenn sie so gefärbt sind, dass auch die dünneren Schichten ebenso tief gefärbt sind, als die stärkeren.

Das Optometer.

Mit dem Namen Optometer bezeichnet man verschiedenartig construirte Apparate, die bestimmt sind, die Sehweite eines Auges, das heisst den nächsten und den fernsten Punkt des deutlichsten Sehens desselben zu erforschen. Die mittlere Sehweite nimmt man zu 8—10 Zoll an, myopische Augen haben eine darunter bleibende, presbyopische eine darüberhinausgehende Sehweite, recht gute Augen können sich zum deutlich Sehen für grosse Nähe und auf erheblichen Abstand accommodiren. — Als Optometer, der für die gewöhnliche Praxis ausreicht, kann jeder Zollstab dienen, den man horizontal un-

ter das zu prüfende Auge bei Verschluss des anderen legt, während man eine feine Nadel an dem Stabe so weit dem Auge nähert, bis die Nadel nicht mehr scharfcontourirt gesehen wird, und darauf so weit an dem Stabe vom Auge zurückbewegt, bis der Kranke ebenfalls erklärt, die Contouren der Nadel nicht mehr ganz deutlich zu sehen. Beide Grenzpunkte, am Zollstabe abgelesen, fassen die Weite des deutlichen Sehens in sich. — *Holke* spannte über den Zollstab einen freischwebenden Faden, der in verschiedenen Distancen fixirt wird, wobei der Faden wie zwei im fixirten Punkte ihre Spitzen sich zukehrende Kegel erscheint. — Das *Young'sche* Optometer, zur Erleichterung der Auswahl passender Brillengläser bestimmt, beruht auf demselben Principe und enthält in den verschiedenen Distanzen Zahlen, welche die erforderliche Brillennummer angeben sollen.

Das *Stampfer'sche* Optometer, auf dem *Scheiner'schen* Versuche beruhend, galt längere Zeit für durchaus zuverlässig, kann es aber ebenfalls nicht sein, da das Accommodationsvermögen allzuleicht zu Täuschungen über die mittlere Sehweite hinführt. Es besteht aus 2 zehnzölligen Messingröhren, die sich in einander schieben lassen und von denen die äussere mit einem bis auf 2 schmale Einschnitte verdeckten positiven Glase von 5'' Focaldistanz versehen, die innere aber an demselben Ende bis auf eine den beiden Einschnitten parallele Spalte geschlossen ist und an dem entgegengesetzten Ende ein Neutralglas hat. Die nach Art des *Scheiner'schen* Versuches gefundene Sehweite wird am Instrumente abgelesen und die abgelesene Zahl entspricht der angeblich geeignetsten Brillennummer.

Instrumente dieser Art können begreiflicher Weise ebenso wenig wie Brillengläser in den Fällen nützen, wo Kurz- oder Weitsichtigkeit simulirt wird. Simulanten mit guten Augen accommodiren sich beim Sehen durch stark concave Gläser sehr schnell für dieselben und täuschen den Arzt sicher. Um den Simulanten zu täuschen hat *Ruete* eine sehr zweckmässige Vorrichtung angegeben, vermittelt dessen dem Simulanten das Urtheil über die Entfernung der Lettern, die er abzulesen hat, unmöglich gemacht wird und das desshalb zu der Prüfung *Myopie* simulirender Rekruten sehr zu empfehlen ist.

Auch kann man aus der Nummer des Concavglases, mit dem man durch den Augenspiegel die Netzhaut am schärfsten erkennt, einen richtigen Schluss auf das Accommodationsvermögen des beobachteten Auges machen.

Der Augenspiegel.

Die für die Lehre von den inneren Augenkrankheiten reformatorische Bedeutung der *Helmholtz'schen* Untersuchungsmethode vermittelt des Augenspiegels ist allgemein aner-

kannt und ergibt sich aus der wissenschaftlichen ophthalmologischen Praxis und Literatur so unzweifelhaft, dass es überflüssig sein würde, über dieselbe viel zu reden. *Helmholtz* stellte in der ersten Schrift ¹⁾ seinem optischen Instrumente die doppelte Aufgabe, einmal, für die absolute Dunkelheit, in der wegen der Beschaffenheit und Wirkungsweise der lichtbrechenden Augenmedien der Hintergrund jedes unverletzten Auges erscheint, eine ausreichende Beleuchtungsart zu finden, sodann — denn *Helmholtz* wollte ursprünglich nur die Netzhaut im lebenden Auge untersuchen — die beiden Netzhautbilder, das des zu beobachtenden und des beobachtenden Auges, weil das erstere für das letztere im Allgemeinen nicht innerhalb der Grenzen des deutlichen Sehens liegt, durch optische Vorrichtungen in solche Beziehung zu einander zu bringen, dass für das letztere, das Auge des Beobachters, auch die der deutlichen Wahrnehmung des Objectauges entsprechende Accommodation zu Stande gebracht werden könne. Er wies nach, dass die genannte absolute Dunkelheit nicht von der Choroidealpigmentschicht herrühre, denn in dem Falle müssten wenigstens die Retinalgefässe und die Opticuspapille, die kein Pigment hat, sichtbar sein, sondern dass sie auf dem Umstande beruhe, dass das ganze, bei gewöhnlicher Beleuchtung einfallende Lichtquantum zum grössten Theile von dem Pigmente absorbirt werde, zum kleineren Theile das Bild auf der Retina forme, von der Bildstelle aber sodann, ohne sich irgendwie im Auge zu zerstreuen, auf demselben Wege, auf dem es eingedrungen, also durch die Pupille, wieder nach Aussen hin gelange und zu dem ursprünglich leuchtenden Punkte zurückkehre.

Steht das gesunde Auge *A* bei gewöhnlicher Beleuchtung dem gesunden Auge *B* gegenüber, so gehen von dem Auge *A* hinreichende Strahlen auf die Netzhäute des Auges *B* über, um das Bild des Auges *A* daselbst zu erzeugen. Diese Strahlen werden aber zu einem Theile absorbirt, zum andern Theile kehren sie zurück. Sie erleuchten das Innere des Auges *B* nicht, das absolut dunkel bleibt. Dasselbe ist umgekehrt ebenso auf dem anderen Auge der Fall. Durch beide Pupillen hindurch wird gegenseitig nur absolutes Dunkel, d. h. eine purpurschwarze Pupille, wahrgenommen, indem auf jeder Netzhaut ein Bild der gegenüberbefindlichen Pupille entsteht, d. h. gesehen wird.

Dieser Zustand ändert sich sofort, wenn mit den direct zurückkehrenden oder absorbirten und desshalb nicht erhellenden Strahlen des Auges *A* auch nicht zurückkehrende, nicht der

¹⁾ Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge von H. Helmholtz, Prof. der Physiologie an der Universität zu Königsberg. Mit einer Kupfertafel. Berlin. Förster (P. Jeanrenaud). 1851.

Absorption ausgesetzte und desshalb erhellende Strahlen gleichzeitig und in derselben Richtung in das Auge *B* fallen. Dies geschieht durch Anwendung des Spiegels, dessen Reflexlicht mit den nicht erhellenden Strahlen von dem beobachtenden Auge einen erhellenden Strahlenkegel in das zu beobachtende Auge schickt.

Die Pupille erscheint nicht mehr purpurschwarz, sondern gelbröthlich erleuchtet, und in diesem Zustande des Auges *B* kann durch entsprechende optische Hülfsmittel jeder Punkt innerhalb des dioptrischen und katoptrischen Theiles desselben, bis zum Pigmentstroma der Choroidea hin, zum Gegenstande der Inspection gemacht werden.

Helmholtz gebrauchte gutgeschliffene ebene Gläser als Spiegel, auf welche im verdunkelten Raume nur eine Lichtquelle wirkt, um ein scharfes Reflexlicht für das Objectauge zu erhalten. Durch diese Gläser hin sieht das beobachtende in das zu beobachtende Auge. Da indess selbst bei längerer Uebung und grosser Geschicklichkeit in der Handhabung mit diesem Apparate nicht immer genügend zuverlässige Resultate erzielt werden können, so wurden von *Ruete*, *Coccius* und vielen Anderen Modificationen angegeben, durch welche sowohl die Anwendung überhaupt erleichtert als auch für weitergehende und genauere Untersuchungen möglich gemacht wurde.

Der *Helmholtz'sche* Planspiegel hatte den zwiefachen Nachtheil, einmal, dass er, weil er auf der Hinterfläche keinen Belag hat, einen Theil des auffallenden Lichtes durchlässt und nur um so geringeres Lichtquantum reflectirt. Die Beleuchtung ist desshalb auch nur in einer sehr bestimmten Entfernung eine brauchbare und wird unzureichend, wenn man dieselbe vermehrt oder vermindert. Sodann ist man gezwungen, durch die Glasplatten selbst hindurch zu sehen, wodurch die Deutlichkeit der wahrgenommenen Bilder eine nennenswerthe Einbusse erleidet, ohne dass die dem Apparate gegebene Polarisationsverrichtung den störenden Cornealreflex wirklich sonderlich abzuschwächen im Stande wäre.

Um diese Uebelstände zu vermeiden, ersetzte *Ruete* die Planspiegel durch einen durchbohrten gläsernen Concavspiegel von beträchtlicher Brennweite. Ein neuer Uebelstand war, dass mit so construirten Apparaten das Auge nur in grösseren Entfernungen günstig beleuchtet wird. *Ruete* wählte Spiegel von 10 Par. Zoll Brennweite; solche von geringerer, z. B. 6 Par. Zoll Brennweite sind durchaus unbrauchbar. Dabei erhält man aber nicht das reelle, umgekehrte Bild der Netzhaut, sondern nur das virtuelle aufrechtstehende, dessen genaue Untersuchung wegen des unvermeidlichen, schwankenden Verhältnisses der Flamme, der Sammellinse, des Reflectors und der beiden Augen zu einander mit neuen Schwierigkeiten verbunden ist.

Coccius construirte ein für die meisten Untersuchungen

sehr zweckmässiges Instrument, indem er zu einem gläsernen Planspiegel von c. 10 Par. Linien Durchmesser zurückkehrte, der belegt und in centro durchbohrt ist. Nur wenn beide Augen kurzsichtig sind, wird zugleich eine negative Linse nöthig, die vor dem zu beobachtenden Auge angebracht wird, damit der Cornealreflex weniger störend wirke. Das Instrument ist für die Untersuchung in der Nähe ganz vorzüglich geeignet, um das virtuelle Bild genau zu sehen, doch lässt sich auch, wenn man einen Gesamtüberblick über die Retina erhalten will, das reelle dadurch sichtbar machen, dass an der Stelle des Hohlglases eine Convexlinse von c. 2 Zoll Brennweite gewählt und je nach dem Brechungsverhältniss des beobachtenden Auges näher oder ferner gestellt wird.

Eine wesentliche Verbesserung hat der *Coccius'sche* Spiegel neuerdings durch *Zehender* erhalten, der den gläsernen Planspiegel mit einem convexen Metallspiegel vertauschte, der am Rande des centralen Sehloches sehr dünn gearbeitet ist, so dass ausser dem wesentlichen Vortheile, dass nun das Spiegelbild der zur Beleuchtung gewählten Lampe in der Ebene des vorderen Netzhautbildes liegt, auch der störende Einfluss vermieden wird, der bei einem kleinen Sehloche durch die Dicke der durchbohrten Glasplatte nothwendig entsteht, zumal man niemals in der Richtung der Axe, sondern stets in einem mehrweniger grossen Winkel mit der Axe schräg durch das Sehloch hinsieht. — Ich verzichte darauf, über diesen zweckmässigsten der von mir selbst geprüften Spiegel, der im *v. Gräfe'schen* Archiv (Bd. I, Abth. I. p. 121—167) ausführlich besprochen worden ist, mehr zu sagen, und empfehle ihn auch desshalb zum Gebrauch, da er sich ausser durch seine Vortrefflichkeit auch durch Wohlfeilheit vor vielen anderen Spiegeln auszeichnet. *W. Prokesch*, Optiker und Mechaniker in Wien, Vorstadt Windmühl, verkauft diesen zierlich und sehr gut gearbeiteten Augenspiegel mit Etui zu 13 fl. C. M.

Für die genauere Lehre verweise ich auf meine mit Zusätzen bearbeitete Uebersetzung des *van Trigt'schen* Werkes: Der Augenspiegel, seine Anwendung und Modificationen nebst Beiträgen zur Diagnostik innerer Augenkrankheiten. Lahr, J. H. Geiger (M. Schauenburg), 1854 (24 Sgr., col. 1 Rthlr.) und auf das vortreffliche Werk von Dr. *E. Jäger*: Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel. Wien, W. Braumüller, 1855. (6 Rthlr. 20 Sgr.)

Die Augenprismen.

Von *Krecke* in Utrecht sind zuerst prismatisch geschliffene Brillengläser empfohlen worden, um bei *Strabismus* zur Beseitigung der Entstellung während des Gebrauchs und möglicher Weise zur Heilung zu dienen. Mit dem ihm eigenthümlichen

virtuosen Eifer cultivirte *Donders* den Gegenstand, nach ihm *Wutzer*, v. *Gräfe*, *Ruete* u. A. — Um beim Gebrauche nicht durch farbige Umsäumung der Sehobjecte gestört zu werden, müssen die Prismen möglichst achromatisch sein; behufs orthopädischen Gebrauches lässt man sie in Brillengestelle fassen. Da der das Prisma durchdringende Strahl nach der Basis hin abgelenkt wird, so muss man das Prisma mit der Basis nach der Nasenseite hin einsetzen lassen, wenn man, wie z. B. bei dem häufigen *Strab. divergens* geringen Grades, bewirken will, dass der von einem leuchtenden Punkte kommende Strahl, der in dem gesunden Auge die *Macula lutea* trifft, in dem schielenden Auge nicht ausserhalb der *Macula lutea* sein Bild formt, sondern ihr näher — oder in ihr selbst, je nach dem Brechungsgrade des Prismas. Unter begünstigenden Umständen folgt durch angeregte Thätigkeit des *musc. rect. int.* der divergente Bulbus dem Impulse und stellt sich vor und nach in die normale Axenrichtung; doch sind die bisher erzielten Resultate noch keineswegs befriedigender Art. Es ist jedenfalls zu empfehlen, bei geringgradigem Schielen in Folge von Parese eines Muskels versuchsweise ein prismatisches Glas gebrauchen zu lassen, welches dann so eingesetzt werden muss, dass die Basis des Prisma auf der Seite des paretischen Muskels liegt, und nur so stark ist, um im schielenden Auge das Bild der *Macula lutea* zu nähern. Es entsteht dann natürlich noch ein Doppelbild von dem schielenden Auge auf der entgegengesetzten Seite. Dasselbe liegt aber dem guten Bilde so nahe, dass es der Muskelkraft nicht mehr so schwer, wie vordem, ist, beide Bilder zu vereinigen. Und eben diese Erleichterung der Vereinigung beider Bilder und die durch das Prisma bewirkte Anregung zur grösseren oder combinirten Muskelthätigkeit ist es, was durch das Prisma bewerkstelligt werden soll.

Bei der Auswahl eines passenden Prismas verfährt man in der Praxis füglich nach der *Ruete'schen* Methode also: man lässt den Kranken ein Licht, welches vor einer grossen, durch weisse Striche, die mit Zahlen bezeichnet sind, getheilten Tafel steht, in einer Entfernung von 6—8 Fuss anschauen und lässt sich, wenn der Kranke doppelt sieht, die Entfernung der Doppelbilder bezeichnen. Darauf schiebt man ein Prisma vor das schielende Auge und zwar beim divergirenden Schielen mit der Basis nach der Nase, beim convergirenden Schielen mit der Basis nach der Schläfe, beim Schielen nach Oben mit der Basis nach Unten etc. Wird nun das Doppelbild des schielenden Auges durch das Prisma dem Doppelbilde des gesunden Auges beträchtlich genähert, so kann man das Prisma als ein passendes betrachten. Ist die Annäherung nicht bedeutend genug, so wählt man ein stärkeres Prisma. Wird aber das Doppelbild des schielenden Auges auf die entgegengesetzte Seite des Bildes des gesunden Auges geworfen oder wird das Doppelsehen gleich

durch das Prisma ausgeglichen, so ist dasselbe zu scharf. Gleicht sich bei richtiger Wahl des Prismas das Doppelsehen in einiger Zeit aus, so vertauscht man dieses Prisma mit einem schwächeren, um dadurch auf's Neue ein geringes Doppelsehen hervorzubringen. Leidet der Schielende nicht an Doppelsehen, so muss man ein Prisma wählen, welches Doppelsehen mit geringem Abstände der Doppelbilder hervorruft. —

Die myotische Brille.

Mit dem Namen myotische (resp. stenopäische) Brillen sind in neuester Zeit die altbekannten Vorrichtungen benannt worden, deren man sich früher nach irrigen Voraussetzungen bediente, um schielende Augen wieder zur Annahme der normalen Axenrichtung zu vermögen. Sie bestehen aus entsprechend perforirten Kapseln, die unmittelbar der Orbita anliegen, der Art, dass die Perforationsstelle sich möglichst nahe vor der Hornhaut befindet. Es ergab sich, dass die Oeffnung von dem schielenden Auge nicht aufgesucht wird, dass dasselbe vielmehr in der Ablenkung verharret, wesshalb die Vorrichtung zur Heilung von *Strabismus* bald wieder ausser Gebrauch kam. Geeignet erschien sie dagegen in neuester Zeit, um durchscheinende Hornhautflecken, welche die Retinalbilder mit weisslich diffussem Lichte überdecken und somit nur ein mehrweniger undeutliches Sehen gestatten, abzublenden. Die Sehestörung kommt in solchen Fällen dadurch zu Stande, dass die aus unzähligen, nicht vollständig durchsichtigen Körperchen bestehende Trübung das einfallende Licht durch theilweise Reflexion und theilweise Refraction in einen Büschel weisslicher Strahlen verwandelt, der das aus den durchsichtigen Augenmedien auf die Netzhaut geworfene Bild gewissermassen verwischt. Es lag nahe, dass eine Abblendung des Hornhautfleckes und damit des weisslichen Lichtbüschels förderlich sein würde, um das Sehevermögen zu verbessern. Indess sind nur seltene Fälle, wo die Trübung in geeigneter Weise mehrweniger central gelagert ist, für diese Art der Correction des Gesichtes geeignet. Bei einem intelligenten Holländer, der nach einer in Indien überstandenen *Keratitis* mit Flecken zurückkam, die ihn sehr im Sehen hinderten und gegen welche Scarrification ohne Erfolg ausgeübt wurde, gelang es, durch eine Platte, die vor die Trübung gehalten wurde und also den aus ihr stammenden Büschel diffusen Lichtes vor der Netzhaut abblendete, das Sehen merklich zu verbessern. Von mir auf jene Diaphragmen hingewiesen, die ich auch schon bei manchen anderen Sehstörungen zur Abhülfe angewandt hatte, liess *Donders* jene Brillen gebrauchen und zwar, wie er mir anzeigte, mit überraschend günstigem Erfolge. Der Versuch wurde vielfältig bei Patienten mit demselben Hornhautfehler wiederholt, doch ist mir kein Fall bekannt geworden, bei welchem ebenso glän-

zende Resultate erzielt worden wären, wie die waren, welche bei dem holländischen Patienten erzielt wurden und von denen *Donders* berichtet: „Patient vermöge mit Hülfe der myotischen Brillen so scharf zu sehen, als je vorher, Nro. I und II der Schriften auf der *Jäger'schen* Scala, die Mancher mit gesunden Augen kaum erkennt, könne er leicht entziffern, ohne kurzsichtig zu sein, denn auch entfernte Objecte erkenne er sehr scharf. Ebenso könne er mehrere Stunden hintereinander ohne die geringste Anstrengung lesen und schreiben, wozu er seit einem Jahre nicht einen Augenblick im Stande gewesen sei.“ — Das Nähere über diese Versuche findet man in meiner Schrift: Die künstliche Pupille vor und in dem Auge. Lahr, Geiger. 1854 und in einer Dissertation de perspicillis stenopaeis von H. van Wijngaarden, von der in der 1. Lief. des 1. Bds. des v. *Gräfe'schen* Archivs eine Uebersetzung erschienen ist. — Es ist jedenfalls anzurathen, in allen einschlagenden Fällen unheilbarer Hornhauttrübung vor der Ausführung der *Koremorphose* diese Brillenvorrichtung zu versuchen.

Die Benutzung bunter Gläser zu diagnostischen Zwecken ist da am Platze, wo es sich darum handelt, aus der Stellung der Bilder, resp. Doppelbilder, Störungen in der Axenrichtung, Muskellähmungen u. d. zu erforschen.

Die als Spielwerk bekannten stereoscopischen Experimente lassen sich benutzen, um den Grad der Sehschwäche, etwa vorhandenes Unvermögen, Farben zu unterscheiden u. dgl. für das einzelne Auge zu bestimmen.

Die *Jäger'schen* Tafeln enthalten Druckschrift von sehr verschiedener Grösse und dienen dazu, um die Sehkraft auf verschiedene Abstände zu ermitteln. (Siehe das Werk von Dr. *E. Jäger* über Staar und Staaroperationen. Wien, 1855.)

Chirurgischer Theil.

Operationen an den Lidern werden nach den allgemeinen chirurgischen Grundsätzen und mit Berücksichtigung des leicht verletzlichen Bulbus und der für denselben besonders gefährlichen Narbencontraction verrichtet. Der Instrumentenapparat ist der für feinere Operationen gewöhnliche; besondere Instrumente werden bei den Operationsfällen, für die sie empfohlen worden sind, genannt und beschrieben. Die Stellung des Operateurs zum Patienten ist überall dieselbe wie bei Augenuntersuchungen. Als allgemeine Regel gilt, die Operation, die überhaupt indicirt ist, ohne sehr wichtige specielle Contra-indication nicht zu verschieben, um durch Zögern nicht möglicher Weise den Bulbus in Gefahr zu setzen.

Ablepharon. Die Operation ist bald vorzunehmen, um dem durch Entzündung drohenden Verluste des Bulbus vorzubeugen. Bei *Abl. cong.* wird selten die Operation indicirt sein, aber stets bei *Abl. acq.*, zu dem auch die wegen Entartung des Lides operativ bewerkstelligte Wegnahme desselben gerechnet werden muss. — Da es sich um künstlichen Ersatz handelt, also um eine plastische Operation, *Blepharoplastik*, so hat der Operateur zunächst festzustellen, aus welchem benachbarten Hauttheile er den Ersatzlappen nehmen und nach welcher Methode er bei der Operation verfahren will. Die Art des Defectes und die Beschaffenheit der Wangen-, Stirn- und Schläfenhaut entscheidet.

Die Methode von Dieffenbach ist besonders geeignet, wo ein grosser Substanzverlust zu ersetzen ist. Man präparirt an der Stelle des Defectes den Grund vollkommen rein und zwar in Gestalt eines Dreiecks, dessen Basis dem Auge zugekehrt ist und dessen Spitze beim Oberlide in der Stirn, beim Unterlide in der Wange liegt. Die Spitze kann mehrere Centim. von der Basis entfernt sein. Darauf wird der Lappen gebildet, indem man vom Augenwinkel nach Aussen zu etwas weiter incidirt, als der Defect gross ist und vom Ende dieser Incision parallel mit der äussern Dreiecksseite einen Schnitt führt, bei Bildung des Oberlides nach Oben, bei der des Unterlides nach Unten, so dass nach Aussen von der dreieckigen Wundfläche ein Viereck entsteht. Dasselbe wird nun lospräparirt, um einen Lappen zu geben, der durch Verschiebung nach Innen das Dreieck vollkommen deckt und in dieser Lage durch eine genaue Naht befestigt wird. Nach der Befestigung sucht man nun auch die äusserlich entstandene, dreieckige Wundfläche durch einige Hefte zu verkleinern und legt darauf den Verband an. Bei grosser Dehnbarkeit der Haut ist es oft möglich, diese Wundfläche sofort durch angelegte Nähte gänzlich zu schliessen (*Chelius*). (Cfr. Taf. 4, Fig. III *a'* und *b'*.)

Vermittelst der Fricke'schen Methode ist es möglich, bei Erkrankung der zunächst liegenden Haut den Lappen aus weiterer Entfernung herbeizuholen. Nachdem die Stelle wund gemacht, wird die Form dieser Wundstelle in der Stirn- und Schläfengegend mit Tinte vorgezeichnet, in allen Durchmessern um 1'' grösser ausgelöst, darauf die mehrere Linien breite Brücke zwischen dem Defecte und dem Anfange des Lappens ausgeschnitten, der Lappen nun an seinen Bestimmungsort gebracht und daselbst befestigt.

Das sehr rationelle Hasner'sche Verfahren besteht darin, dass Lappen von annähernder Sichelform ausgelöst und in den Defect implantirt werden. Oder es wird je nach Gestalt des Defectes der Lappen gebildet und eingelegt.

Coloboma palp. wird beseitigt durch ein der Hasenschartoperation analoges Verfahren. Ist die Spalte vernarbt, so werden beide Lippen zuvörderst durch Scheerenschnitte wund gemacht und darauf eine vorsichtige Knotennaht angelegt, die am Besten vom Lidrande her beginnt, damit dort die Coaptation möglichst genau sei. — War das *Coloboma* sehr gross, so wird das erste Heft nach genauer Abmessung in der Mitte angelegt, weil es später schwierig und gefährvoll ist, über der Bulbuswölbung Hefte anzubringen. Bei gleichzeitigem Substanzverlust, wie er bei traumatischer Ursache nicht selten ist, muss ohne Säumen ein geeignetes, benachbartes Hautstück abgemessen, ausgelöst und in den Defect hinein befestigt werden. — Um nicht bei Unruhe des Patienten den Bulbus zu gefährden, legen einige Operateure solche Nähte über einer Hornplatte an, die unter das gespaltene Lid geschoben wird.

Ankyloblepharon ist durch Messer- oder Scheerenschnitt leicht zu heben, doch droht stets durch Wiederverwachsung Rückkehr des Uebels. Desshalb hat man bei partiellem, durch ein Ligament bewirktem *Ankylobl.* der Durchbindung mittelst eines Seidenfadens den Vorzug gegeben. Bei totalem oder doch weitgehendem *Ankylobl.* gebietet die Vorsicht, die Richtung, welche der Schnitt zwischen den beiden Lidknorpeln zu nehmen hat, vorher mit schwarzer Farbe zu bezeichnen, darauf die Haut in eine Falte heben zu lassen, mit Hülfe der Pincette eine Oeffnung zu bilden, eine Hohlsonde einzuschieben und auf dieser den Schnitt mit Messer und Scheere aus- und zu Ende zu führen. Der drohenden Wiederverwachsung begegnet man in der Regel hinreichend dadurch, dass man in dem künstlich hergestellten Augenwinkel eine Bindehautfalte einnäht und die Wundränder fettig erhält. Schlägt dies Verfahren fehl, so versuche man, weil die Wiederverwachsung stets vom Augenwinkel beginnt, an der Stelle desselben zuerst eine Oeffnung zu etabliren und durch Einlage eines Bleiringes, den man durch Faden und Pflaster vom Bulbus abgezogen erhält, zur Vernarbung zu bringen und vollende erst darnach die weitere Eröffnung. Darnach beachte man *Jüngkens* Rath, durch Fadenschlingen oder Pflaster die getrennten Lider auseinander zu halten und cauterisire von Zeit zu Zeit das eine Lid, während man das andere mit einem adstringirenden Collyrium bepinseln lässt (*Desmarres*).

Phimosis palp. wird nach *Ammon*, der die Operation *Canthoplastik* nannte, folgendermassen operirt: „mit einem schmalen Bistouri, welches man unter den stark abgezogenen äusseren Lidwinkel schiebt und nach Aussen durch die Haut hervorsticht, vergrössert man die Lidspalte bis zum äussern Orbitalrande, führt nun durch die Augapfelconjunctiva eine Fadenschlinge und zieht damit jene in die gebildete Wunde

hinein und befestigt sie durch eine Knopfnahnt im äussersten Wundwinkel, worauf man durch noch einige Hefte den übrigen Theil der Wundränder mit der Bindehautfalte umsäumt. *Seit* bemerkt zu dieser Angabe richtig, dass man in leichteren Fällen einfacher mit einer blossen Hakenpincette die Bindehaut in der tiefen Grube zwischen äusseren Lidwinkel und Bulbus in einer Falte hervorziehe und bloss in dem Wundwinkel durch eine Knopfnahnt befestigen möge, ohne gerade die Wundränder selbst zu umsäumen, da ohnedem die Schleimhaut gern einreisse.

Symblepharon ist in den Fällen, wo der ganze Bindehautsack zwischen Lid und Bulbus nicht mehr existirt, also die Bindehaut direct vom Lide auf den Bulbus übergeht (bei *S. posterius*, v. *Ammon*), unheilbar, da es unmöglich ist eine neue Bindehaut herzustellen. Wäre auf operativem Wege die Trennung des Lides vom Bulbus noch so glücklich bewerkstelligt, so würde doch trotz einer zwischengeschobenen Bleiplatte (*Bartisch*), eines Stückchens Blase (*Callisen*), eines Pergamentstreifchens (*Solinger*) oder eines Wachsstückes, einer in Salzsäure erweichten Elfenbeinscheibe (*Carron*) oder eines *Boissonneau'schen* künstlichen Auges die Verwachsung und zwar unter grossen Beschwerden wieder eintreten. Nur bei partiellem **Symblepharon**, selbst wenn es sich bis in die Uebergangsfalte erstreckt, darf man sich von der Operation Erfolg versprechen.

Ist nur ein Ligament zwischen Lidrand und Bulbus vorhanden, so genügt es, denselben scharf am Bulbus abzutrennen. um dieselbe Abtrennung auch dann am Lidrande vorzunehmen, wenn die Wundfläche am Bulbus vernarbt ist.

Erstreckt sich die Adhaerenz bis zu der Uebergangsfalte so verfährt man am besten nach der genialen *Ammon'schen* Methode. Man trennt die verwachsene Lidpartie durch zwei V-förmige Incisionen ab, so dass sie am Bulbus zurückbleibt, während im Lide ein künstliches *Coloboma* erzeugt ist, das wie *Coloboma* über der zurückgebliebenen Partie vereinigt wird. Nach geschehener Heilung, die in 2—3 Wochen erfolgt ist, präparirt man sodann die Adhaerenz einfach vom Bulbus ab, ohne fürchten zu müssen, dass Wiederverwachsung eintreten könne.

Weniger zuverlässig und für den Patienten jedenfalls weit lästiger ist die *Dieffenbach'sche* Methode, der die Adhaerenz entfernt und dann durch Umschlagen des Lides nach Innen und einige befestigende Hefte ein künstliches *Entropium* herstellt, das so lange bestehen muss, bis die Wundfläche am Bulbus vollständig vernarbt ist. Nach geschehener Vernarbung wird das Lid wieder in seine natürliche Lage zurückgebracht. — Wenn auch die Cilien vorher vorsichtig abgeschnitten waren, so setzt die gewaltsame Einwärtskehrung des Lides das Auge doch der Gefahr einer hochgradigen Entzündung aus.

Desmarres Rath, nach **Amussat's** Methode der permanenten Narbenausdehnung die Ablösung einfach auszuführen und jeden Tag von dem Grunde aus die hervorkeimenden Granulationen mit der Spitze einer Nadel oder eines kleinen Messers zu zerstören, erscheint noch weniger empfehlenswerth und ist höchstens am Platze, wo es sich darum handelt, bei Atrophie des Bulbus die Lider für die Einlage eines künstlichen Auges vorzubereiten.

Seitz citirt die Methode des Amerikaners **Hays**, dem die Heilung eines an der inneren Hälfte des Unterlides befindlichen, nach Abtragung eines Pterygimus entstandenen und die Bewegungen des Bulbus nach der Aussenseite verhindernden **Symblepharon** auf folgende Weise gelang: nach vorläufiger Spannung des Unterlides und Trennung der Verwachsung bis zur Uebergangsfalte zog derselbe mit einer feinen gebogenen Nadel durch die Bindehautränder des Lidtheiles der Wunde drei dünne Seidenfäden, zog diese Ränder über die Wunde heran und knüpfte die Fäden. Der am Bulbus zurückgebliebene Theil der Adhaerenz verschrumpfte allmählig.

Nach der gelungenen Ablösung der Adhaerenz mittelst eines Seiden- oder Bleifadens, der als Ring um dieselbe zusammengedreht wird, ist stets zu fürchten, dass sich die Verwachsung von Hinten her, wenigstens theilweise, wieder erneuere, selbst wenn man nach **Pétriquin's** Methode zwei Ligaturen, eine festere am Bulbus, und eine lockere am Lide durch die Adhaerenz legt.

Lagophthalmus organicus erfordert je nach der Ursache der aufgehobenen Senkung des Oberlides ein verschiedenes Verfahren. Liegt die Ursache in einer unregelmässigen, flachen Hautnarbe, so genügt es oft, dieselbe zu excidiren und durch feine Hefte die Wunde zu schliessen. Ist der *m. levat. palp.* entartet, so räth **Dieffenbach**, denselben nach Unterschiebung einer Hornplatte subcutan zu durchschneiden. Findet narbige Verwachsung mit dem Orbitalrande statt, so schält man die Haut subcutan vom Knochen los und verzieht das Oberlid durch Pflasterstreifen oder eingelegte Fadenschlingen nach Unten. Um straffe Quernarben auf dem Lide als Ursache der mangelhaften Beweglichkeit unschädlich zu machen, soll man nach **Dieffenbach** das ganze Oberlid sammt dem Knorpel mehrere Male subcutan durchschneiden und dann das Lid bis zum vollständigen Lidschluss herabziehen und so mit Heftpflastern fest verkleben. Das zuverlässigste Mittel bei hochgradiger Verkürzung des Oberlides bleibt jedenfalls die blepharoplastische Operation, durch welche ein benachbartes Hautstück in das Lid implantirt wird. Das Hautstück muss aber hinreichend gross sein, um bei der nicht ausbleibenden Schrumpfung nicht dasselbe Uebel in veränderter Gestalt wiederkehren zu lassen.

Blepharoptosis mechanica erfordert die operative Entfernung der überflüssigen Haut, die aber erst nach genauer Abmessung vorgenommen werden darf, indem, wenn zuviel Haut entfernt würde, *Ectropium* oder *Lagophthalmus* sich einstellen könnte, die Entfernung von zu wenig Haut die Wiederholung der Operation nöthig machte. Man handelt deshalb vorsichtig, wenn man eine Zeitlang vor der Operation Drahtklammern einlegt, um das zu entfernende Stück deutlich zu markiren. Dann erfasst man es mit einer Balkenzange oder einer Entropiumpincette und schneidet es mit einem scharfen Scheerenschnitte ab, um die Wundränder sofort zu heften. Die Heftung wird durch eine Pincette erleichtert, deren Branchen nach Vorn gabelförmig auseinandergehen, so dass man die Nadeln durch die Gabel der Pincette führen kann. — Jedenfalls sei man bedacht, dass auch die nachfolgende Narbencontraction zu einer weiteren Verkürzung des Lides beiträgt. — Bestreichen mit concentrirter Schwefelsäure ist stets sehr schmerzhaft und verursacht keineswegs immer eine Narbe, die hinreicht, um die *Ptoxis* aufzuheben.

Gegen **Epicanthus** hat *v. Ammon* der von ihm so genannten *Rhinorrhaphie* Eingang zu verschaffen gesucht. Es soll eine dem *Epicanthus* entsprechende senkrechte Hautfalte auf dem Nasenrücken erhoben und entfernt werden. Umschlungene Naht durch die Wundränder schliesst die entstandene Wunde linear und beseitigt den *Epicanthus*.

Entropium. Die geringeren Grade werden nach den bei *Ptoxis* angegebenen Verfahrensweisen beseitigt. Oft genügt es, den ernstlichen Willen des Patienten, selbst das Uebel durch die eigenen Finger zu beseitigen, angeregt zu haben. *Benedict* und *Desmarres* sahen glänzende Erfolge davon, dass der Kranke häufig möglichst lange Zeit diese Augengymnastik übte. Zugleich Sorge man, die Lider durch spirituöse und adstringirende Einreibungen zu stärken. Die mechanisch wirkenden Mittel Collodium, Heftpflasterstreifen, Klammern und Fadenschlingen, ebenso Cauterisation mit *Ferrum candens*, *Acid. sulph. concentratum*, die Reizung der Haut durch Blasenpflaster u. dgl. nützen nur in leichteren Fällen. Von Collodium hat *Cunier* wiederholt äusserst günstige Resultate beobachtet. Bei erheblichem Entropium ist die schon von *Celsus* empfohlene Methode der Excision eines entsprechend grossen Hautstückes vorzuziehen. Parallel mit dem Lidrande wird eine Falte erhoben mit einer Balkenzange oder der *Himly'schen* Entropiumpincette, die statt der Spitze ein grosses dreiseitiges Fenster hat, dessen eine Seite zum Auffassen einer Falte besonders construirt ist. Mit einem schnellen Scheerenschlage wird die Falte abgeschnitten und nun eine Knopf- oder umschlungene Naht angelegt. *Scarpa* verwarf die Naht nicht

gänzlich mit Unrecht, da ihre Anlage oft schwierig, jedenfalls schmerzhaft ist, und da nach Eiterung ebenfalls, wenn auch oft entstellend, eine zweckentsprechende Narbe sich bildet. Späterer Wiederkehr wird sicherer vorgebeugt, wenn man, wie ich es von *Wutzer* habe ausführen sehen, die Knotennaht durch das ganze Lid führt und über dem Lidrande den Knoten schürzt. 2—3 Hefte der Art genügen, der Reiz des als corp. alienum wirkenden Fadens wird besser ertragen, als man vorweg annehmen sollte und die Heilung per primam gelingt fast ohne Ausnahme.

Um die Heftung beider Wundlippen leichter ausführen zu können, hat man die Heftung vor der Excision vorgenommen und dann ein grosses Stück (*Stiévenart*) oder mehrere kleine (*Cunier*) excidirt. Ich selbst habe in einigen Fällen die Fäden vor der Excision eingelegt und nach der Excision geknotet und sehr günstige Erfolge gehabt.

Neuerdings hat man (*Janson, Lisfranc, Carron, Segon, Desmarres*) verticale, kreuzförmige, dreieckige Excisionen der Lidhaut vorgenommen und die Heftung theilweise ausgeführt, theilweise die Wunde der Eiterung überlassen. *Lisfranc* trug fast die ganze Hautbedeckung des Lides ab, *Desmarres* legte bei hohem Grade von Lidhauterschaffung mehrere verticale Excisionen parallel nebeneinander. *Velpeau* gibt nach *Seitz*, wenn die Einwärtskehrung in der Nähe der Lidwinkel besteht, der senkrechten, und wo sie mehr die Mitte des Lides betrifft, der queren Excision den Vorzug.

Ist partielles *Symblepharon* Ursache des *Entropiums*, so beseitigt man beide Uebel glücklich durch Ausführung der Ammon'schen Methode, *Symblepharon* zu heben. Complication mit totalem *Symblepharon* erfordert eine umfangreiche Excision und energische Heftung.

Ist zugleich der Lidknorpel partiell verkrümmt, so kann man vor der *Celsus*'schen Excision den verkrümmten Knorpeltheil durch Vförmige Excision entfernen und darauf durch die Naht dieses operativ entstandene *Coloboma* wieder schliessen. Ist der ganze Tarsus muldenartig verbogen, so soll man ihn nach *Saunders* entweder gänzlich aus dem Lide herauspräpariren oder nach der Adam-Crampton'schen Methode in der Nähe beider Lidwinkel zwei Colobome anlegen, das Mittelstück umstülpen und von der Bindehautseite den verkrümmten Tarsus quer incidiren, darauf noch die *Celsus*'sche Excision vornehmen und nun sehen, dem Lide eine passende Form zu geben. Der Erfolg ist mehr als zweifelhaft. Hat *Blepharospasmus* zu permanenter Contraction des *m. orbicularis* Anlass gegeben, wie Augenmuskelkrampf bleibendes Schielen herbeiführt, so verrichtet man die subcutane Durchschneidung des *m. orbicularis* und beachtet dabei *Pétréquin's* Rath, besonders die dem freien Lidrande zunächst gelegenen Fasern zu trennen, da diese es sind, die *Entropium* (resp. *Trichiasis*) bewirken, während

permanente Contraction der dem Lidrande entfernten Orbicularisfasern eher zur Entstehung von *Ectropium* führt. Während der Operation legt man Schutzplatten über den Bulbus und schliesst nachher die Lider durch lange Heftpflasterstreifen, um die interne Blutung zu beschränken und um das Lid in der bewirkten Lage zu erhalten. — Schlägt dies Verfahren doch fehl, so muss man die verticale Excision vornehmen.

Ergibt die Untersuchung, dass Conjunctivalexcreescenzen oder schwielige Narbenbildung in der Bindehaut das *Entropium* bewirkt hatte, so muss man diese Uebel durch Exstirpation derselben entfernen.

War *Ankyloblepharon* Ursache des *Entropium*, so muss man nach der Trennung der verwachsenen Lider sich bis durch die äussere Commissur erstrecken und die Heftung so vorgenommen werden, dass das Lid eine angemessene Stellung nach Aussen erhält. Um einzelne Haare oder Haarbüschel in die normale Stellung zu bringen, habe ich einige Male sehr erfolgreich die innere Narbencontraction von Einstichen oder Einschnitten benutzt. — Siehe meinen hierüber in den *Annales d'oculistique* erscheinenden Bericht.

Ectropium beseitigen heisst so viel, als einen nach Aussen gekehrten und vorgefallenen oder verlängerten Lidrand auf operativem Wege so viel verkürzen, dass er zum Bulbus wieder in die normale Lage tritt. Je nach den Ursachen der Ectropionirung des Lides muss das operative Verfahren ein verschiedenes sein. Wälzten sich die Lider z. B. nach Aussen, so dass das untere auf die Wange prolabirte, weil auf traumatische Weise die äussere Lidcommissur getrennt war, so wird das Ectropium vollständig dadurch beseitigt, dass man durch eine genaue Naht und Primaheilung die Integrität der Commissur wiederherstellt.

War in Folge eines chronischen Entzündungszustandes die *Conjunctiva palp.* in Wucherungs- und Wulstungszustand versetzt und aus beiden Ursachen der untere Lidrand relaxirt und vorgesunken wie bei *Ectr. senilis inf.*, so ist die Dieffenbach'sche Methode indicirt, die darin besteht, dass man 1—2'' über dem unteren Orbitalrande einen halbmondförmigen Einschnitt macht, der zu beiden Seiten bis in die Nähe beider Augenwinkel und unter dem Tarsus hin bis zu der Bindehautfalte fortgeführt wird. Darauf wird mit einem zweischneidigen über die Fläche gebogenen Scalpell auch die Bindehaut in der Ausdehnung der Hautwunde gespalten, die ganze Bindehaut mittelst eines Häkchens oder einer Pincette von der Hautwunde aus erfasst, in dieselbe so weit herabgezogen, als nöthig ist, dass sich der Lidrand wieder an den Bulbus normal anlegt, und nun bei der Heftung der Hautwunde mit Carlsbader Nadeln in derselben festgehalten. — *Chelius* näht bloss die Bindehaut

mit der unteren Wundlippe zusammen, um zu heftiger Eiterung vorzubeugen, die überhaupt leicht den Erfolg dieser Methode vereitelt.

Bei geringeren Graden von Bindehautwulstung reicht als Ursache von *Ectropium* es aus, dieselbe mit Schlingen, Häkchen, Pincette zu fassen, zu erheben und mit Messer oder Scheere einfach abzutragen. Schon *Antyllus* gab diese Abtragung an und empfahl ein Vförmiges Stück zu excidiren, doch ist die Form des Stückes unwesentlich, da die Narbenwirkung nach Abtragung des Wulstes die Anhebung des Lides bewirken muss.

Die Cauterisation, die nur in den schwächsten Graden statthaft ist, hat ihre eigenthümlichen Bedenken. Bei der Anwendung von Butyr. Antim. (*Weller*), Schwefelsäure (*Guthrie*), Ferr. cand. (*Hippokr.*, *Celsus* und viele Neuern) läuft man Gefahr, den Bulbus zu verletzen, Adhaerenzen (*Symblepharon*) zu bewirken oder durch zu starke Vernarbung *Entropium* entstehen zu sehen. Arg. nitric. in Substanz ist das geeignetste Cauterium, doch sei man vor der Aetzung bedacht, beölte Baumwolle zwischen Bulbus und Wulst zu legen, den Stift langsam und kräftig über den Wulst zu führen, ohne die punct. lacr. zu tangiren, und die Höllensteinfragmente vor Schliessung des Auges durch Wasser fortzuspülen oder noch sicherer durch eine schwache Salzsäurelösung zu neutralisiren. Dann beöle man den Schorf und beachte genau die Wirkung der Cauterisation, um die nothwendige Wiederholung nicht zu versäumen, um sie aber auch nicht zu häufig vorzunehmen.

Ergibt die Messung, dass der Lidrand verlängert ist und der Knorpel erweicht, so reichen diese Methoden nicht aus, vielmehr muss zugleich, um den Lidrand zu verkürzen, ein Stück aus demselben entfernt werden.

Adams und ähnlich *Jäger* empfehlen zu dem Behufe ein dreieckiges Stück, dessen Basis im Lidrande liegt, aus der ganzen Dicke des Lides auszuschneiden und das so entstandene *Coloboma* wieder genau zu vereinigen. Um die Narbenlinie unten oder über der Augenmitte zu vereinigen, nahm *Dieffenbach* diese Excision in der Nähe des äusseren Augenwinkels mit Schonung der Commissur vor, nachdem er das kranke Lid nach dem Winkel hin verschoben und sich genau von der Grösse des zu entfernenden Stückes überzeugt hatte. *v. Ammon* modificirte dies Verfahren, um die Narbe in die Augenwinkel-falten zu legen, dahin, dass er unterhalb der Commissur nach der Schläfe hin die erste Incision machte, darauf die zweite in solcher Entfernung von der ersten im Lidrande anfang, als die beabsichtigte Grösse des Lides es erforderte, beide Incisionen nach der Schläfe hin vereinigte und nun eine genaue *sutura circumvoluta* anlegte. (S. Taf. IV, Fig. IV^a und b.)

Liegt die Ursache in Degeneration des Tarsus, so kann man nach *Weller's* Angabe zugleich mit dem Wulste einen

Theil des Tarsus excidiren, dann das Lid reponiren und es durch Klebepflaster in der Reposition erhalten, bis die Narbe das Lid allein in der normalen Lage erhält.

Ist die Haut verkürzt durch Schrumpfung nach Impetigo oder dgl. so genügt es bei leichten Graden, fettige Einreibungen zu machen und durch Augengymnastik, also hier durch methodische Bethätigung der Orbiculariswirkung, der Ectropionirung des Lides vorzubeugen. Man kann dem Kranken diese Gymnastik passend durch geeignete Manipulation, Ziehen, Dehnen, Emporschieben des Lides unterstützen lassen.

Bei höheren Graden von Hautretraction verfährt *Desmarres* folgendermassen: nachdem er die Ränder beider Lider am äussern Augenwinkel wund gemacht, vereinigt er sie durch umschlungene Naht; es entsteht dadurch ein leichtes künstliches *Entropium*, welches wenigstens nicht mehr das Entstellende des früheren Leidens darbietet; Tarsoraphie v. *Walther's*.

Aehnlich verfuhr *J. France*, um bei Orbicularisparese das prolabirte Unterlid durch den *levator palp. sup.* ebenfalls emporzuheben.

Wird die Haut durch vernarbte Orbitalcaries im Retractionszustande erhalten, so kann man entweder die Hautnarbe von der Knochennarbe durch subcutanes Losschälen trennen und darauf das Lid durch Pflaster emporhalten, bis günstigere neue Verwachsung eingetreten ist, oder man circumcidirt die Haut- und Knochennarbe durch quere Bogenschnitte, berührt das Narbengewebe weiter nicht, löst aber die Umgebung hinreichend ab, um sie über die Narbe verschieben zu können und legt dann eine genaue Naht an. Auf die Weise wird zugleich das *Ectropium* beseitigt und statt der hässlichen Narbe hinterbleibt nur eine weisse Linie. (v. *Ammon*, *Desmarres*.)

Ist nur die verkürzte Haut zu heben oder abwärts zu drängen, so bilde man vom Lidrande nach ab- oder aufwärts einen V oder Λ förmigen Lappen, der soweit freipräparirt wird, dass sich das Lid in seine normale Lage verschieben lässt. Darauf hefte man die durch Verschiebung des Lappens entstehende dreieckige Wundfläche von der dem Lidrande entgegenstehenden Spitze ab und schreite erst zur beiderseitigen Heftung des verschobenen Lappens, wenn durch die Heftung die hergestellte normale Lage des Lidrandes nicht mehr beeinträchtigt, vielmehr gestützt und erhalten wird. Durch die Heftung wird die ursprüngliche V oder Λ Form in ein Y oder λ verwandelt; die Fäden der umschlungenen Naht dienen zur Befestigung des Lides an Pflasterstreifen auf Stirn oder Wange (*Sanson*, *Dieffenbach*, *Housten* etc.)

Jüngken excidirt erst die aufgewulstete Bindehaut, löst dann die Stirn oder Wangenhaut von der Bindehautfalte aus mindestens 1'' weit von einem Lidwinkel bis zum andern ab und schneidet dann, nach vorwärtsgeschobenem Lide ein er-

forderlich grosses Keilstück zur Verminderung seines Querdurchmessers aus. Ein Heftpflasterverband hält während der Heilung das Lid hinauf- oder herabgezogen. (*Seitz.*)

In seltenen Fällen vermag es Krampf in den äusserlichen Orbicularisfasern, das Lid nach Aussen zu wälzen. Besteht diese Contraction lange, so kann sich die Ursache von der Wirkung isoliren und das *Ectropium* wird permanent, weicht aber nach subcutaner Trennung der verkürzten Fasern angeblich (*Desmarres, Cunier*) bald wieder, besonders wenn der Patient nach der Reposition auf die Normalstellung des Lides selbst Acht hat.

Trichiasis, Distichiasis etc. wird in den häufig vorkommenden leichten Graden dadurch beseitigt, dass man jedes einzelne fehlerhaft implantirte Härchen mit einer eigens zu diesem Zweck construirten s. g. Cilienpincette für sich möglichst nahe der Wurzel erfasst und mit einem kurzen festen Rucke in seiner Längsrichtung auszieht, während man den Lidrand mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fixirt. Die *Beer'sche* Cilienpincette, die mit Recht die beliebteste ist, hat vorn im Schluss zwei einander genau entsprechende Flächen, zwischen denen das Härchen leicht fest gefasst wird, ohne abgeschnitten oder abgerissen zu werden. Die geäugte Cilienpincette von *Himly*, in deren Auge sich die Cilie legen soll, steht ihr nach. Die Operation ist leicht, doch das Finden aller fehlerhaft gestellten Härchen oft so schwierig, dass selbst die Loupenbetrachtung nicht stets ausreicht, man vielmehr auch auf den Liddrüsen Schleim achten muss, der beim Oeffnen des Auges mit den feinsten Härchen aufgehoben wird und sie zeigt.

Sind die Härchen nur falsch gerichtet, so gibt man sich, besonders bei jungen Damen, wohl Mühe, sie normal zu richten durch Kräuselung nach Aussen, leichter dadurch, dass man sie mittelst Collodium oder eines anderen Klebemittels auf der äusseren Lidfläche befestigt.

Ist *Trichiasis* nur partiell vorhanden, so lässt *Desmarres* an der Stelle ein kleines Stück der Lidhaut in einer Falte erheben und trägt es mit einem Staarmesser ab, um durch Narbencontraction die Haare nach Aussen ziehen zu lassen. Der Erfolg ist günstig, aber nicht ohne Hinterlassung einer Narbe. In einigen geeigneten Fällen habe ich dasselbe günstige Resultat ohne Narbe dadurch erreicht, dass ich ein feines, spitzes, doppelschneidiges Messer oder eine breite Staarnadel nur an der Stelle der fehlerhaft gestellten und gerichteten Cilien unter der Haut hinschob.

Mit der Einziehung und unsichtbaren Vernarbung des Stichcanales treten die Cilien regelmässig in die normale Stellung. Einmal war wegen Unruhe der Patienten der Erfolg anfänglich nur ein theilweise günstiger, trat aber nach der Wiederholung vollständig günstig ein.

Die Cauterisation der Zwiebeln und des Grundes ist ein lästiges und unzuverlässiges Verfahren, mag man sich des Ferr. cand. (*A. Paré*), des Aetzkalis (*Solera*) oder des Höllensteins (*Richter, Calliser, St. Yves*) bedienen.

Die Sorge für Erhaltung der Cornea und Verhütung der stets wiederkehrenden Hyperämie und Entzündung der Conjunctiva macht es aber mehr als wünschenswerth, das Uebel nicht zu lange bestehen zu lassen, wesshalb entweder eine der geeigneten Entropiumoperationsmethoden oder die *Jäger'sche* Abtragung des Cilienbodens verrichtet werden muss. Es wird das Lid über eine convexconcave Hornplatte gespannt, die etwas schmäler als das Lid ist (*Jäger's* Hornplatte), und mit einem Scalpell $1\frac{1}{3}$ ''' vom Lidrande entfernt ein Einschnitt parallel mit dem Rande gemacht, so dass Haut und Ringmuskel durchschnitten und alle Cilienwurzeln entfernt werden, ohne Verletzung des Tarsus. Darnach ergreift der Operateur, während der Assistent die Platte übernimmt, mit einer gezähnten Pincette den Rand und trägt ihn mit Scalpell oder Hohlscheere ab. Sind noch einige Haarwurzeln, die sich als schwarze Punkte kenntlich machen, zurück, so müssen dieselben nachträglich mit der Scheere weggenommen werden.

Bei Complication mit *Entropium* muss gegen dieses verfahren werden; *Arlt* empfiehlt die von ihm modificirte Methode *Jäsche's*, der zufolge der Cilienboden brückenartig abgelöst und nach Wundmachung der äusseren Lidhaut auf dieser mittelst Heftung befestigt, also transplantiert wird. Diese Methode ist ohne Zweifel ebenso sinnreich, als schwierig und unzuverlässig. *Duval* empfiehlt neuerdings das aus Sulfure sulfuré de calcium bereitete *Martin'sche* Haarvertilgungsmittel behufs nicht-operativer Radicalheilung von Trichiasis. (Ann. d'ocul. T. 31, 30. April 1854.)

Chalazion wird am besten einfach extirpirt, indem man über den Tumor einen Querschnitt legt, der doppelt so lang ist, als der Durchmesser des Tumor, damit das Korn ohne Zerrung mit einer feinen gezähnten Pincette oder einem Häkchen gefasst, vorgezogen und mit einer Hohlscheere ausgelöst werden könne. Naht ist unnöthig, doch suche man den Tarsus zu schonen und ätze lieber an demselben zurückgebliebene Reste mit einem Höllensteinstift, um sie gänzlich zu zerstören. — Prominirt das *Chalazion* mehr nach der Innenseite des Lides, so operirt man nach der Umkehrung des Lides ebenso, vermeidet aber den Lapis. Der Vorschlag, Wiener Aetzpaste in den Tumor einzuimpfen ist unzuverlässig und nicht ohne einiges Bedenken.

Milien schneidet man ab und ätzt den Grund mit Höllenstein oder man spaltet die kleine Cyste, entleert den Inhalt und ätzt sie dann.

Laesiones palpebr. Reine Schnittwunden, mögen sie senkrecht oder horizontal verlaufen, erfordern stets die aufmerksamste sofortige Heilung durch Hefte, damit nicht im ersten Falle *Coloboma*, im anderen *Lagophthalmus* oder *Ectropium* eintritt. Je nach der Lage des Schnittes wählt man krumme oder Insectennadeln zur Heftung und legt noch zwischen die Hefte schmale Pflasterstreifen, um die Reposition zu erhalten. Erlaubt es der Zustand der Wunde, so trage man sofort auch eine Collodiumschicht über und halte nöthigenfalls das Auge geschlossen, bis die Heilung p. pr. intent. erfolgt ist. — Solche Wunden heilen, worauf man stets bedacht sein muss, nur dann günstig, wenn sie vor der Vereinigung auf das vollständigste gereinigt sind, so dass auch nicht eine Spur von Staub oder Blutgerinsel zurückblieb.

Wunden mit Substanzverlust muss man mit sofort vollzogener Blepharoplastik behandeln, damit nach geschehener Vernarbung der Bulbus nicht mehr oder weniger weit entblösst sei und dadurch gefährdet werde. Aus demselben Grunde hat man sich bei gequetschten oder gerissenen Lidverletzungen zu bemühen, die Eiterung zu mässigen und die Vernarbung zu leiten. Die Narbe erfordert oft seitliche Einschnitte, die in klaffendem Zustande heilen müssen.

Die Antiphlogose und weitere Nachbehandlung, die Beachtung seröser Infiltration und erysipelatöser Entzündung muss nach allgemeinen chirurgischen Grundsätzen stattfinden.

Warzen, Krebs, Teleangiectasieen, Tumoren und Pseudoplasmen jeder Art von den Lidern zu entfernen erfordert doppelte Vorsicht, um den Bulbus nicht zu verletzen und um eine solche Narbe zu erzielen, welche die Function der Lider nicht benachtheiligt. Man setzt den Kranken am besten in der beschriebenen Weise, selten wird es vorzuziehen sein, ihn zu legen und operirt entweder nach den bei *Ectropium* beschriebenen Verfahrensweisen, indem man die kranke Stelle dreiseitig ausschneidet und *Coloboma* bewirkt und dann wieder beseitigt, oder man exstirpirt nach untergeschobener Hornplatte nur das Aftergebilde. Für die letztere Methode hat *Desmarres* ein sehr zweckmässiges Instrument von *Charrière* in Paris construiren lassen, das er Compressor nennt und das an einer Pincette mit Schraubenschluss vorn zwei Blätter hat, von denen das eine flach ist und die Gestalt einer durchschnittenen grossen Bohne hat und dazu bestimmt ist, unter das Lid geschoben zu werden. Das andere Blatt hat denselben Umfang, ist aber gefenstert, so dass es sich wie ein Ring über das Lid legt und nach zugedrehter Schraube die kranke Stelle zugleich gefahrlos isolirt, für die Operation bequem zugänglich und Blutung unmöglich macht. Der Apparat wird erst nach Vollendung der Operation wieder entfernt. — Für die übrige

Behandlungsweise gelten die allgemeinen chirurgischen Grundsätze.

Pterygium vollständig abzutragen, so dass es nicht recidivirt, gehört in den meisten Fällen zu den schwierigsten operativen Aufgaben. Nach der von *Celsus* herrührenden Methode wird eine Ligatur unter dem Flügelfelle durchgeführt, um zur Handhabe für das Anspannen und Abtragen zu dienen. Besser benutzt man zu dem Ende die feine Blömer'sche Pincette, die an der einen Branche zwei, an der anderen einen Zahn hat, der sich beim Schluss zwischen jene beiden legt, so dass alles Erfasste nicht ohne zu zerreißen entgleiten kann. Mit derselben fasst man das *Pterygium* über dem Cornealrande auf und präparirt dann mit einem feinen Messerchen durch wenig entsprechend gelegte Schnitte den auf der Cornea haftenden Kopf des *Pterygium* möglichst rein ab; darnach löst man die nach der Orbita gerichtete Partie mittelst einer Hohlscheere auf *Arlt's* guten Rath der Art mit 2 Schnitten ab, dass in den Rest ein Winkel fällt. Trennt man den Rest durch einen senkrechten Schnitt ab, so entsteht ein *Pt. secundarium*, das wieder seine Spitze der Cornea zuwendet.

Von der Spitze oder der Basis die Operation anzufangen ist weniger zweckmässig, ebenso hat sich *Desmarres* Methode *par déviation* nicht bewährt, nach der man die abgelöste Spitze nicht abschneidet, sondern zur Seite neben der Cornea vorbei anheilen lässt.

Skokalsky's sehr sinnreiche Methode ist nur bei sehr entwickelten *Pterygien* ausführbar. An einem feinen, wohlgewächsten Seidenfaden werden zwei krumme feine Heftnadeln eingefädelt; die erste Nadel wird an der Basis von Oben nach Unten hinter dem *Pterygium* durchgeführt, bis auf 6'' durchgezogen und der Faden am Ohr abgeschnitten. Dasselbe geschieht mit der anderen Nadel über dem Hornhautrande. Dann gehen durch jeden Canal zwei Fäden, von denen der eine die Basis beim Knoten abschnürt, ein anderer die Spitze, während die beiden mittleren über dem *Pterygium* communiciren und beim Anziehen und Knoten den Körper des *Pterygium* von der Sclera abbinden. Man schneidet sie nach der Knotung nicht ab, sondern befestigt sie auf der Wange mit Pflasterstreifen. Nach einigen Tagen erfasst man sie, zieht sie an und trägt dann das *Pterygium* ohne Schwierigkeit ziemlich vollständig ab. Reste werden mit Höllenstein geätzt.

Punctio corneae ist ein einfach auszuführendes Operationsverfahren, das früher fast ausschliesslich zur Entleerung von Blut und Eiter ausgeführt wurde, in neuester Zeit aber mit vollstem Rechte eine ausgedehntere Anwendung findet und zwar hauptsächlich bei allen Entzündungen, die durch den *hum. aq.* schmerzhaft erhalten, gesteigert und gefahrdrohend werden. Dies gilt hauptsächlich von *Iritis* und ihren zahlreichen Com-

plicationen bis zur *Panophthalmitis* hin. Bei *Keratocoele* ist man durch rechtzeitige Punction im Stande, der weiteren Zerstörung vorzubeugen. Um den *hum. aq.* zu entleeren, bedarf es der troiquartförmigen Apparate aus früherer Zeit nicht. Eine jede Staarnadel genügt. Man führt sie am Scleralfalze parallel mit der Iris c. 1' tief ein und rotirt sie ein wenig; bei dem Ausfliessen muss man Acht haben, die Iris nicht zu spiessen und nicht tiefer einzugleiten, wobei das Linsensystem gefährdet würde. Um jede Gefahr zu verhüten, kann man an einer gerinnten Nadel 1' von der Spitze zwei s. g. Sicherheitsknöpfe, die weiteres Eindringen unmöglich machen, anbringen lassen. Nach der Entleerung lässt man das Auge geschlossen halten und bei gesteigerter Wärme kalt bähen. — Der Vorthail der Punction bei Blut und Eiter in der Kammer besteht nicht allein in der Entfernung dieser oft dicklichen Flüssigkeiten, die ausserdem in der Regel nur theilweise gelingt, sondern in dem Umstande, dass nach der Entleerung des *hum. aq.* die Resorption des Blutes und Eiters in dem schnell neuentstandenen *hum. aq.* weit schneller von Statten geht.

Pseudocornea und die unter dem Namen *Staphyloma racemosum*, *sphaericum*, *totale*, *partiale* etc. bekannten Grade erfordern der Reizung und Entstellung halber oft die Operation. Im Allgemeinen ist sie dann indicirt, wenn die Volumenzunahme so weit vorgeschritten ist, dass vollkommener Lidschluss nicht mehr möglich ist. In anderen Fällen droht eitrige *Phthisis bulbi* oder der Patient wünscht die Abtragung, um ein künstliches Auge einlegen lassen zu können.

So lange das Sehvermögen noch besteht, ist Curativbehandlung indicirt, die durch entsprechende Aetzung mit Höllenstein und Compressivverband passend unterstützt wird. Butyr. Antim. wirkt zu eingreifend, ebenso können Ligaturen, durch die Basis geführt, und beschränkte Abtragungen nur selten dienlich sein und werden noch seltener als Vorcuren für die Anlegung einer künstlichen Pupille nützen.

Scarpa hat zuerst der Abtragung allgemeinen Eingang verschafft, die er ausführte, indem er ein Staarmesser wie zur Extraction der Linse durchführte, den halbmondförmigen Lappen mit der Pincette erfasste, das Messer nach aufwärts wendete und nun auch die obere Hälfte abtrennte. Die verwachsene Iris wird so zugleich theilweise excidirt, was den Vorthail hat, dass die Entfernung der Linse und eines Theiles des Glaskörpers ohne Schwierigkeit erfolgt. Damit bei gleichzeitiger Verflüssigung des letzteren derselbe nicht ungemessen sich entleere, operirt man gern bei Horizontallage des Patienten.

Eine bequemere Handhabe als die Pincette ist die Fadenschlinge, die einzelne Neuere lieber vor der Abtragung durch den abzutragenden Theil legen.

Um Bulbuszerrungen und die lästigen Augenmuskelkrämpfe zu vermeiden, punctirt *Desmarres* vor der Abtragung den Tumor an einer abhängigen Stelle, um den *hum. aq.* ausfliessen und die *Pseudocornea* erschlaffen zu machen. Dann erfasst er die faltige Membran mit einer kräftig gezähnten Pincette und schneidet mit einer geraden Scheere von Oben nach Unten Alles, was er entfernen will, in einem Scheerenschlage durch und ab. Die Operation ist schnell beendet, das Auge zieht sich hinter die Lider zurück, die nun für mehrere Tage mit Pflasterstreifen geschlossen erhalten werden. Kalte Aufschläge müssen von Minute zu Minute erneuert und ebenso alle antiphlogistischen Mittel angewendet werden, bis keine zerstörende Entzündung mehr zu befürchten ist. — Soll ein künstliches Auge getragen werden oder nicht, so ist es für die meisten Fälle am geeignetsten, den Schnitt so zu führen, dass der Bulbus nach geschehener Narbenbildung auf $\frac{3}{4}$ seines normalen Volumens verkleinert ist. Man darf desshalb nicht, wie es sonst richtiger Grundsatz ist, nur im gesunden operiren, sondern muss meistens auch einen Rand der *Pseudocornea* stehen lassen. Die Linse lasse man nicht zurück, da sie nur der Eiterung Vorschub leisten und der Vernarbung Eintrag thun würde. Doch entleere man den Glaskörper auch ja nicht zu sehr, da die Augenmuskeln auf die entleerte Bulbushülse ohne Einfluss sind und schliesslich mit ihr atrophiren. Geht der Operationsschnitt durch die Muskelinsertionen, so bösst ebenso der Stumpf und mit ihm die nach c. 2 Monaten vorzusetzende Augenscheibe die Beweglichkeit, die sich sonst der des gesunden Auges associirte, ein.

Mässiger Bluterguss schadet nicht, zu heftiger muss durch Kälte und Compression verringert werden. Reichlicher Bluterguss pflegt den des Gegendrucks beraubten und desshalb zerrissenen Choroidealgefässen zu entstammen. — Ehe die Narbe so dicht ist, dass keine Strahlen sie durchdringen, kommt die Retina für die Unterscheidung von Hell und Dunkel wohl wieder vorübergehend in Function.

Scarrification der Binde- und Hornhaut ist schon von *Hippokrates* empfohlen und ohne Zweifel in allen Zeiten geübt worden, ohne indess grosse Empfehlung zu verdienen. Flügelfell, Pannus, neugebildete Gefässe, Reizlosigkeit der Membranen äussern auf blosser Scarrification meist nur sehr geringe Wirkung. Bei Chemosis, Eiter-, Lymphe- und Blutansammlungen unter der Conj. ist es sicherer, mit der Hohlscheere eine angemessene Falte abzutragen.

Behufs Entfernung in die Hornhaut eingedrungenen fremder Körper stellt sich der Arzt am besten hinter den dem Lichte zugewendeten Patienten, öffnet und fixirt mit Zeigefinger

und Daumen das Auge und sucht den Körper mit einem *Beer'schen* Spatel oder einer Staarnadel zu luxiren und hervorzuheben. Splitter spiesst man, wenn sie nicht mit feinen Pincetten zu erfassen sind, mit einer Sichel-nadel, deren schneidender convexer Rand nach Aussen gerichtet ist, und drängt nach der Eingangsöffnung zurück, indem man zugleich den Stichcanal, der bald wieder verheilt, aufspaltet. — Ist der fremde Körper in den Kammerraum gedrungen, so macht man einen Einschnitt wie zur Linearextraction und zwar von der Grösse, welche zum Durchtritt des Körpers ausreicht, und entfernt ihn mit einer feinen Pincette oder dem *Luer'schen* Instrumente. Sitzt der Körper im Bereiche des Linsensystems, so entfernt man gleichzeitig die Linse durch Extraction. — In's Auge geflogene Insecten entfernt man am besten mit einem in einen spitzen Winkel zusammengefaltetem Papierstückchen, mittelst dessen man das Insect nach dem inneren Augenwinkel hinschiebt.

Die *Abrasio corneae* bei Incrustationen in der Cornea, die Kerectomie bei massenhafter Exsudation auf die Hornhaut (*v. Hasner*), die Excision leucomatöser Flecke (*Dieffenbach*), die Keratoplastik (*Himly, Reisinger, Wutzer*) sind sämmtlich Operationsversuche von ebenso zweifelhaftem Werthe, als die von *Nussbaum* projectirte Einheilung einer Glaslamelle in die absolut verdunkelte Cornea. Ihnen reiht sich das *Autenrieth'sche* Experiment an, von der Sclera eine so starke Schicht abzutragen, dass dem Lichte Zugang zur Retina möglich sei. — Von der *Abrasio corneae* sollen *Malgaigne, Galz* u. A. Erfolg gehabt haben (?). Ich habe in mehreren scheinbar sehr geeigneten Fällen diese schabenden Schnitte mit feinen Messern sehr sorgfältig ausgeführt — ohne den geringsten Erfolg und auch von anderen Operateuren keine befriedigenderen Resultate erfahren können. — *Dieffenbach* führte hinter einem prominenten Centraleukom einen Faden durch die Kammer, excidirte darauf das Leukom durch 2 Bogenschnitte, knüpfte den Faden und heilte die Wunde günstig, ohne indess dem Patienten sonderlich geholfen zu haben. — Die *Keratoplastik*, d. h. die Implantation einer durchsichtigen Thiercornea ist wohl gelungen, doch hat sich die implantirte Cornea stets sehr schnell getrübt.

Cataracta zu beseitigen erfordert einen operativen Eingriff, der an sich so einfach ist, dass er schon vor *Celsus* Zeiten, als man weder die Anatomie des Auges noch den Sitz des Staares kannte, mit Erfolg ausgeübt wurde. *Antyllus* und *Lathyrion* sollen die Extraction vollzogen haben, *Celsus* beschreibt ein durchaus rationelles Verfahren, wie es wahrscheinlich schon in der *Alexandrinischen* Schule ausgeübt worden ist, um die getrübt Linse von der Hornhaut aus mit einer geraden, runden Nadel zu deprimiren oder nöthigenfalls zu zerbröckeln.

Von der Geschichte dieser Operation und einer Kritik der zahlreichen älteren Methoden muss um so mehr Abstand genommen werden, als ein solcher Excurs, abgesehen von der rein praktischen Tendenz dieses Werkes, viel Raum erfordern oder unvollständig bleiben würde. Ich gebe deshalb einfach eine Darstellung der noch üblichen Methoden, um eine kurze Kritik derselben mit der Indicationslehre zu verbinden.

Bei der Ausführung der Aufgabe der Operation, die getrübte Linse aus der Sehaxe zu entfernen, damit die Lichtstrahlen wieder zu der Netzhaut gelangen können, wird die Linse entweder gänzlich aus dem Auge entfernt, *Extraction*, oder sie verbleibt im Auge, *Dislocation*, indem sie aus der Axe gelagert (*Depressio*, *Reclinatio*) oder zerbröckelt und der Resorption überwiesen wird (*Discisio*).

I. Extraction.

Der Staar wird entweder nach Abtrennung der halben Cornealperipherie in einem Stücke entfernt (Lappenoperation) oder er wird nach Lineareröffnung der Hornhaut zerstückelt und in einzelnen Fragmenten hervorgeholt (Linearextraction).

a) Lappenoperation. Der Lappen, welcher genau aus der halben Hornhaut bestehen muss, da dann die Oeffnung für den Durchtritt der Linse gross genug ist und doch keine Gefahr eintritt, dass der Lappen sich umlege, wird entweder aus der oberen oder aus der unteren oder aus einer Seite der Hornhaut gebildet (*Keratomia superior, inferior, obliqua*). Die *Kerat. sup.* hat den Vorzug, weil bei ihr der *hum. aq.* nicht leicht vollständig abfließt, Iris und Glaskörper weniger leicht verfallen, besonders weil die Verheilung des Lappens durch das Unterlid, durch Conjunctivalfalten und durch Secrete, die in die Wunde treten können, nicht wie bei *Kerat. inf.* erschwert werden. Doch ist sie insofern schwieriger, als der Bulbus nach geschehenem Einstich gern nach Oben ausweicht und durch das Instrument beim Ausstich und Durchschnitt zugleich fixirt werden muss. Die Ausführung ist übrigens bei allen drei Methoden fast dieselbe, nur dass das Messer entweder mit der Schneide nach Unten oder nach Oben eingesetzt wird. Erforderniss ist, dass der Einstichspunkt dem Ausstichspunkte genau gegenüberliege. Der Patient wird nach 2—3 Stunden vorhergeschehener Einträufelung von Atropine (gr. 4 in unc. 1) am besten in bequeme Rückenlage gebracht mit etwas erhöhtem Kopfe, den ein Assistent zugleich mit einem Lide fixirt. Ist der Bulbus sehr unruhig, so wird entweder der Patient chloroformirt oder der Bulbus vom Assistenten mittelst einer Schraubenpincette, mit der eine Conjunctivalfalte erhoben wird, festgehalten.

Instrumente: 1) Staarmesser (*Beer*), das ein dünnes, achtkantiges Heft und eine $1\frac{1}{2}$ Zoll lange Klinge hat. Der

Rücken ist $1\frac{1}{2}$ Linie von der Spitze schneidend und verläuft dann gerade und stumpf bis in das Heft, die Schneide läuft schräg bis zu $3\frac{1}{2}$ —4 Linien vom Rücken und geht dann in einem stumpfen Winkel in das Heft über. Die Seitenflächen sind schwach convex, die grösste Dicke liegt dem Rücken näher als der Schneide.

2) David's Löffel; derselbe besteht aus einem dünnen, runden Silberstabe, dessen stumpfes vorderes Ende $2\frac{1}{2}$ —3 Linien weit löffelartig gestaltet ist und am vordern Ende des Griffes einen Spatel oder ein s. g. Cystotom trägt, d. h. ein staarnadelähnliches Instrument zur Eröffnung der Linsen kapsel.

3) Ein kleines geknöpftes (*Desmarresches*) Messer zur etwa nöthigen Vergrösserung des Lappens.

4) Ein Lidhaken (*Pellier*), aus Silberdraht so gekrümmt, dass zwei c. $\frac{3}{4}$ '' von einander entfernte, parallele Theile, die gebogen in einander übergehen, einen fast rechten Winkel bilden; endlich

Englisches Pflaster, Schwamm etc.

Nachdem das andere Auge verklebt ist und der Assistent das eine Lid fixirt hat, fixirt der Operateur das andere Lid, lässt den Patienten gerade aussehen, um den Bulbus nöthigenfalls so mit der als Ophthalmostat dienenden Pincette festhalten zu lassen, ergreift nun das Messer und zwar so, dass es wie eine Schreibfeder $\frac{1}{2}$ Zoll vom Heft von dem Daumen und den zwei ersten Fingern gehalten wird, und nähert es dem Auge, um zuerst den stützenden kleinen Finger entsprechend auf die Wange zu legen. Der Goldfinger wird passend eingeschlagen. Darauf wird das Messer auf der gewählten Einstichsstelle parallel mit der Iris eingesetzt, fest und ruhig durch die Cornea geführt und, nachdem man die Spitze in der Kammer sieht, wobei gewöhnlich schon ein Tropfen *hum. aq.* am Messer abläuft, die Ausstichsstelle fixirt und nun das Messer in der Richtung auf dieselbe so vorgeschoben, dass man zugleich die Schneide genau beobachtet und so eindringen lässt, dass sie die Iris nicht verletze und genau in dem Cornealringe durchschneide. Sobald die Messerspitze den Ausstichspunkt erreicht und durchdrungen hat, beherrscht das Messer die Bewegungen des Bulbus vollständig, wesshalb die Pincette entfernt werden kann, doch darf man nur mit dem Messerrücken, nicht mit der Schneide auf den Bulbus wirken. Das Messer wird ohne Säumen nun weiter durchgeschoben, wodurch der Lappen bis auf eine Brücke von 1—2 Linien Länge abgelöst wird. Die Brücke trenne man durch Zurückziehen des Messers und zwar langsamer, um Linse- und Glaskörpervorfall zu verhüten, die in diesem Momente am häufigsten eintreten. Nach gebildetem Lappen ist der erste Act vorüber, es werden beide Lider sanft über den Bulbus gesenkt und dem Auge einige Momente Ruhe gegeben.

Der zweite Act beginnt damit, dass man die Lider vorsichtig wieder erhebt, das Cystotom unter dem Lappen an den Bulbus anlegt und ziehend, nicht schiebend hinter den Lappen bringt, bis die Spitze vor die Linse gelangt. Die Kapsel derselben wird darauf durch geringe Einsenkung der Spitze horizontal oder senkrecht, nöthigenfalls auch kreuzförmig gespalten und das Instrument ebenso vorsichtig entfernt. Folgt nun die Linse nicht, so befördert man den Austritt durch gelindes Andrücken des *Daviel'schen* Löffels an den unteren Theil des Bulbus und benutzt darauf sogleich den Löffel weiter, indem man ihn wie das Cystotom hinter den Lappen bringt, um abgestreifte Corticalsubstanz aus dem Auge zu befördern. Luftbläschen, Blut, Schleim u. dgl. entfernt man, indem man mit dem Löffel noch einige streichende Bewegungen über den Lappen ausführt. Ehe man nun das Auge mit englischem Pflaster verklebt, sieht man genau zu, ob nicht noch Reste der Linse oder aufgerollte Kapseltheile in der Sehaxe liegen, die man mit Hähchen, Pincette oder besser dem *Luer'schen* Serre-tête (oder Pince capsulaire) ergreife und extrahirt. Dies Instrument besteht aus einer feinen Nadel, die sich vorn in zwei federnde, stumpfe Branchen spaltet, die mittelst einer, die Nadel einschliessenden, verschiebbaren, feinen Hülse zum Schluss, resp. zum Ergreifen sehr kleiner Körperchen im Auge gebracht werden können. Da fast stets die Kapsel cataractöser Linsen nur lose der *Hyaloides* anhaftet und sich meist auch ohne Zerreissung der beiden Strahlenplättchen-Lamellen von derselben ablösen lässt, so kann man der Gefahr eines s. g. Nachstaares entgehen, wenn man mittelst dieses *Luer'schen* Instrumentes die Extraction lästiger Kapselfragmente wenigstens noch versucht. Erst wenn man sich überzeugt hat, dass Nichts in der Sehaxe zurückgeblieben ist und die Wundränder rein und genau aufeinanderliegen, decke man englisches Pflaster auf, über das noch collodirte Taffetstreifen gelegt werden können, die sich durch Thränen und Blut nicht abtrennen lassen.

Seheversuche sofort anzustellen, hat keinen rationellen Zweck. Man lasse den Kranken in Rückenlage und absoluter Ruhe, überhänge das Auge mit einer einfachen Leinencompresse und lasse einen Schirm tragen. Das Zimmer sei mässig temperirt und jedem Licht oder Lufteinflusse entgegen. Der Kopf muss wenig erhöht liegen, die kalten Aufschläge müssen dem Grade der erhöhten Wärme entsprechen. Ohne den Bulbus zu reizen, muss das Auge doch täglich wiederholt untersucht und gereinigt werden. Die Nahrung sei einfach, für gehörige Oeffnung ist durch Clystire zu sorgen. In der Weise verbleibt der Patient mindestens vier, höchstens fünf Tage, worauf sodann die Pflaster losgeweicht, die Collodiumstreifen durchschnitten und das Auge bei abgedämpftem Lichte untersucht wird.

Ueble Ereignisse vor, während und nach der Operation, auf die man gefasst sein muss, sind:

1) Augenmuskelkrampf und die damit verbundene Unruhe des Bulbus, so dass man nicht zum Einstich gelangen kann. Man warte einige Momente oder lege die Seitenfläche einen Moment vor die Cornea und benutze dann schnell die augenblickliche Ruhe, bis man den Bulbus durch das richtig eingedrungene Messer in seiner Gewalt hat.

2) Falscher Einstich muss sofort verbessert oder dadurch corrigirt werden, dass, wenn er zu hoch liegt, man um ebensoviel tiefer aussticht, wenn er zu tief liegt, man um so höher aussticht. Gleitet die Spitze in die Iris oder legt sich die Iris vor die Schneide, so muss man sofort die Lage und Bewegung des Messers entsprechend ändern; wenn das Messer statt in die Kammer zu dringen, in der Hornhautsubstanz verbleibt, so muss es sofort zurückgebracht und richtig durchgeschoben werden.

3) Falscher Ausstich würde einen fehlerhaften Lappen geben und kann bei sehr unruhigem Bulbus am besten dadurch vermieden werden, dass man die Spitze, wenn sie die innere Ausstichsstelle berührt, nicht gleich durchschiebt, sondern zuvor einen Moment anlehnt, bis man sich überzeugt hat, dass man die rechte Stelle getroffen hat. Ist der Lappen zu klein, so warte man einen Augenblick, ob die Linse nicht doch vorgeleitet, was oft geschieht; im andern Falle fasse man den Lappen vorsichtig mit der Pincette, wende das Messer und vergrössere ihn nach der Seite der operirenden Hand. *Desmarres* rath, für diese Nachoperation sein kleines geknöpftes Messer zu nehmen, Andere ziehen es vor, die Vergrösserung des Lappens mit einer *Louis'schen* Scheere auszuführen. (Dieselbe ist einfach eine s. g. *Cooper'sche* Hohlscheere im verkleinerten Massstabe).

4) Contraction der Iris erfolgt selten in Folge des Wundreizes, doch kann die Pupille für grosse Staare zu eng sein, in welchem Falle man am besten ein einfaches Augenhäkchen in die Linse einsenkt, um durch gelinden Zug den Durchtritt zu befördern. Widersteht die Iris, so muss man eine kleine geknöpfte Kniescheere (*Maunoir*) einsetzen und die Iris incidiren.

5) Glaskörpervorfall ist eines der übelsten Ereignisse, da er den ganzen Operationserfolg vereiteln und zur Vereiterung und Atrophie führen kann. Kleine Parteen gehen wohl wieder durch schnell bewirkte Rücklagerung zurück, auch können sie mit der Hohlscheere mitunter ohne Nachtheil abgetragen werden, Da aber in der Regel Verflüssigung des *corp. vitr.* an diesem Unfall Schuld ist, so pflegt das Auge verloren zu gehen. Besonders aus dieser Rücksicht operiren die Meisten am liebsten in der Rückenlage des Kranken, die indess auch nicht immer vollständig vor Vorfall sichert. — Drängt sich nur wenig

Glaskörpersubstanz so vor, dass dadurch eine genaue Vereinigung der Lappen unmöglich wurde, so säume man nicht, dieselbe mit dem Löffel zurückzubringen, oder, wenn die Reposition misslingt, ihn mit der Scheere abzutragen. Ohne diese kleine Vorsicht kann Eiterung und *Panophthalmitis* eintreten; selten klemmt die Cornealvernarbung die prolabirte Partie ohne Nachtheil ab.

6) Vorfall der Iris kann ebenso von grösstem Nachtheile sein. Wenn gelinde Reize, z. B. Reiben des geschlossenen Auges mit dem Finger, vorsichtiges Betupfen der prolabirten Partie mit zugespitztem Höllenstein die Reposition nicht bewirken, so muss man sich zur Abtragung des Prolapsus mit der Hohlscheere entschliessen, wornach allerdings eine difforme Pupille zurückbleibt, aber doch keine Abeitung des Lappens entsteht.

b) *Linearextraction*. Dieses Verfahren, bei dem aus einer 1—4''' grossen Oeffnung die Extraction des Staares bewirkt wird, ist nur bei weichen oder hülsigen Staaren anwendbar, dann aber wegen der geringeren Verwundung vorzüglich. In ähnlicher Weise werden in die Kammer gedrungene Metallsplitter, Entozoen, Nachstaare u. dgl. entfernt. Um periphere weiche Staare zu entfernen, dringt man mit einem s. g. Lanzennesser, das zwei von der Spitze schräg ablaufende Schneidekanten hat, c. 1''' vom Scleralrande durch die Cornea direct auf das Linsencentrum ein, so dass die Kapsel eröffnet wird und die weiche Corticalsubstanz austreten kann. Beim Zurückziehen des Messers hebt man eine Schneide in einen Wundwinkel, um die innere Wunde zu vergrössern, die $2\frac{1}{2}$ —3''' gross sein muss, achtet aber darauf, dass man die Iris nicht verletze oder mit hervorzerre. Darauf führt man den Löffel, mit der Convexität nach Aussen ein und luxirt die Linse hervor. Reste entfernt man erst, wenn nach einer kleinen Pause sich wieder *hum. aq.* angesammelt hat. — Kapselreste und dergleichen entfernt man durch solche Lineareinschnitte mit einem *Beer'schen* Häkchen oder besser mit der *Serre-tête*, jedoch mit grösster Vorsicht, da allzuleicht auch Iris gefasst und mit vorgezogen wird. — Um trockenhülsige Staare auf diese Weise zu extrahiren, lege man den Schnitt dem Staare gegenüber an, dringe aber mit der Spitze nicht ein, um nicht möglicher Weise die vorgelagerte tellerförmige Grube zu verletzen.

Zusätzlich geschehe hier der mit der Extraction oft gleichzeitig nothwendigen Koremorphose Erwähnung, die bei *Synechia posterior* (*Catar. accreta*) nothwendig werden kann. In der Rückenlage des Patienten wird die Hornhautcircumferenz nur zu $\frac{2}{5}$ getrennt, da diese Staare meist weich sind, und das Messer ein bis anderthalb Linien durch die Iris geführt, so dass zugleich Iris- und Hornhautlappen gebildet wird. Am besten wird nun zuerst der Irislappen in einer für die künst-

liche Pupille hinreichenden Grösse vorgezogen und abgetrennt und darauf die Extraction des Staares bewerkstelligt. — Viel specielle Regeln lassen sich für diese den mannichfaltigsten Ereignissen unterworfenen Operation nicht aufstellen. (Cfr. Koremorphosis.)

Die Extractio per sclerotomiam ist ebensowenig wie die *Desmarres'sche* Dislocatio per scler. praktisch von irgend einem Werthe. Glaskörpervorfall, Collapsus des Bulbus, Faltung der Iris und Cornea bleiben nicht aus, meist ist Atrophie das Resultat solcher unnöthigen Operationswagnisse und Künsteleien¹⁾.

II. Dislocation.

Ohne Einschnitt in Sclera oder Cornea wird mittelst einer Nadel die erste oder die andere Membran durchbohrt und der Staar sofort aus der Sehaxe gelagert. Durchbohrt man die Sclera, so nennt man das Verfahren *Scleroticonyxis*, durchbohrt man die Cornea *Keratonyxis*, wird der Staar zugleich zerschnitten, *Discisio*.

¹⁾ Der Laugier'schen, seit 1847 bekannt gewordenen Aspirationsmethode kann füglich nur sub linea Erwähnung geschehen. Ein im Heft mit einer Saugpumpe versehenes Instrument trägt eine gerade Hohnadel, die sich in einer der Spitzenflächen öffnet und zur Einführung in die Linse per scleram bestimmt ist. Am untern Heftende befindet sich eine die Pumpe in Function setzende Spiralfeder, die durch einen kleinen, ebenfalls gefederten Hahn fixirt ist, bis nach Anbohrung des (flüssigen oder weichen) Staares der kleine Finger den Hahn loslässt und nun die Staarmasse in Folge der Saugkraft „wie durch Zauber“ (Seitz) in den Nadelcanal verschwindet und das natürliche Augenschwarz sichtbar wird. — Die Resultate waren hinlänglich ungünstige und nicht bloss, weil zur Entstehung von Nachstaar alle Requisite vorhanden sind, sondern zumeist weil die durch eine losschnellende Feder plötzlich wirkende Saugkraft nicht mehr eine dem Willen des Operateurs unterworfenen Kraft, sondern ein gewaltthätiger, stürmischer Insult ist, der am Auge überhaupt unstatthaft ist und durch den plötzlich im Auge entstehenden Substanzverlust einen freien Raum erzeugt, den der vom Muskelapparate und der nach Innen zu elastisch wirkenden Sclera angeregte Glaskörper sofort auszufüllen strebt, wobei Retina und Choroidea nicht bloss wie durch einen Stoss erschüttert, sondern auch aus ihrer Lage gerissen und in die allergrösste Gefahr versetzt werden.

An dem von Seitz (l. c. p. 519) erwähnten 22jährigen Burschen, der nach der Laugier'schen Aspiration bilaterale Atrophia bulbi davontrug, hätte man in den Tagen nach der Operation gewiss durch Spiegeluntersuchung wenigstens viel lernen können. — Harte und häutige Staare etc. wird man gewiss nicht durch Saugen auf der offenen Spitzenfläche fixiren zu können meinen, um sie sodann gemächlich aus der Sehaxe zu lagern; aber man wird den Glaskörper ansaugen! — Hum. aq. entleert man durch einfache Punction ohne Zweifel sicherer und ob Hypopyum mit dicklichem Eiter besser durch Aspiration als durch lineare Eröffnung beseitigt wird, bleibt vorderhand ebenfalls noch sehr fraglich.

Ueberhaupt möchte die Laugier'sche Aspiration nur als eine Ballhorn'sche Modification der schon von den Alten geübten Aussaugung des Staares zu bezeichnen sein. Federkräfte — auch die der Laugier'schen, Pecchielischen und Furnarischen Schreibfedern — sind bei so zarten Organen, wie das Auge, nicht am Platze. Wohl aber habe ich einige Male bei der schwierigen Entleerung dicklichen Eiters eine einfache Hohnadel gut gebrauchen zu können geglaubt, um den Mund als einen meinem Willen unterworfenen Saugapparat anzusetzen. An einer solchen Nadel müsste das Mundstück im Winkel abgebogen sein und an dem Winkel ein Recipient für die auszusaugende Flüssigkeit sich befinden.

Nadeln hat man sehr überflüssiger Weise unzählige, angeblich verschiedene, angegeben, da in geschickter Hand die einfachste genügt und es viel mehr auf die Güte des Stahls, als auf die Form der Nadelspitze ankommt. Das Heft sei achtkantig, damit es leicht zwischen den Fingern rotirt werden könne, und an einer Kante markirt, damit, wenn man es nicht weiss, an der Marke noch gesehen werden kann, welche Lage die eingeführte Nadelspitze hat. Für *Keratonyxis* sei die Nadel feiner und kürzer, für *Scleroticonyx* länger und stärker. Sie darf von der Spitze nach dem Hefte zu nicht anschwellen, damit sie sich bei der tieferen Einführung nicht in der Einstichsöffnung einklemme. Ebenso darf sie nicht zu dünn werden, damit nicht der *humor aqueus* vorbei abfliessen oder auch Gefahr des Abbrechens entstehen könne. Ueberhaupt ist bei der Anfertigung der Spitze zu beachten, dass sie an einer gleichmässig starken, runden Nadel erst nach geschehener Abflachung angeschliffen werde, um eine so weite Oeffnung zu bohren, als für den Körper der Nadel erforderlich ist. Erst dann wird die Nadel in geschmolzenem Blei gehärtet, um die erforderliche Festigkeit und Biegsamkeit zu erhalten. Die zweischneidige Spitze ist entweder gerade (*Beer*) oder über die Fläche ein wenig gebogen (*Jüngken*) oder über eine Schneidekante sichelförmig gebogen (Sichelnadel von *Langenbeck*). Alle übrigen Modificationen kann man getrost der Historie überweisen. Die gerade Nadel eignet sich überall, die gebogene soll das Schonen der Iris erleichtern und sich besser bei Depression auf die Linse legen, mit der Sichelnadel glaubt man besser schneiden zu können.

Die Staarnadel wird wie das Staarmesser gefasst, aber, was sehr wichtig ist, nach der Einführung nur zu Hebelbewegungen benutzt, wobei die Einstichsöffnung als das Hypomochlion dient, um das alle Bewegungen ausgeführt werden. Das Heft muss also, wenn die Nadel nach Unten wirken soll, nach Oben, d. h. immer entgegengesetzt bewegt werden, ohne dass die Einstichsstelle dabei im Geringsten gedrückt und gezerrt wird. Ueberhaupt ist es Erforderniss, die Staarnadel mit schwebender Leichtigkeit zu handhaben, ohne dass dadurch der Sicherheit ihrer Bewegungen der geringste Eintrag geschehe. Bei gehöriger Aufmerksamkeit und vorschriftsmässiger Beleuchtung ist die Gefahr, die Iris zu spiessen, nicht gross, doch kann man sich, um sicherer zu gehen, einer mässig über die Fläche gekrümmten Nadel bedienen und deren Spitze beim Vorschieben in die der Iris entgegengesetzten Richtung bringen. Mit der concaven Spitzenpartie fasst man die Linse zur Dislocation auch einigermaßen sicherer und fester.

A. *Scleroticonyx*. Die Nadel wird in der angegebenen Weise mit der Spitze senkrecht auf die Convexität des Bulbus gesetzt und zwar etwas oberhalb oder unterhalb von dem Quer-

durchmesser, um die langen Ciliararterien mit einiger Sicherheit zu vermeiden, und c. $1\frac{1}{2}$ Linien vom Hornhautrande entfernt, um den ringförmigen inneren Muskelapparat, der die Linse trägt und accommodirt, nicht zu verletzen. Dabei müssen die Schneidekanten nach beiden Seiten gerichtet sein, um zwischen Gefässen und Muskelfasern (vom *m. rect. ext.*) durchzugleiten, ohne mehr, als unvermeidlich ist, zu zerschneiden. Bedient man sich einer über die Fläche gekrümmten Nadel, so muss man beim Einstich hierauf Rücksicht nehmen, um direct durch die Sclerotica zu dringen und nicht zwischen den Häuten einen Canal zu bohren. Die Sichelnadel setzt man so ein, dass die Convexität nach dem Gesichte gerichtet ist und bringt während des Durchgehens das Heft nach Vorn, macht also mit demselben eine der Sichelform der Spitze entsprechende Bewegung.

Man fühlt es bei einiger Uebung und Aufmerksamkeit sofort, wenn die Nadelspitze die Sclera durchdrungen hat. Der Umstand, dass man es auch an der bis zu einem gewissen Punkte unsichtbar gewordenen Nadel absehen kann, wird besser für die Praxis nicht als massgebend betrachtet. Erst nach für sich vollendetem Einstich wird die Nadel der besonderen Absicht gemäss, die man durch die *Scleroticonyxis* erreichen will, weiter vorgeschoben. Ebenso muss das Zurückziehen der Nadel nach der Operation mit derselben Aufmerksamkeit und gewissermassen als besonderer Theil der Operation ausgeführt werden.

Der Kranke sitzt etwas tiefer als der Operateur und zwar so, dass das Kinn des Letzteren in gleicher Höhe mit dem zu operirenden Auge sich befindet und reflectirtes Tageslicht über die Nase in dasselbe günstig beleuchtend einfällt. Der hinter dem Patienten stehende Assistent legt die gleichnamige Hand auf den Kopf und fixirt das Oberlid, während die andere Hand auf das Kinn des Kranken zu liegen kommt. Der Operateur prüft nun die Nadel nochmals und zwar dadurch, dass er untersucht, ob sie ohne Krachen durch ausgespanntes Goldschlägerhäutchen geführt werden kann. Das linke Auge wird mit der rechten, das rechte mit der linken Hand operirt. Der Zeigefinger der freien Hand fixirt das Unterlid am Orbitalrande, während der Mittelfinger bereit bleibt, nöthigenfalls den zu unruhigen Bulbus durch entsprechenden Druck zu beruhigen. Ist der Patient sehr ungeberdig, so muss er chloroformirt werden, wenn man es nicht vorzieht, auch die Fixirung des Unterlides der am Kinn liegenden Hand des Assistenten zu übergeben und selbst mit der nicht operirenden Hand ein Häkchen oder eine Pincette als Ophthalmostaten anzulegen.

a) *Depressio per scleram.* Man bedient sich einer schwach gekrümmten Nadel und setzt sie c. $\frac{1}{4}$ Linie über dem Querdurchmesser mit der Convexität nach Oben ein, vollendet den Einstich schnell, bringt nun die Convexität nach Vorn

und schiebt die Nadel fest und ruhig zwischen Linse und Iris vor, bis sie sich präsentirt. Nun (2. Act) senkt man das Heft so weit, dass die Spitze der Nadel bis an den oberen Linsenrand steigt, und rotirt zugleich nach Innen, so dass sich die Concavität der Nadel über den Rand legt. Darauf wird zuerst durch schwache Hebelbewegungen ein wiederholter leiser Druck auf die Linse ausgeübt, um sie womöglich mit der Kapsel aus ihren Verbindungen zu lösen, und dann mittelst einer senkrechten Hebung des Heftes Nadel und Linse bis hinter den Pupillarrand der Iris gebracht und einige Augenblicke pausirt. Mit einer halben Drehung wird nun die convexe Nadelfläche auf den Linsenrand gebracht und durch sanften Druck die allseitig gelöste Linse tiefer unter den Glaskörper deprimirt, so dass der Rand nach Vorn und die Hinterfläche nach Oben gerichtet ist. Man darf diesen Theil der Depression besonders nicht mit einiger Gewalt ausführen, da dann die Linse sofort einen zu Entzündung Anlass gebenden Druck auf die Choroidea ausübte, oder doch so unmittelbar auf ihr zu liegen käme, dass für spätere Zeit, wahrscheinlich in Verbindung mit der Linsenresorption, eine nachtheilige Wirkung auf die Choroidea die Folge sein könnte. Einige neuere Autoren halten die Gefahr einer solchen Secundärerkrankung ohne Zweifel für grösser, als sie ist. Darf man nach c. $\frac{1}{4}$ Minute annehmen, dass sich der vor der Linse verdrängte Glaskörper wieder über der Linse zusammengelegt habe, um das Wiederaufsteigen zu verhüten, so zieht man die Nadel behutsam bis vor die Spitze direct an die Einstichsöffnung zurück, da man durch blosses Heben den Glaskörper wieder trennen und das Aufsteigen der Linsen befördern würde, und präsentirt sie nun zum zweiten Male in der Pupillarfläche, um sich zu überzeugen, dass die Depression vollständig gelungen ist und nicht sofort wiederholt zu werden braucht. Erst dann zieht man die Nadel aus und zwar mit denselben Bewegungen wie beim Einstich und verklebt nun das Auge.

Zu den nennenswerthen Varianten gehört, die präsentirte Nadel um die obere Linsenhälfte herumzubewegen, um sie gewissermassen mit der Kapsel loszuschälen und erst dann zu deprimiren. *Cunier's* und *Desmarres* Modificationen haben in Deutschland wenig Nachahmung gefunden. Bemerkenswerth ist aber noch, wenn diese Methode ausgeführt werden soll, dass man nach der ersten Präsentation der Nadel wenigstens einen Längsschnitt über die möglicher Weise feste vordere Kapsel führe, um deren weiteres Zurücktreten aus der Sehaxe zu begünstigen. Blicke sie intact, so könnte sie ähnlich der *Wachendorfschen* Membran die Pupille überspannen und würde entweder wegen ihr anhaftender Corticalsubstanz oder später durch Faltung und Exsudatanlagerung s. g. *Catar. secundaria* darstellen und eine Nachoperation erforderlich machen.

b) *Reclinatio per scleram*. Sie wird auf zweierlei Weise ausgeführt, entweder nach *Willburg* (1785) so, dass die Nadel auf die vordere Linsenfläche der Art wirkt, dass die Linse in der Axenrichtung umgelegt und ihre Vorderfläche gerade empor, der obere Rand nach Hinten gerichtet wird, oder nach *Scarpa* (1803) so, dass bei derselben Nadelanlage die Linse zur Seite zwischen den äussern und unteren *m. rect.* gelagert und die Vorderfläche der Linse also nach der *glabella frontis* hin gerichtet wird.

Behufs Ausführung der *Scarpa'schen* Methode wird die concav-convexe Nadel $1\frac{1}{2}$ —2'' vom Hornhautrande und c. 1'' unter dem Querdurchmesser des Bulbus eingesetzt und zwar so, dass die Convexität der Nadel nach Oben gerichtet ist, und auf dem kürzesten Wege durch die Sclera geschoben. Sie durchbohrt also *Conj. Sclera*, *Choroid.* und gelangt in das *corp. vitr.*, aus dem man sie mittelst Schläfenbewegung des Heftes durch den Linsenrand hinter die Iris bringt, um sofort eine Rotirung vorzunehmen, welche die Convexität nach der Iris und die Concavität nach der Linse zuwendet. Durch Streckung der drei Finger kommt nunmehr die Nadel zur Präsentation, erfasst nun (2. Act) die vordere Linsenfläche und drängt die Linse, indem das Heft gegen die Nasenwurzel gehoben wird, von Vorn direct nach Hinten in den Glaskörper. Man gebe genau Acht, dass man den Schwerpunkt der Linse fasse, was man durch zuerst nur prüfendes Drücken ermittelt und durch welches man zugleich diejenigen Stellen kenntlich macht, an denen etwa Adhaerenzen mit der Iris stattfinden. Die Iris zieht sich nach diesen Stellen hin, nach denen man nun die nächste Schneidekante der Nadel führt, um diese *Synechia posterior* zu beseitigen. Sobald die zurückgedrängte Linse die hintere Kapsel gespalten und ein wenig in den Glaskörper gesenkt ist, pausirt man wie bei der Depression einige Augenblicke, um die Nadel zu rotiren, so dass sie mit der Convexität auf der Linse liegt und drängt sie nun tiefer in den Glaskörper, so dass sie zwischen den äussern und unteren *m. rect.* zu liegen kommt und ihre Vorderfläche nach der *glabella* richtet. Nach einer kurzen Pause bewirkt man darauf die Zurückziehung nach den bei der Depression angegebenen Grundsätzen.

Die *Willburg'sche* Methode erfordert, dass die Nadel oberhalb des Querdurchmessers eingesetzt werde und zwar so, dass die Convexität nach Unten gerichtet sei. Das Verfahren hat *caet. paribus* den Vortheil, dass es nach vollbrachter Umlegung möglich macht, die Linse noch durch eine rückwärts schiebende Bewegung weiter von ihrem ursprünglichen Sitze zu entfernen und so auch die Befestigungsmittel, welche nach der Reclination die Linse noch, wie den Deckel einer Dose mittelst des Gewindes, mit dem Kapselfalze verbinden, vollständig zu zerstören. Die Gefahr des Aufsteigens durch an-

ziehende Kapselreste ist hierdurch verhindert, ausserdem umgibt Glaskörpersubstanz die entkapselte Linse vollständig (*Arlt*) und fixirt sie leichter in der neuen Lage, doch ist das Rückwärts-schieben in praxi keineswegs sehr leicht ausführbar und möchte oft zu Choroideallaesion Anlass geben. Um dieser Gefahr vorzubeugen, Sorge man jedenfalls die Linse aus der Sehaxe zu lagern, ohne sie indess zu fest in den Grund, wie in einen sichern, gefahrlosen Versteck schieben zu wollen.

Ein sehr wesentlicher Variant der Depression und Reclination ist die von *Jüngken* eingeführte Vereinigung beider, die s. g. *Depressio-Reclinatio*, bei deren Ausführung es leichter ist, die getrübte Vorderwand der Kapsel zu beseitigen und der Linse eine die Integrität des Auges weniger gefährdende Lage zu geben. Hat man durch Depression wie angegeben die Linse unter den Pupillarrand gesenkt, so gleitet man mit der Concavität der Nadel vom Rande auf die Vorderfläche derselben und bewerkstelligt nunmehr eine Umlagerung. Durch glückliche Ausführung dieser Methode werden zugleich alle Verbindungen der luxirten Linse auf das Zuverlässigste gelöst.

Pauli's *Sublatio cataractae* verdient dies Lob nicht. Er incidirte den Glaskörper nach Oben und schob die Linse in diese Incision, weil er irriger Weise annahm, die cataractöse Linse sei stets specifisch leichter, als der Glaskörper, und stiege aus diesem Grunde so häufig wieder auf. — *Hasner* fragt l. c. p. 216 mit Recht: „Wer wird es wagen wollen, die Linse wie das Schwert des Damocles über der Stelle aufzuhängen, aus welcher man sie gebracht?“

Langenbeck reclinirte einige Male so, dass er die Concavität der Nadel auf den oberen Theil der hinteren Linsenfläche aufsetzte und ihr die Lage gab, welche die Linse nach erfolgter Depression einzunehmen hat. Bei dieser Methode ist die Gefahr vor dem sehr üblen Ereignisse, dass die Linse durch die Pupille vorfalle, sehr gross.

Rust hat gerathen, die Linse von Vornbinein zu spiessen, um sie auf der Nadelspitze mit dieser rotiren und durch Rotation recliniren und nach Belieben aus der Sehaxe lagern zu können. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass die aufgespiesste Linse nicht fest auf dem Spiesse haftet, sondern durch Rotation meist sehr bald sich löst und die Nadel in dem entstandenen Canale sich frei bewegen lässt.

c) *Discisio per scleram*. Man bedient sich zu diesem Verfahren mit Vorliebe einer Sichelnadel, die in der angegebenen Weise eingeführt wird, um sodann, wie die älteren Autoren wollen, die Linse selbst in mehrere Stücke zu zerschneiden (*Himly*) oder um nur die Kapsel zu dilaceriren und dem *hum. aq.* für die Resorption Zugang zu der Linsensubstanz zu verschaffen. Nach der älteren Lehre soll die Linse durch 4 Schnitte in acht ziemlich gleiche Theile zerlegt werden, nämlich durch einen

senkrechten, zwei schräge und einen horizontalen Durchschnitt, doch ist es fraglich, ob diese Aufgabe je in der Praxis vollständig gelöst ist. Genug, wenn die Zerkleinerung in 6—8 möglichst gleichgrosse Stücke überhaupt gelingt. Ein grösseres, dem Schnitte ausweichendes Kernstück bleibt in der Regel übrig und muss recliniert oder deprimirt werden. Ein kleines Corticalstück schadet in dem Raume zwischen Hornhaut und Iris meistens nicht, doch ist der Rath, einen Theil der zerstückelten Linse durch die Pupille nach Vorn zu bringen, nicht in jedem Falle unbedingt auszuführen, da Iritis, Cornealtrübung und Vereiterung oder bleibende Sehstörung durch dies Fragment selbst gar zu oft beobachtet worden sind. Man ist, um diesen drohenden Gefahren aus dem Wege zu gehen, nicht selten gezwungen gewesen, das nach Vorn dislocirte Stück sofort oder nach einiger Zeit mittelst Extraction zu entfernen. Ueberhaupt ist die Discision wegen der die Resorption vorbereitenden Auflockerung und Volumszunahme der Fragmente niemals ohne gewichtige Bedenken und selbst wiederholte Punction zur Entleerung des Kammerwassers, durch welche ein der Volumszunahme entsprechender grösserer Raum geschaffen werden soll, — wobei aber auch das Quantum der resorbirenden Flüssigkeit verloren geht, — auch sie genügt keineswegs immer, um mit Entzündung drohende Reizung zu bekämpfen. — Bei Befolgung von *Desmarres* Rathe, mit einer einschneidigen Nadel zu discidiren, um die Iris weniger Gefahr auszusetzen, müssen mehr Bewegungen und Rotationen der Nadel ausgeführt werden. — Die blosse Dilaceration der Kapsel mit einem Häkchen auszuführen, ist nicht sehr zu empfehlen, da es allzuleicht in differenten Organen sich einsetzt und sie verwundet, während derselbe Zweck mit der Nadel wohl ebenso gut ausgeführt werden kann.

B. Keratonyxis. Ueber den Werth des Einstichs durch die Hornhaut sind die Urtheile sehr verschieden. Zu läugnen ist nicht, dass dieselbe auch auf dem rechten Auge ebenso gut mit der rechten Hand ausgeführt werden kann, was für Aerzte, die nur mit dieser Hand zu operiren gewohnt sind, ein grosser Vortheil ist. Die Nadel ist dünner und kürzer, kann übrigens gerade, gekrümmt oder sichelförmig sein. Während der Ellbogen zur Seite gehalten wird und der kleine Finger zur Stütze der Hand dienend auf der Wange aufgesetzt ist, trägt der Daumen $\frac{1}{2}$ Zoll vom Hefte die Nadel, die vom Zeige- und Mittelfinger festgehalten wird. In dieser Haltung bewegt sich die Nadel freier, als wenn sie schreibefederartig gefasst und gehandhabt wird. Der leicht hinderliche Ringfinger wird am besten in die Hand eingeschlagen. Während der Assistent das Oberlid fixirt, wird das Unterlid vom linken Mittelfinger des Operateurs vom Bulbus entfernt gehalten, damit der Zeigefinger erforderlichen Falls die Leitung der Nadel unterstützen kann.

und die übrigen Finger im Gesichte aufliegen. Der Einstich geschieht bei gekrümmter Nadel mit der Convexität nach Oben zwischen dem Centrum der Pupille und dem untern Cornealrande oder c. $\frac{1}{2}$ ''' unter dem Querdurchmesser des Auges und zwar wartet man, um ihn auszuführen, während die Nadel auf dem linken Zeigefinger ruht, einen vollkommen ruhigen Moment des Bulbus ab und sticht dann mit senkrecht auf die Cornealwölbung gerichteter Spitze durch. Das weitere Verfahren ist nunmehr ein verschiedenes, je nachdem man die Linse zu recliniren oder zu discidiren beabsichtigt. Depression lässt sich ohne grosse Insultation der Cornea nicht wohl ausführen, würde auch trotz derselben kaum je mit Sicherheit zu Ende gebracht werden können. — Der Stichcanal darf nie schräg durch die Cornea gehen, sondern stets senkrecht durch deren Substanz.

a) *Reclinatio per corneam*. Die Nadel wird nach vollbrachtem Einstich, von dessen Gelingen Gefühl und Gesicht den Operateur überzeugen, ohne Verzug über den oberen Linsenrand hingeschoben, wobei der Rand selbst in die Nadelconcavität zu liegen kommt. Nun werden, wie bei der Operation durch die Sclera, vermittelst leichter Hebelbewegungen zunächst Luxationsversuche gemacht, durch die es oft gelingt, die Linse sammt der Kapsel aus ihren Verbindungen zu lösen. Dann reclinirt man langsam und stetig die Linse in die Glaskörpertiefe, wobei man genau beachten muss, ob sie nicht vielleicht wegen grösserer Adhaesion an einer Seite nach derselben sich um die Nadel herumzuschlagen droht, so dass der Rand dieser Seite nach Vorn gestellt würde. In diesem Falle müsste man sofort die Nadelstellung etwas mehr nach dieser Seite hin verändern, um den für gleichmässige Reclination geeigneteren Punkt zu treffen. Die gänzliche Herabsenkung in die Tiefe bewirkt man durch Erhebung des Heftes und gleichzeitige Stütze der Nadel am Bulbus mit dem linken Zeigefinger, um die stets sehr gefährliche Quetschung der Hornhautwunde zu vermeiden. Ungefähr $\frac{1}{4}$ Minute verharret die Nadel in dieser Position, dann wird sie vorsichtig von der Linse nach der Einstichsöffnung zurückgezogen und wieder in die Position vor der Reclination gebracht, in der man abwartet, ob möglicher Weise die Linse aufsteigt und das Manoeuvre der Reclination wiederholt werden muss. — Das Ausführen der Nadel geschieht auf dem linken Zeigefinger wie der Einstich.

Einen höheren Einstichspunkt zu wählen, z. B. im Centrum der Pupille, wie *Walther* häufig in Bonn gethan hat, ist deshalb nicht anzurathen, da gar zu leicht eine trübliche Hornhautnarbe, die im Centrum sehr störend wirkt, zurückbleibt. *Ruete's* Rath dagegen, vor der Reclination einen Kreuzschnitt durch die Kapsel zu führen, damit sich die Zipfel leicht zurückziehen könnten und keine *Catar. secundaria* eintrete, ist als begründet anzuerkennen.

Sie ist höchstens da angezeigt, wo wegen *Synechia anterior* keine andere als eine centrale Perforation möglich ist und man ohnehin nur auf einen beschränkten Operationserfolg rechnen darf. Wäre zugleich *Synechia posterior* und *Myosis organica* vorhanden, so müsste man sich zur *Koremorphosis* entschliessen.

b) *Discisio per corneam*. Man gibt der auf dem oberen Linsenrande liegenden Nadel eine Seitendrehung, so dass eine Schneidekante nach Unten gerichtet ist, und führt nun zuerst 4 Schnitte, einen senkrechten, zwei quere und einen horizontalen durch die vordere Kapselwand, bei deren Ausführung die Nadel in der Einstichsöffnung zurück- und wieder vorgleitet. (*Rosas* zieht, um sicherer zu schneiden, eine feine Sichelnadel vor.) Diese Schnitte werden nach vollständiger Zerspaltung der vorderen Kapselwand in 8 Theile tiefergehend durch die Linsensubstanz wiederholt, worauf man den meist festeren Kern reclinirt oder zur Seite legt.

Bei vorderer und hinterer *Synechie* von grosser Ausdehnung ist neuerdings mehrfach eine Variation empfohlen und vielfach (*Dietrich*) ausgeführt worden, die angeführt werden muss. Nach centraler Hornhautperforation durchbohrt man sofort die cataractöse Linse und schneidet in sie hinein ein Sehloch, ohne die Randtheile der Linse im Geringsten zu insultiren. Die ausgelöste Substanz, besonders den Kern, verlegt man in den Glaskörper oder auch in und vor die Pupille und wiederholt die an und für sich wenig eingreifende Operation, so oft es erforderlich ist. Letzteres wird freilich wohl sehr häufig der Fall sein.

c) *Dilaceratio capsulae per corneam* ist eine von *Jäger* eingeführte empfehlenswerthe Modification der blossen Zerschneidung der Kapsel, nach deren Ausführung man die Entfernung der unzerstückelten Linse der Resorptionsthätigkeit des Kammerwassers überlässt. Weil ihr aber wegen der mehrfachen Bewegung der Nadel leicht *Keratitis* folgt und die Sicherheit vor Nachstaar nicht gross ist, indem die selten ganz günstig zerschnittene Kapsel sich gern wieder vereinigt und desshalb die Sehaxe eben nicht frei wird, so wird die Dilaceration besser an Stelle der Discision ausgeführt und zwar so, dass man zuerst mit einem Staarmesser $\frac{1}{2}$ ''' vom Cornealrande einen 2''' langen, querliegenden Schnitt der Cornea beibringt, ohne das Kammerwasser zum Abfluss zu bringen. Darauf führt man ein feines Irishäkchen direct auf das Kapselcentrum ein, fasst die Kapsel möglichst sicher und geht nun mit dem Häkchen wieder aus, indem man durch angemessen vorsichtige Haltung Verfangen desselben in den Wundlippen der Hornhaut verhindert. Besonders bei erheblichen Anlagerungen an die innere Seite der vorderen Kapselwand ist es wünschenswerth ein grösseres Stück so zu entfernen. Das Uebrige überlässt man mit berechtigter Hoffnung auf Erfolg der Resorption des *hum. aq.*

und der Retraction der zerrissenen Kapsel und sei nur bedacht, bei beginnender Aufquellung der Linse sofort zu punctiren und die Punction, so oft es angezeigt ist, rechtzeitig zu wiederholen.

Ueble Ereignisse, welche Nadeloperationen unterbrechen und in ihrem Erfolge mehrweniger beeinträchtigen können, sind:

1) Verletzung eines grösseren Conjunctivalgefässes und Blutaustritt in das Bindehautgewebe ist an sich nicht nachtheilig, da die vollständige Resorption nicht ausbleibt oder die Entleerung ohne Nachtheil vorgenommen werden kann.

2) Schlimm ist Verletzung eines Ciliargefässes, die ohne Schuld des Operateurs eintreten kann, und der Iris, die durch aufmerksame Nadelführung zu vermeiden ist, und zwar um so mehr, als der Blutaustritt in den Kammerraum die angefangene Operation sofort zu beenden zwingen kann oder den Erfolg der ausgeführten gefährdet. Es muss unverweilt antiphlogistisch verfahren werden.

3) Fehlerhafter Einstich wird am sichersten dadurch vermieden, dass die Nadelspitze möglichst nahe am Bulbus den Moment vollständiger Ruhe zum Eingehen erwartet. Ist er geschehen, so zieht man augenblicklich zurück, um richtig einzugehen oder man verschiebt die Operation für einen andern Tag, um inzwischen die Folgen des Fehlers zu bekämpfen.

4) Gleitet die Nadel aus der gutgewählten Einstichsstelle wieder nach Aussen, so muss man, was allerdings schwierig ist, bei dem zweiten Eingehen, genau wieder die gemachte Oeffnung treffen.

5) Wird die Linse gespiess, was durch Ausbleiben des reinen Metallglanzes der Nadel bei der Präsentation unschwer erkannt wird, so sucht man die Nadel durch Rotiren und Retrahiren zu befreien und schiebt sie dann mehr nach Vorn gerichtet von Neuem ein.

6) Die Staarmasse ist sehr weich und kann weder deprimirt noch reclinirt werden. Man discidire sie dann nach den angegebenen Regeln, um sich wenigstens die Möglichkeit eines Erfolges zu sichern.

7) Die Linse ist nur locker befestigt und prolabirt durch die Pupille zwischen Iris und Cornea. Das Ereigniss ist nicht ganz übel, wenn nur ein Linsenfragment prolabirt, da dasselbe wohl vom *hum. aq.* aufgesogen wird, aber sehr schlimm, wenn der Prolapsus die ganze Linse betrifft. Um der mit allgemeiner Vereiterung drohenden Entzündung vorzubauen, ist es am gerathensten, sofort zur *Extractio lentis* zu schreiten. — Anspiesen der Linse, um sie so zurück zu heben, glückt fast niemals.

8) Letzteres ist ebenfalls erforderlich, wenn ein grösseres Nadelstück abbricht. Ein kleines Nadelsplitterchen darf man

zurücklassen, um zu hoffen, dass es durch Oxydation beseitigt werde.

9) Erhebt sich der Staar nach jedem Dislocationsversuche von Neuem, so trenne man etwaige Adhärenzen, die Ursache sind, mit der Nadel oder extrahire den Staar durch Lappenschnitt oder discidire.

10) Unruhige Bewegungen des Bulbus oder des Kopfes, während derer das Oberlid dem Finger des Assistenten entgleiten kann, dürfen den Operateur nicht veranlassen, von der Operation abzustehen, vielmehr spreche er freundlich zur Ruhe und fahre dann fort.

Was die Indicationslehre im Allgemeinen wie im Besonderen betrifft, so bestehen noch zur Stunde über fast jeden Punkt bei den Autoren wesentliche Differenzen, deren vollständige Ausgleichung zumal bei dem so vielfach begegnenden falschen Begriffe von Consequenz auch kaum je zu erwarten ist und die anderntheils in der individuellen Natur jedes therapeutischen Eingriffes begründet sind. Der alte Satz zu operiren, sobald der Staar reif geworden, hat seinen Werth schon dadurch verlieren müssen, dass man eingesehen, Staarbildung sei nicht ein specifischer Process und Staar nicht das blosse Residium dieses Processes, der zu anderweitigen Störungen führen müsse, wenn man den Ort seines Verlaufes, die Linse, vorzeitig durch eine Operation insultire. Präsentirt sich ein Staarkranker zur Operation, so fragen die meisten Operateure nicht, ob der Staar soweit reif sei, dass er lockerer in seinen Verbindungen hafte (*Tavignot* u. A.), sondern ermitteln die Aussenbedingungen für die Operation im Allgemeinen und lassen sich durch die Beschaffenheit des Staares nur hinsichtlich der zu wählenden Methode bestimmen. Und hierin liegt das Richtige; *Hasner* sagt schlagend (l. c. p. 205), die Klugheit allein gebiete, nicht eher zu operiren, als bis das Sehevermögen bis zur Lichtempfindung erloschen ist. Aber wer wird und darf jeden Kranken bis zu diesem oft Jahre ausbleibenden Momente warten lassen, zumal frühzeitige Operation erfahrungsgemäss nicht selten günstigere Resultate liefert, als hinausgeschobene? Ein unglücklicher Ausgang kann den Halbblinden ganz blenden, aber diese Möglichkeit hat nur eine relative Geltung. Desshalb Sorge man, dass jeder örtliche Reiz erloschen, jedes allgemeine Leiden beseitigt, der Körper also übrigens gesund und die Aussenbedingungen günstig seien, und frage dann nicht, ob der Staar Monate, Jahre oder Jahrzehnte gedauert, sondern handle richtig und gedenke des Grundsatzes von *Ambroise Paré*, der bescheiden aussprach: „Je le pansai, Dieu le guarit“. —

Hinsichtlich der Jahreszeit ist nicht bloss Mai und Juni günstig, sondern ausser den heissesten Tagen jede, in der das Wetter beständig ist und keine besonders ungünstige Krank-

heitsconstitution herrscht. Tag und Stunde wähle man für Licht und Nachkur günstig, besser vor Mittag.

Bei einseitigem Staare operire man ohne möglichst sichere Aussicht auf guten Erfolg nicht und lasse mehr den Willen des Patienten entscheidend sein. Bei Staar auf einem Auge und beginnender Linsentrübung in der anderen Linse will man nach der Operation des Staares Rückgang der Trübung beobachtet haben (*Stevenson, Beer* u. v. A.) und hat desshalb die unverzügerte Vornahme der Operation anrathen zu dürfen geglaubt. Auch bei diesem Zustande erforsche man vor dem Entschlusse wohl zugleich den Vortheil des Kranken und den für das Gelingen der Operation, besonders hinsichtlich der übrigen Umstände. — Sind beide Augen staarblind, so operiren die Meisten in einer Sitzung mit Recht beide Augen, doch stehe man von der zweiten Operation ab, wenn irgend welche Gründe einen nicht günstigen Erfolg erwarten lassen, und erhalte dem Patienten und sich die Hoffnung, später wenigstens das andere mit vollkommen günstigem Erfolg zu heilen.

Was das Alter des Patienten betrifft, in welchem die Operation zulässig sei, so erscheint nur das erste und zweite Lebensjahr ausgeschlossen, doch wollen Einige auch vor der Zahnperiode die Operation für zulässig erklären. Die Evolutions- und Involutionszeit des Katamenialflusses lässt man gern vorher vorübergehen, Schwangerschaft an sich contraindicirt nicht. Ebenso wenig hohes Alter. *Cunier* operirte mit Erfolg eine 100jährige Frau, *Skokalski* einen Greis von 103 Jahren.

Grösste Achtsamkeit bei den zur Operation erforderlichen Vorbereitungen kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Der Körper des Patienten ist, wenn man sicher gehen will, im Ganzen und in allen wichtigen Theilen zu durchforschen und eine Vorkur zu arrangiren, wenn irgendwelche Anomalie erheblich genug scheint, um den Operationserfolg schmälern zu können. Mit Entzündung oder Fieber verlaufende Processe müssen vollständig zu Ende geführt werden, Katarrh, zumal mit Hustenreiz verbunden, besonders aber rheumatische Leiden müssen durch Verweilen in geeigneter Temperatur und bei passender Behandlung einige Tage gewichen sein, ehe man zur Operation schreiten darf. Uebrigens ist höchstens ein Clysm bei Neigung zur Hartleibigkeit Tags vorher zu verordnen und die Diät zu reguliren und allenfalls zu schmälern.

Als Vorbereitung am Auge selbst ist es bei sensibeln Patienten gut, das Auge an Berührung mit Instrumenten (Sonde, Stricknadel) einige Tage vorher zu gewöhnen, was häufig überraschend schnell die scheuesten Personen im Ertragen dieser kleinen Insulte übt.

Am besten operirt man, indem man den Patienten einige Zoll tiefer sitzen lässt, als man selbst stehend oder sitzend sich befindet. Für die Extraction ist Rückenlage des Patienten

geeigneter, sowohl um Vorfall des Glaskörpers vorzubeugen, als auch um den Patienten nach der Operation nicht aufstehen und sich wieder niederlegen lassen zu müssen. Ruhiges Verhalten während der Operation ist dem Patienten oft beim ernstesten Willen nicht möglich, wesshalb man entweder die Knie mit einem Tuche zusammenbindet oder Gehülfen beauftragt, die Ruhe des Körpers durch Festhalten zu bewirken. Kinder werden am zweckmässigsten wie Wickelkinder in die Unfähigkeit versetzt, Widerstand zu leisten und von einer starken Person auf dem Schoosse gehalten.

Kann man ohne Ophthalmostaten operiren, so verdient dies den Vorzug, da sie im Allgemeinen die Freiheit der Operation beschränken. Von der Stellung und Thätigkeit des Assistenten war schon die Rede, die Instrumente liegen am besten dem Operateur zur Hand, damit während der Operation jedes Sprechen unnöthig ist.

Chloroform anzuwenden, ist nur in Ausnahmefällen indicirt und muss mit der grössten Vorsicht und bei leerem Magen applicirt werden, da sonst allzuleicht Vomituritionen und Erbrechen die Operation unterbrechen oder den Erfolg vereiteln.

Atropine ist aber nicht zu entbehren. Ich habe einmal erlebt, dass ein Arzt einzig durch Versäumen der kunstmässigen Pupillendilatation zwei reincataractöse Augen vollständig zerstörte. Belladonnaextract pflegte man 1—2 Stunden vor der Operation in solutione (scr. 1 in dr. 2 aq. dest.) einzuträufeln. Atropine (gr. 4 in unc. 1 aq. dest.) instillirt man Abends vorher.

Bezüglich der Methode, der man für den einzelnen Fall den Vorzug zu geben hat, ist die Discussion noch nicht geschlossen. Im Allgemeinen steht fest, dass die Extraction das sicherste Heilverfahren ist, wenn man nicht bloss den nächsten Erfolg berücksichtigt. Gänzlicher Verlust droht häufiger und zwar schon nach wenigen Tagen, wenn die Extraction ausgeübt und misslungen ist, während Nadeloperationen weit seltener von baldiger Zerstörung gefolgt zu sein pflegen. Aber auf letztere folgt häufig, von welcher Thatsache man sich erst in den letzten Jahren aufrichtige Rechenschaft zu geben angefangen hat, in Monaten oder Jahren Erblindung in Folge des Druckes, den die dislocirte Staarlinse auf die Retina und Choroidea ausübt. Schleichende Choroiditis durch Druck heisst diese Erblindung jetzt, die früher als wiederaufgetauchte *Arthritis*, als altes *Rheuma* im Auge bezeichnet wurde und zu deren Entstehung man an die Wirkung der versenkten Linse nicht dachte. Neuere Statistik, welche auch dem späteren Zustand der operirten Augen Rechnung trägt, belehrt uns, dass Extraction die gedeihlichere Methode sei und in solchen Festsetzungen entscheiden wohl mit Recht die durch sorgfältig angestelltes Calcül ermittelten Zahlen. Dass die Extraction um so gefahrvoller ist, je weniger Uebung der Operateur besitzt, kann deren

wissenschaftliche Vorzüge nicht schmälern. Ihre grössere Verwundung ist ebensowenig von entscheidender Bedeutung, da die Erfahrung lehrt, dass einmalige erhebliche Verwundung vom Auge unverhältnissmässig besser ertragen wird, als fort-dauernder Reiz, der besonders durch die der Resorption vorhergehende Schwellung der dislocirten Linse oder ihrer Fragmente oft bis zu einem hohen Grade gesteigert wird. Verflüssigung des Glaskörpers ist bei Rückenlage weniger zu fürchten. Wohl aber sind es äussere Difformitäten des Auges: zu enge Lidspalte, Tieflage und Kleinheit des Bulbus, flache Hornhaut, Synechia anter. totalis, organische Myosis etc., welche die Operation contraindiciren oder doch deren Ausführung sehr erschweren und den Erfolg unsicher machen. Hornhautentartungen erschweren den Schnitt, der indess nicht minder gut heilt. — Hat man zu fürchten, dass wegen Blödsinn, Fallsucht oder wegen Asthma, Scoliosis, wegen zu grosser Jugend die für die gehörige Ruhe erforderliche Rückenlage nicht eingehalten werde, so ist das ein Anlass, lieber zur Nadel als zum Staarmesser zu greifen, darf man wegen schlechter Säfte nicht auf Primaheilung zählen, so bildet man ebenfalls den Lappen nicht gern.

Für Reclination sind alte Staare von einer gleichmässigen, nicht zu geringen Consistenz geeignet, die keine Adhaerenzen von Bedeutung haben; die trübe Kapsel lässt sich in der Regel leicht mit aus der Sehaxe entfernen. Weiche Staare discidire man lieber besonders bei jungen Individuen, wo eher Hoffnung ist, auch eine leicht zerschneidbare Kapsel zu treffen. Letztere zieht sich meist günstig zurück, während die Fragmente nicht zu langer Zeit zur Resorption bedürfen. Reine Depression ist obsolet, da sie Iris und Choroidea in gleichem Grade gefährdet.

Man führt die Nadeloperationen im Allgemeinen lieber per scleram aus, wenn auch bei der *Keratonyxis* nur ein Organ verwundet wird und man auf beiden Augen mit der rechten Hand operiren kann. Die Nachtheile sind, dass leicht eine Narbentrübung zurückbleibt, dass man für die Nadel nur einen engen Spielraum hat, Adhaerenzen selten trennen kann und doch stets in Gefahr ist, die Iris zu zerren.

Die Nachbehandlung ist nach allen Methoden insofern dieselbe, als die Patienten bei grösstmöglicher Körperruhe im verdunkelten Zimmer am besten in der Rückenlage, was nach Extractio nothwendig ist, einige Tage verharren, leichte, kühle Kost nehmen und nur das Nöthigste hören und sprechen. Englische Pflasterstreifen legt man sofort über, hängt noch eine einfache Leinencompresse vor und lässt 4—6 Wochen einen grünen oder blauen Schirm tragen. Seröse Feuchtigkeit lässt man von Zeit zu Zeit abtupfen, geringer Wundschmerz lässt nach 1—2 Tagen nach. Nach 3—6 Tagen weicht man die Pflasterstreifen mit lauem Wasser ab, löst die Schleimkrusten und öffnet die Lider in der Dunkelheit, um sich

von der Schwärze der Pupille zu überzeugen. Mit den Seheversuchen sei man behutsam und halte zuerst keine hellreflectirenden Objecte vor. Die Beleuchtung des Zimmers darf erst nach c. 14 Tagen zunehmen.

Deuten sich Entzündungssymptome an, so reinige man die Augen, lege neue Pflaster lockerer auf und applicire kühle Aufschläge, sehr leichte, die desshalb oft gewechselt werden müssen. — Entzündet sich die Iris, was meist unter stechenden Schmerzen geschieht, so muss ernstere Antiphlogose, 8 Blutegel, vielleicht ein Aderlass, innerlich Calomel mit etwas Opium, Ung. Hydrarg. cin. mit Extr. Opii aq. etc. in Anwendung kommen. — Gegen Vomituritionen leisten Pot. Riveri und Eispillen gute Dienste. Bei grosser Empfindlichkeit kann man die Schmerzen durch Morphium, Aq. lauroc. oder Opium bekämpfen.

Besonders nach Discision ist grössere Vorsicht erforderlich, da das Schwellen der Fragmente oft schon in wenigen Tagen beginnt. Innere Mittel helfen nicht, wohl aber die Punction, welche sofort den Druckreiz mildert. Das neu zuströmende Kammerwasser scheint oft resorptionskräftiger zu sein.

Nach der Extraction ist der Lappen schon in 12—24 Stunden wieder verklebt, nach einer Woche verwachsen und oft schon in Jahresfrist die Narbe nur noch schwer aufzufinden. War die Heilung durch Vorfall von etwas Glaskörper, durch Verschiebung und leichte Eiterung gestört, so ist der einzige Nachtheil doch nur die etwas breitere Narbe.

Convexbrillen mit 2—5'' Focaldistanz, s. g. Staarbrillen, haben den Zweck, den mit der Entfernung der Linse entstandenen Lichtbrechungsdefect auszugleichen. Die Linse und besonders deren Korn haben den stärksten Brechungsindex¹⁾, an der Stelle der Linse treten *hum. aq.* und *corp. vitr.* zusammen, es findet also eine zu geringe Fraction statt, die Strahlen treten zu spät hinter der Netzhaut zu einem deutlichen Bilde zusammen, die Operirten erscheinen also als presbyopisch und bedürfen Gläser wie diese, nur aber solche von stärkerer Biconvexität. Je nach der sonstigen Beschaffenheit der dioptrischen Mittel entsprechen ihrem Bedürfniss biconvexe Gläser von 5—2'' Focaldistanz, zwischen denen man wählen lässt, doch nicht vor Ablauf eines Vierteljahres, um das Auge nicht zu früh an das Mittel zu gewöhnen. Denn es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass die sechs äussern Augenmuskeln eine gewisse, wenn auch sehr beschränkte Accommodationsthätigkeit allmählig auszuüben fähig werden können.

¹⁾ Wenn der Brechungsindex des destill. Wassers nach Brewster = 1,3358 angenommen wird, so ist nach W. Krause der der Cornea durchschnittl. = 1,3525,
 der des humor aqueus = 1,3435,
 der des corp. vitreum = 1,3506,
 der der äusser. Linsenschicht = 1,4071,
 der der mittler. Linsenschicht = 1,4319,
 und der des Linsenkornes . . = 1,4564.

Was man von Wiederersatz einer Linse gesagt hat, gehört in das Gebiet der Fabel, da sich in den allerdings mehrweniger durchsichtigen glasigen, durchaus unförmlichen Massen nie auch nur eine Andeutung von Linsenstructur gefunden hat, es sei denn, dass man zurückgebliebene Linsensubstanz für neuentstandene angesprochen hatte.

Hinsichtlich der Prognose der Operation sagt *Arlt* l. c. Bd. II. p. 348, dass man bei einer grösseren Zahl von Operirten wohl von Glück sprechen könne, wenn von 100 Individuen 85—90 ihr Gesicht wieder erlangen. Nach den einzelnen Augen gerechnet, stellt sich ein weit minder günstiges Verhältniss heraus. Doch ist für den Werth obiger Ziffer wohl zu merken, dass es Operateure gibt, die bei allen Fällen, die sich irgend bieten, mit Nadel oder Messer bei der Hand sind, während andere nur da operiren, wo sie auf ausschliesslich für den Erfolg günstige Chancen treffen. Erstere werden desshalb sehr begreiflicher Weise eine niedrigere Ziffer haben, selbst wenn sie noch da Hülfe leisteten, wo die Letzteren von jedem Versuche abstanden.

Koremorphosis oder Bildung einer künstlichen Pupille bezeichnet diejenigen operativen Eingriffe, vermittelt derer an Stelle der unwegsam gewordenen Pupille den Lichtstrahlen ein künstlicher Zugang zu der Netzhaut geschaffen wird. — Die Unwegsamkeit kann auf verschiedene Weise zu Stande kommen und entweder in Anomalie der Cornea oder der Iris oder beider Membranen begründet sein. Hinsichtlich der Cornea ist es eine unheilbare partielle, unmittelbar vor der Pupille stattfindende Verdunkelung, hinsichtlich der Iris aber Verengerung oder Verschluss des Sehloches in solchem Grade, dass das Sehvermögen gänzlich oder nahezu aufgehoben ist, und zwar durch Fortbestehen der *Wachendorf*schen Pupillarmembranen oder organische *Myosis*, Beiden gleichbedeutend gilt jede durch Eiter, Blut, Lymphe, besonders entzündliche Pseudomembranen und Synechie bewirkte Verengerung oder Verschliessung, deren directe Beseitigung unmöglich ist. Verdunkelung des Glaskörpers im Bereich der tellerförmigen Grube, wie man sie nach Staaroperationen, jedoch selten, beobachtet, wird ebenfalls zu den Indicationen gerechnet. Gewagt oder unzuverlässig wird die Operation, wenn nur ein linienbreiter Hornhautsaum unverdunkelt ist oder die Verwachsung von Hornhaut und Iris bis auf 1'' vom Rande entfernt stattfindet. Contraindicirt aber ist sie bei solchen Krankheitszuständen der Iris, Choroidea und anderer Augengebilde, dass entweder die Operation an sich fehlschlagen muss oder beim besten Gelingen doch das Sehevermögen durch sie nicht hergestellt werden kann. — Cataract ist keine contraindicirende Complication, vielmehr können sehr passend beide Leiden gemeinschaftlich gehoben

werden, indem man nach Bildung des Lappens auch sofort eine entsprechende Pupillaröffnung excidirt. Bisher galt der Grundsatz, in der Integrität des andern Auges eine Gegenanzeige gegen die *Koremorphose* zu haben, weil dasselbe für den Bedarf ausreiche und das Gesicht aus optischen Gründen durch ein koremorphotisches Auge verschlimmert würde, durch unglücklichen Ausgang aber beide Augen vollständig eingebüsst werden könnten. Aus letzterer Besorgniss nahm man auch bei einseitigem Cataract und andersseitiger Hornhauttrübung zuerst die ungefährlichere Staaroperation vor. — In neuester Zeit ist indess auch bei Integrität des andern Auges künstliche Pupillenbildung ausgeübt, doch, wie es mir scheint, aus nicht hinlänglich berechtigenden Gründen. Die Gefahr ist selbst bei der bewährtesten Geschicklichkeit zu gross — wenigstens für den Kranken. —

Die künstliche Pupille muss dem Centrum so nahe wie möglich liegen und am Besten nach Innen zu, sie ist bei 2''' Durchmesser schon übergross, darf aber auch hirsekornklein sein. Sind beide Augen für die Pupillenbildung geeignet, so begnüge man sich aus optischen und Vorsichtsgründen mit einer, um bei deren Missrathen später am andern Auge die Operation zu wiederholen. Eine Hauptsorge bei Ausführung der Operation ist, die Linse nicht zu lädiren, da dieselbe sich trüben und eine zweite Operation erfordern würde.

Ehe die wirklichen praktischen Methoden besprochen werden, geschehe kurz der geschichtlichen Erwähnung. 1728 übte *Cheselden* zuerst die *Iridotomie* mittelst eines kleinen Messers, das er per scleram einführte, um von hinten her die Iris zu incidiren. Da sich die so entstandene Pupille allzuleicht wieder schliesst, wurde das Verfahren von Späteren vielfach modificirt, indem man kreuz- oder V förmige Schnitte legte, durch die Cornea eindrang etc., bis *Jüngken* mit Fug und Recht die Anwendung auf den seltenen Fall beschränkte, dass die Pupillarmembran bis in das Knabenalter fortbestehe.

Scarpa und *Schmidt* brachten im Anfang dieses Jahrhunderts die *Iridodialysis* in Aufnahme, d. h. die Ablösung der Iris vom Ciliarligamente, auf die Erfahrung gestützt, dass bei Insulten des Bulbus diese Ablösung oft ohne Nachtheil eintritt. Man verrichtet die Dialyse per corn. und per scler. und hat für die Ausführung unzählige Variationen angegeben. Damit die gelöste Irispartie nicht wieder an ihre ursprüngliche Stelle zurückgleite, wurde sie in die Hornhautwunde eingeklemmt (*Iridoenkleisis*), oder sie wurde eingeschnitten (*Iridotomedialysis*), oder abgeschnitten (*Iridectomedialysis*) etc. Der Ablösungsact ist einmal sehr schmerzhaft, ähnlich der Extraction eines Zahnes, dann aber durch die Zerreissung der zahlreichen Gefässe und Nerven so verwundend und irritirend, dass sie häufig von üblem Erfolge und deshalb trotz der zur leichteren

Ausführung angegebenen, unzähligen Instrumente fast nur noch geschichtlich ist.

Adams und *Himly* wird die *Iridoparelysis* zugeschrieben, d. h. die Verziehung der normalen Pupille bei centraler Hornhauttrübung und bei Synechien nach einer Seite hin. Man führt durch einen Einschnitt an der Hornhautperipherie ein Irishäkchen von Vorn in die Pupille (lädirt die Linse) und zieht den Pupillarrand der Iris vor, um ihn einzuklemmen (*Emlden* mit seinem *Raphiankistron*). Die Pupille geräth selten, wenigstens nie gut.

Vom praktischen Gesichtspunkte aus macht die nach zwei Variationen auszuführende *Iridectomie* alle übrigen Methoden entbehrlich.

Erste Variation der Iridectomie nach *v. Gräfe jun.* (*S. Fr. Ravoth Schlemms Operations-Uebungen etc.* III. Aufl. 1854.) „Der Kranke wird wie bei der Extraction gelagert, — Operateur und Assistent sitzen wie dort, — der Bulbus wird fixirt. Der Operateur ergreift ein Lanzenmesser (er muss sich deren drei halten: ein gerades, eines im Winkel von 40 Grad, ein drittes im Winkel von 60 Grad auf der Fläche gekrümmt), wie das Staarmesser und setzt es mit der Spitze zum Centrum der Linse gerichtet, mit den Flächen genau parallel zur Iris $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Linie vom Cornealrande entfernt in der Sclerotica an — sticht es ein — schiebt es in die vordere Kammer bis etwas über den betheiligten Pupillarrand hinaus — zieht es langsam und die Wunde auf 2—3 Linien erweiternd zurück, wobei die Spitze immer mehr der Hornhaut zugewendet werden muss. Bei dieser Weise des Einstichs durch die Sclerotica verletzt man die Iris nicht, wenn man genau die Messerflächen derselben parallel hält, denn die Iris inserirt sich ja $\frac{1}{2}$ Linie über den Cornealrand hinaus. Diesen Parallelismus der Flächen muss man vorher genau festgestellt haben und zu dem Zweck entweder ein gerades (gewöhnlich für den seitlichen) oder ein gekrümmtes (für den oberen und unteren Einstich) Messer wählen. Nach gemachtem Einstich ergreift man eine feine gekrümmte Pincette — führt sie geschlossen und mit der Concavität der Hornhaut zugekehrt ein und bis zum Pupillarrande, öffnet die Pincette, so weit es die Wunde gestattet, und schliesst sie darauf wieder, und zwar beides in unverrückter Haltung, denn es legt sich die Iris von selbst hinein. Darauf führt man die Pincette mit der sicher erfassten Iris wieder aus der Wunde, vor welcher ein zuverlässiger Assistent den Iristheil mittelst einer Scheere abschneidet. — Bei dieser Weise der Ausführung fällt jede Nebenverletzung, hauptsächlich die des Linsensystems aus, die nur zu leicht stattfindet, wenn man statt der Pincette, *Beer's* Häkchen einführt, mit demselben um den Pupillarrand herumgeht und ihn dann angehakt herauszieht. Ferner entsteht nie eine Hornhautnarbe, was leicht geschieht, wenn man

nach älterer Weise deren Eröffnung am Rande der Sclerotica macht. Endlich kann man die Iris bis zum Ciliarbande fortschneiden und so ihre gefährliche Dialyse vermeiden.“

Nach dieser Verfahrungsweise ist die künstliche Pupille mit der möglichen Sicherheit und verhältnissmässig unschwer auszuführen. Sie passt auch für die Mehrzahl der Indicationen, doch dürfte eine zweite Variation den Vorzug dann verdienen, wenn für die Pupille nur unmittelbar am Ciliarligamente noch ein schmaler Saum von $1-1\frac{1}{2}'''$ vorhanden ist. Ich habe mich derselben mit günstigem Erfolge bedient und glaube sie zur prüfenden Wiederholung empfehlen zu dürfen¹⁾. Sie ist allerdings schwieriger, aber ebenfalls ohne Gefahr für das Linsensystem und gewährt gewisse unbestreitbare Vortheile. Vorbereitung und Einstich an sich sind wie oben, nur wird das Messer, nachdem es die Cornea durchdrungen hat, zunächst c. $1-1\frac{1}{2}'''$ durch den Ciliarrand der Iris geführt, genau an der Stelle, welche die neue Pupille äusserlich begrenzen soll, und dann der Schnitt vollendet. Nun geht der Operateur mit einem stärker gekrümmten, stumpfen Irishäkchen durch beide Einschnitte flach hinter die Iris bis an den Pupillarrand, erfasst denselben mittelst einer Viertelsrotation und kehrt mit dem gefassten Irisstückchen nach Aussen zurück, das von der in der Hand des Assistenten bereiten Scheere sofort durchschnitten wird. Den Zufällen, welche mit jedem Reißen verbunden sind, ist vorgebeugt, der Aussenrand der Pupille ist durch den Irischnitt vorbestimmt, das stumpfe Irishäkchen gleitet flach und nach Vorn an die hintere Iriswand angedrängt bequem vor, ohne die Linse zu gefährden und ohne sich wegen seiner stärkeren Krümmung und seines stumpfen Endes einhängen oder verletzen zu können. Die Gestalt der Marginalpupille ist keine zufällige, sondern stets dieselbe und zwar die viereckige, denn weil die den Sphincter pupillae constituirenden circulären Irisfasern nach Austrennung eines Stückes retrahirend wirken, so erhält die Oeffnung im Pupillarrande je nach der Länge des Irisschnittes eine nahezu gleichlange Seite; ebenso lang fallen durchschnittlich die radialen Wundränder in der Iris aus. Auch beim Durchriss der vorgezogenen Irispartie ist der Nachtheil unerheblich, da Wiedervereinigung kaum denkbar ist, indem sich die an drei Rändern freien Lappen aufrollen und zurückziehen. — Wäre der Pupillarrand, z. B. wegen centraler Synechia anter., nicht frei, so könnte man, statt mit dem Häkchen, mit einer sehr feinen, stumpfen Pincette eingehen, deren eines Blatt wenig vom Ende entfernt einen kleinen Stift zum Durchbohren der Iris trägt, während das andere mit einer Oeffnung zur Aufnahme dieses Stiftes versehen ist.

¹⁾ Cfr. meine Schrift: Die künstliche Pupille vor und in dem Auge. Lahr, Verlag von J. H. Geiger. (M. Schauenburg.) 1854. 10 Sgr. — Auch in Göschens Deutscher Klinik. 1854.

Die *Desmarres'sche Iridorhexis* kann als Abbreviatur der ersten *Iridectomievariation* bezeichnet werden. Sie besteht nach seinen eigenen Worten im Wesentlichen darin, dass man, sobald man sich überzeugt hat, die Iris gefasst zu haben, dieselbe mittelst eines kurzen, etwas brüskten Zuges mit dem Instrumente einreisse, worauf sogleich der gesättigt schwarze Hintergrund des Auges zum Vorschein komme. Das durch einen etwas brüskten Zug vorgebrachte Stück soll darauf mit einer Hohlscheere möglichst nahe am Ciliarrande excidirt oder zwischen den Wundlippen der Cornea eingeklemmt werden. Der Riss kann zu unergiebig sein, auch zu ergiebig; bei gleichzeitiger Synechia posterior wird sehr leicht auch die Linsenkapsel mit zerreißen.

Nach gehöriger Reinigung und vorsichtiger Trocknung des Auges werden beide Augen verklebt, worauf Verband und weitere Behandlung ganz nach den für Staaroperationen angegebenen Grundsätzen eingeleitet werden. Bei günstigem Verlaufe kann der Operirte nach einer, sogar einer halben Woche entlassen werden, muss das Auge aber noch Monate lang vor Erkältung sichern, da sich leicht Iritis einstellt.

Die **Operatio strabismi**, von *Stromeier* 1838 als ausführbar empfohlen und im folgenden Jahre am 23. Oct. von *Dieffenbach* zuerst am Lebenden ausgeführt, besteht darin, dass diejenigen Muskeln, welche in Folge permanenter Contraction, (resp. Lähmung des Antagonisten) oder fehlerhafter Insertion das Schielen veranlassen, vom Bulbus abgelöst werden. In der ersten Periode allseitig sehr gepriesen, mussten nach missbräuchlicher und unvorsichtiger Ausführung bald ungünstige Erfolge in Unzahl vorkommen, so dass die Operation bei dem Publikum und der Mehrzahl der Aerzte in Misscredit verfiel. *v. Gräfe* jun. hat das Verdienst, die Operation wieder zu der ihr gebührenden Anerkennung gebracht zu haben, indem er wissenschaftlich begründete, wie sie dem anatomischen und physiologischen Verhalten der betreffenden Gebilde gemäss ausgeführt werden müsse, um von Erfolg zu sein, und diese Erfolge wirklich erzielte. Er wies nach, dass zahlreiche Filamente der Augenmuskeln in der Tenon'schen Kapsel endigen und durch das feste Gewebe derselben sowohl mit der Sclerotica als auch mit der Conjunctiva zusammenhängen. Hierdurch erklärt es sich, dass, wenn wir die Insertion der Muskelsehne hart von der Sclerotica abtrennen, ohne irgend einen anderen Stumpf zu lassen, dann die beinahe volle Beweglichkeit nach Seiten des durchschnittenen Muskels zurückbleibt, weil die Muskelsehne zum Theil durch die oben erwähnten Bindegewebsschichten mit der Conjunctiva und mit der Sclerotica, besonders durch die seitlichen Verbindungen der Tenon'schen Kapsel in Verbindung bleibt. Ferner folgt, dass ein Hinüber-

weichen des Bulbus nach der entgegengesetzten Seite nie eintreten kann, wenn man die seitlichen Einscheidungen sowohl mit der Scheere, als mit dem Schielhaken, dessen Grösse dabei besonders in Betracht kommt, möglichst schont. Es kommt jedenfalls darauf an, den Muskel nicht in dem Grade frei zu präpariren, wie es früher geschah und wonach man so häufig *Strabismus artificialis* nach der entgegengesetzten Seite eintreten sah, denn eben von dem Maasse, in welchem diese Lösung geschieht, ist das bedeutendere oder geringere Hinüberweichen des Bulbus abhängig.

Behufs sicherer Ausführung des Operationsmanövers wird der Patient chloroformirt und wie zur Extraction gelagert. Der Operateur sitzt so zum Kopfe, wie es die Lage des zu durchschneidenden Muskels erfordert und lässt beide Lider durch nichtgefensterte Lidhalter von einem Assistenten abziehen. Ein Anderer fixirt den Bulbus, indem er eine Conjunctivafalte mit einem scharfen Häkchen oder besser einer schliessbaren, gezähnten Pincette an der dem Muskel entgegengesetzten Seite fest erfasst und zugleich nach dieser Seite hin anzieht. Der Operateur hebt eine zu dem Muskel senkrecht stehende Conjunctivafalte mit der linken Hand mittelst einer nicht verschliessbaren gezähnten Pincette auf und zwar möglichst nahe am Cornealrande und durchschneidet sie mit einer kleinen Cooper'schen Scheere so, dass das eine Ende der in der Muskelrichtung verlaufenden Operationswunde am Cornealrande liegt, das andere über der Muskelinsertion. Bei höherem Grade von *Strabismus* erhebt man eine Längsfalte und stellt durch den Schnitt eine quer zum Muskel verlaufende Bindehautöffnung her. Darauf wird der Schielhaken von Oben oder Unten an die Insertionsstelle des Muskels geführt und mit einer schiebenden Bewegung unter ihn gebracht, ohne dass der Muskel von seiner Grundlage mehr, als für den Zweck erforderlich ist, abgezerrt werden darf. Während der Operateur nun den Haken in die linke Hand nimmt, wird ihm die Cooper'sche Scheere zugereicht, mit der er genau den sehnigen Theil des Muskels von der Insertionsstelle an der Sclerotica ablöst. Oft liegen nicht alle Fasern auf dem Haken, wesshalb nachträglich die schiebende Bewegung zu wiederholen ist, um den Muskel rein und vollständig zu trennen. Es muss ein Assistent das Blut mit einem kleinen, in eine Pincette gefassten Schwammstückchen hinlänglich oft abtupfen, damit der Operateur deutlich sehe. Ist Nichts zurück, so werden alle Instrumente entfernt und der Patient in Rückenlage belassen, indem man ihn unausgesetzt nach einer dem Operationszweck entsprechenden Richtung den Bulbus hinwenden lässt. Bis zum andern Tage werden kalte Aufschläge fleissig gewechselt, um jeder Entzündung vorzubauen.

Je nach dem Grade des Schielens, das beseitigt werden soll muss der Muskel nach der Trennung mehr oder weniger

weit von seiner ursprünglichen Insertionsstelle sich entfernen können. Durch Variation des Verfahrens kann diese Entfernung fast drei Linien betragen oder auch fast null sein. Für die geringen Grade ist eine Rücklagerung von $\frac{1}{2}$ —1“ wünschenswerth. Um die Rücklagerung nach dem Bedarf des einzelnen Falles zu leiten, sind von v. *Gräfe* folgende Regeln zur Beachtung aufgestellt worden: „Will man einen kleinen Grad von Rücklagerung, so macht man 1) einen sehr kleinen Schnitt in die Conjunctiva; 2) man entblösst mit der Cooper'schen Scheere die äussere Fläche der Muskelsehne möglichst wenig; 3) man wählt einen kleinen Muskelhaken und führt ihn recht vorsichtig in die seitliche Einscheidung hart an seiner Insertion ein; denn durch ihn wird wenigstens die eine Seite der seitlichen Einscheidungen gewaltsam durchbohrt und die Verbindung zwischen Muskel und Sclerotica gelockert, und dies wird um so ausgiebiger geschehen, je grösser der Haken ist, mit dem man überhaupt niemals zu ungestüm die seitlichen Einscheidungen durchbohren darf; 4) muss man nach der Ablösung die Muskelsehne gar nicht von der Sclerotica abheben, noch weniger die Zellgewebsbündel an der inneren Fläche mit der Scheere lösen; 5) nach der Operation kann man eine Suture durch die Conjunctiva legen, was den Erfolg ausserordentlich beschränkt und deshalb nur bei ausserordentlich grosser Conjunctivawunde angewendet werden darf; 6) nach der Operation wendet man das Auge nach der Seite des abgelösten Muskels. Offenbar wird man durch das Gegentheil der einen oder der andern dieser sechs Regeln ein grösseres Quantum von Rücklagerung erzielen, und es ergibt sich oft erst im Verlauf der Operation, von welcher dieser Regeln man das Gegentheil ausführt; ja man hat es sogar in der Gewalt, die eine oder andere Abweichung durch stricktere Befolgung einer anderen wieder zu compensiren, also einen etwa begangenen Fehler wieder gut zu machen. Hierbei verdient noch Beachtung, dass zuweilen unter der fibrösen Muskelsehne verdichtete Bindegewebmassen sich befinden, welche das Zurückweichen des Muskels verhindern, so dass man dann gut thut, den Muskel auf einige Linien von der Sclerotica abzuheben, resp. mit der Scheere abzulösen. Noch ist zu bemerken, dass nach einer etwas grossen Rücklagerung mitunter eine Vertiefung an der Carunkel zurückbleibt. Dies kann man durch einen mit dem Muskel parallelen Schnitt in der Conjunctiva verhindern, dessen Wundränder sich später nähern.“ —

Die orthopädische Nachbehandlung ist von derselben Wichtigkeit wie nach der subcutanen Operation des Klumpfusses und anderen teno- oder myotomischen Eingriffen und muss am Auge um so vorsichtiger geleitet werden, als von der Anheilung des gelösten Muskels, von der Narbencontraction, von der allmählig wachsenden Kraft des Antagonisten, von der

Haltung des Auges der Erfolg ebensosehr abhängt, als von der Ausführung der Operation. Man achte unausgesetzt auf diese Momente, schreibe ihnen gemäss zugleich augengymnastische Regeln vor, bei zu starker Wirkung der Operation z. B. Richtung des Bulbus nach der Operationsseite und unterstütze diese Uebungen durch Vorsetzen prismatischer Brillengläser.

Bei den geringsten Graden von passivem Schielen cauterisirte *Dieffenbach* nur die Conj. über dem paralytirten Muskel, während er bei geringen Graden activen Schielens der Excision einer Bindehautfalte an der Seite, von welcher das Auge abgewichen ist, der Tenotomie vorzieht. Ueberhaupt operirt er da, wo von der Correction der Bulbusstellung Verbesserung des Sehevermögens erwartet werden darf. — *Ruete* hat für die Operation die Indicationen folgendermassen genau festgestellt: man durchschneide den *m. rect. int.* bei beweglichem Schielen nach Innen, bei abwechselndem Schielen nach Innen, ebenso dann, wenn die Schaxen gewöhnlich nach Innen stehen und sich nur mit Anstrengung auf entfernte Objecte richten. Ferner bei Nystagmus und Lusitas nach Innen. Der *m. rect. ext.* ist bei beweglichem Schielen nach Aussen zu durchschneiden, bei Lusitas nach Aussen, bei abwechselndem Schielen nach Aussen und bei einer gewöhnlich für ferne Objecte stattfindenden Accommodation; der *m. rect. sup.* bei beweglichem Schielen nach Oben; dessen innere Partien allein bei schwacher disharmonischer Richtung der Pupille nach Oben und Innen; der *m. rect. inf.* bei den umgekehrten Verhältnissen; die *mm. obliq.* aber nur bei den höchst seltenen Fällen von Doppel- und Schiefsehen.

Ist durch übermässigen Operationserfolg, wie es früher häufig geschah, *Strabismus* nach der entgegengesetzten Seite eingetreten, so löse man nicht auch den Muskel dieser Seite, sondern versuche, den Muskel- oder Sehnenstumpf aufzufinden, vorzubringen und mittelst eines Fadens, den man am Stumpfe oder an dem Muskel der anderen Seite befestigt, den Bulbus so zu stellen, dass die Verwachsung des Muskels mehr nach der Cornea zu erfolgen kann.

Die Operation wird, wenn sie bilateral erforderlich ist, zweckmässig nicht in derselben Sitzung beiderseits ausgeführt, um für die zweite Operation die Wirkung der ersten benützen zu können. Bei unvollkommenem Erfolge der Operation einseitigen oder abwechselnden Schielens kann man die Nachoperation auf dem zweiten Auge vornehmen. — *v. Gräfe* liebt es, überhaupt die Operationsaufgabe auf beide Augen zu theilen.

Das Endurtheil, welches die auf *v. Gräfe's* Antrag niedergesetzte Commission über den Werth der Schieloperation abgab, lautet (in der Deutschen Klinik Nro. 8, 1855) also:

1) Die Operation vermag, unter richtiger Vorausberechnung

ihrer Endwirkung, in allen Fällen von Schielen ohne Ausnahme, eine wesentlich gebesserte, wo nicht vollkommen richtige Stellung des Augapfels zu erzielen. Weder *Strabismus fixus*, *directus*, noch *paralyticus* bildet eine Contraindication.

2) Grösse, Richtung und Ort des Bindehautschnittes, Umfang der Ablösung des Muskels von der Bindehaut der Sclerotica und der Tenon'schen Kapsel können so combinirt werden, dass die Operationswirkung gleich Null oder übermässig gross wird.

3) Von dem wesentlichsten Einfluss auf den Erfolg ist die Nachbehandlung durch Augengymnastik und Brillen.

4) Die Besserung der Fixation, der Accommodation und der Deutlichkeit des Sehens wird in allen Fällen erreicht, in welchen die Amblyopie noch nicht bis zu einem sehr hohen Grade gediehen ist. Selbst Incongruenz der Netzhäute verbietet die Operation nicht, muss aber Gegenstand einer besonderen Nachbehandlung sein. Wenn bei sehr umfänglichen Hornhauttrübungen bereits Aberration der Sehaxen stattfindet, so kann der kosmetische Zweck erreicht werden, doch ist die Besserung des Sehevermögens nicht zu erwarten.

Die **Thränenorgane** machen wegen krebshafter Entartung, wegen Cysten, verschiedenartiger Tumoren u. dgl., die oft bis tief in die Orbita sich erstrecken, nicht selten eingreifende Operationen nöthig, für die nur allgemeine Regeln aufgestellt werden können. Ist es irgend möglich, so operire man nach Eröffnung des Bindehautsackes von der inneren Lidseite her, selbst wenn zu diesem Behuf die äussere oder innere Commissur gespalten werden muss. Man hat dabei den doppelten Vortheil, eine entstellende Narbe und die Zerschneidung des *levat. palp.* zu vermeiden. Sobald die Geschwulst bloss liegt, wird sie in geeigneter Weise gefasst, vorgezogen und sofort möglichst vollständig ausgeschält. In Einzelfällen, bei denen die Geschwulst tief geht, muss man sich während der Operation entscheiden, ob man das noch sehende Auge mit entfernen darf, oder besser einen Theil der Geschwulst zurücklässt. Nur Krebs könnte die Ausrottung des noch normal fungirenden Auges rechtfertigen. Ist es erforderlich, auch Knochenpartieen zu reseciren, so zögere man nicht, diese Resectionen in derselben Sitzung vorzunehmen. Der Verband sei möglichst einfach, um Zugang zu der Operationsstelle zu behalten. Nur bei Blutungen, die anderweitig nicht zu stillen sind, ist Tamponade angezeigt; denn die Entfernung der letzteren macht in der Regel grosse Schwierigkeit und erneuert nicht selten die Blutung. Der Bulbus, die Muskeln, besonders der Sehnerv müssen möglichst geschont werden, da letzterer, obgleich heftig gezerrt und längere Zeit von Eiter umspült, doch in manchen Fällen seine Leitungsfähigkeit behielt oder wiedergewann. — Ebenso

ist der Verlust der Thränendrüse für das Auge keineswegs von solchem Nachtheile, als man lange Zeit annahm, da die Befeuchtung des Bulbus, wie die Erfahrung lehrt, dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die **Thränensackfistel** hat man auf die verschiedenartigste Weise zu heben gesucht und eine grosse Reihe von Methoden bezeugt die Schwierigkeit der Aufgabe. Zur Lösung derselben hat man drei verschiedene Wege eingeschlagen, indem man

- 1) den normalen Thränen canal durch Injection, Katheterismus, Dilatation oder Cauterisation zu restituiren versucht,
- 2) einen neuen Abfluss canal etablirt (durch Perforation des Thränenbeines oder Eröffnung des *antr. Highmor.*) oder
- 3) den Thränenschlauch vollständig verödet hat.

In neuester Zeit wird vorwiegend die letztere Methode ausgeübt, da sie ebenso zuverlässig ist, als alle übrigen unzuverlässig, und keineswegs stets lästiges Thränenträufeln zur Folge hat. Vielmehr scheinen bei aufgehobener Thränenableitung auch weniger Thränen producirt zu werden und zwar nicht mehr, als vom Bulbus leicht verdünsten.

Ist der Thränennasengang nicht verwachsen, sondern nur verstopft, so suche man ihn durch Injection von Flüssigkeiten oder Luft (*v. Gräfe*) wieder wegsam zu machen, prüfe aber sorgfältig mit der Sonde, ob nicht etwa schon Caries vorhanden ist, da dieselbe jede Herstellung des normalen Abflusses regelmässig vereitelt.

Behufs Ausspritzung des Schlauches mittelst der Anel'schen Spritze stellt man sich hinter den Kranken, fixirt dessen Kopf auf seiner Brust und hält das Röhrchen zuerst leise auf den unteren Thränenpunkt, bis derselbe die Berührung erträgt und sich nicht mehr contrahirt. Dann senkt man ihn c. 1''' tief ein und drückt mit mässiger Kraft auf den Stempel, lässt dann nach, um die eingedrungene Flüssigkeit nebst gelöstem Schleim auszudrücken und wiederholt diese Procedur in jeder Sitzung einige Male.

Anel führte seine feinen silbernen Knopfsonden auf dieselbe Weise ein und bis in die Nase durch; da aber Laesionen oft schwer zu vermeiden sind, so betrachtet man mit Recht das *Gensoul'sche* Verfahren als im Allgemeinen vorzüglicher. Dessen Sonde, die von der Nase her eingebracht wird, ist einem verkleinerten männlichen Katheter nicht ganz unähnlich und wird mit abwärts gewendeter Spitze c. 1'' tief auf dem Boden der Nasenhöhle vorgeschoben, dann gibt man ihr eine Seitwärtsdrehung, so dass sie in den unteren Nasengang eindringt, bei vorsichtigem Zurückziehen und Andrängen die Schleimhautklappe abdrückt und so auch in den Thränennasencanal gelangt.

Mejean führte von dem Thränenpunkte aus eine geöhrte Sonde in den Nasengang und nach Aussen, um einen Faden

einziehen und durch den Thränenpunkt hervorbringen zu können. Es gelingt nicht, auf die Art den verengten Thränennasengang zu dilatiren; vielmehr verursacht dies Verfahren Reizung, Entzündung und oft gänzliche Verwachsung.

Petit's Methode war lange Zeit die anerkannteste und hat zu verschiedenen Variationen geführt. Sie wird am besten nach *Schlemm* so verrichtet, dass man den Daumen der linken Hand dicht an den äusseren Augenwinkel legt, so dass die flache Hand beim linken Auge neben den Mund des Kranken, beim rechten auf die Schläfe und den Hinterkopf desselben zu liegen kommt, und spannt nun beide Augenlider nach Aussen an. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand fühlt man im inneren Augenwinkel unter dem angespannten *Tendo m. orbic.* nach dem unteren Orbitalrande. Hat man sich von dessen Lage und Richtung überzeugt, so fasst man ein schmales, spitzes Messer wie eine Schreibfeder, stützt den kleinen Finger auf die Wange und setzt das Messer unter dem Tendo vor dem Orbitalrande so auf, dass seine Spitze nach dem Kieferwinkel der gesunden, seine Schneide nach dem der kranken Seite gerichtet ist. In dieser Richtung stösst man es einige Linien tief ein und macht beim Zurückziehen desselben einen kleinen, 4—5'' langen Bogenschnitt vor und parallel dem Orbitalrande. An der Stelle des Messers wird nun eine geknöpfte Sonde eingeführt und abwärts bis in den Thränennasengang geschoben. Sind alle Hindernisse beseitigt, so dilatirt man durch Einlage von allmählig dickeren Violinsaiten, indem man zuerst die E, dann die A, endlich die Dsaite gebraucht, und schliesslich einen s. g. *Scarpa'schen* Bleinagel tragen lässt.

Statt des Bleinagels hat *Dupuytren* eine aus Gold, Silber oder Platina gearbeitete Canüle einzulegen eingeführt. Dieselbe hat eine konische Form, ist 8—10'' lang, $1\frac{1}{2}$ —2'' breit, oben mit einem Rande versehen, um nicht zu tief einzugleiten, unten schräg abgeschnitten und dem Canale gemäss wenig gebogen. Die Ein- und Ausführung wird mittelst eines knieförmig gekrümmten Conductors ausgeführt, an dem die Röhrchen bequem fixirt werden können.

In neuester Zeit wird auch diese Methode nur noch wenig geübt, da die Verengerung sich nach Monaten oder Jahren doch fast stets wieder einstellt.

Das gebräuchlichste Verfahren ist heutzutage die vollständige Verödung des Thränenschlauches, der *Nannoni* in der Praxis Eingang verschafft hat. Man bedient sich des Höllensteins, des Aetzkali, der Spiessglanzbutter, der Schwefel- und Salpetersäure, der Wiener Paste, am besten aber eines eigens für den Zweck geschmiedeten Ferrum candens, da man dessen Wirkung sicherer beherrscht, als die des potentiellen Cauteriums. Ist der Knochen cariös, so lässt man es zugleich nachdrücklich auf denselben einwirken, um Exfoliation der erkrankten

Partie herbeizuführen. Die Aetzung muss so oft wiederholt werden, bis die Verödung vollständig gelungen ist.

Die **Exstirpatio bulbi** wird entweder für sich ausgeführt oder es werden zugleich die entarteten Lider entfernt, welcher Verschiedenheit gemäss die Methode verschieden ist. Krebsentartung ist vorwiegend Indication zur Totalexstirpation, da jede partielle Abtragung mit der s. g. Staphylomoperation zusammenfällt. Sollen die Lider erhalten werden, so werden sie mit stumpfen Haken vom Bulbus entfernt und dieser mittelst einer durchgeführten Schlinge, eines spitzen Hakens oder einer *Muxeur'schen* Hakenzange fixirt. Darauf spaltet man mit einem schmalen Bistouri zuerst die äussere Commissur c. 1''' weit, senkt es am inneren Winkel ein, löst den Bulbus durch sägeförmige Schnitte aus der Orbita unter vorsichtiger Schonung des Lides los, wendet nun den Bulbus nach dieser Seite hin und vollendet die Loslösung ebenso an der anderen Seite. Mit einer geschlossen eingeführten Hohlscheere wird der *nerv. opticus*¹⁾ und alles Uebrige, was den Bulbus noch fixirt, abgeschnitten, sofort auch die Thränendrüse vorgezogen und ebenfalls exstirpirt. Der Verband darf nicht früher angelegt werden, als bis man sich überzeugt hat, dass nichts Krebshaftes zurück ist. Blutungen begegnet man durch Tamponade oder schlimmsten Falls durch Anwendung des Ferr. candens. — Muss ein Lid gleichzeitig entfernt werden, so wird die Commissur vorher getrennt, das Lid mitgefasst und der Schnitt wie vorher im Gesunden geführt. Sind beide Lider entartet, so wird die Commissur nicht gespalten, vielmehr werden beide Lider sofort mit in die Zange genommen und Alles gleichzeitig durch das Bistouri gelöst und demnach die Hohlscheere an den *nerv. opticus* gebracht. — Der Verband wird durch Heftpflasterstreifen befestigt und anfänglich energische Antiphlogose angewendet, während später die Behandlung gegen Fungositäten, Nekrose der Orbitalknochen etc. zu richten ist.

Um die Gefahr vor Blutungen zu verringern, schlug *Bonnet* vor, die Augenmuskeln bei der Exstirpation zu schonen, doch ist die Aufgabe ebenso schwierig, als die Erreichung des Zweckes unsicher.

Prothesis ocularis oder Einsetzung künstlicher Augen ist schon bei den Alten geübt worden, aber erst in unserer Periode auf eine aner kennenswerthe Stufe der Vollkommenheit gehoben. *Harard*, *Mirault*, besonders aber *Boissonneau* zu Paris haben um die Vervollkommnung der Anfertigung und Einsetzung künstlicher Augen das Hauptverdienst, da ihre Augen

¹⁾ Bei der Durchschneidung des Nerv. optic. klagen die Operirten nicht über Schmerz. Sie geben in der Regel eine subjective blitzähnliche Lichterscheinung gehabt zu haben an.

nicht bloss von grosser Güte und Aehnlichkeit sind und dadurch der Entstellung entgegenreten, sondern auch durch ihre Gestalt wesentlich dazu beitragen, lästigen Folgeübeln des Augendefectes vorzubeugen. Diese sind besonders die Einwärtskehrung der Lider und Cilien und die durch sie stets unterhaltene Reizung und Entzündlichkeit des Stumpfes. Die das Auge ersetzende Scheibe, aus Kieselsäure und Wismuth angefertigt, hält die Lider, von denen sie selbst zugleich gehalten wird, angemessen von einander, so dass die Thränen bequem über sie abfliessen können. Ein weiterer Vortheil besteht darin, dass die Brauen und die Stirnhaut ebenfalls emporgetragen werden und sich nicht, wie dies ohne künstliches Auge oft geschieht, abwärts senken und dadurch zur Assymetrie beider Gesichtshälften führen können.

Soll Pseudocornea abgetragen und ein künstliches Auge eingesetzt werden, so muss man sorgen, dem Stumpfe die Grösse zu geben, dass er mit der Scheibe hernach den Umfang des normalen Bulbus hat. Sodann muss man die Augenmuskeln möglichst erhalten, weil nur dann der Stumpf und mit dem Stumpfe das künstliche Auge an den Bewegungen des anderen Auges zu participiren im Stande ist.

Die aus Glas, Porcellan, Gold oder anderen Metallen fabricirten Augen, auf die Iris und Pupille gemalt wurden, liessen viel zu wünschen übrig. Die Boissonneau'schen ¹⁾ sind schöner

¹⁾ Fabricirt werden die besten Augen in Paris bei M. Noël, Rue du temple. Nro. 187, bei Desjardins de Morainville, Rue Louvois, Nro. 12, bei Boissonneau, Rue neuve des Mathurins, Nro. 58. — Boissonneau père hat folgende Anzeige in den Ann. d'oculist. von diesem Jahre erlassen, zu deren Verbreitung ich gern dadurch beitrage, dass ich sie hier einrücke:

Boissonneau père, Oculariste des hôpitaux de Paris, Londres, etc., Chevalier et Officier de plusieurs Ordres, actuellement 11, rue du Monceau, faubourg Saint-Honoré à Paris. Pour épargner au corps médical jusqu'aux moindres des désagréments qui pourraient surgir à l'égard d'yeux artificiels que l'on propose souvent sous son nom ou comme ayant été faite par lui, il faut dire que ses yeux sont brevetés dans les principaux royaumes, qu'il n'a concédé à personne le droit d'user de ses privilèges et que l'on ne peut se procurer ses produits qu'en s'adressant à son unique établissement de la rue du Monceau.

Mode d'appropriation de l'œil artificiel par correspondance. La grande pratique de M. Boissonneau ayant enfin simplifié ses études d'appropriation individuelle au point de lui permettre l'exécution de ses yeux artificiels d'après nature par correspondance, et de tous les points du monde, il lui suffit actuellement de renseignements écrits par un médecin, et en deux mots, sur la ligne de chaque question de la présente formule, pour arriver ainsi à des restaurations qui ne laissent rien à désirer. Par ce nouveau mode de correspondance, on pourra s'éviter les frais de voyages à Paris, et des déplacements souvent impossibles.

Formule des indications pathologiques à transmettre. Première Partie — Pour les personnes qui n'ont jamais fait usage de l'œil artificiel. — Les réponses à cette formule devant également servir de guide dans les fournitures ultérieures, les trois premières indications doivent être écrites très-lisiblement. (Pour les enfants, elles concernent les parents, et on dira M. pour son fils ou pour sa fille)

1re INDICATION. — Noms: M _____

2e. Profession ou qualités _____

und dauerhafter, da die Färbung in den verschiedenen Theilen durch die Substanz geht. Die Scheibe ist concav-convex, etwas

- 3e. Demeure _____
 4e. Age du sujet: _____
 5e. Temps qui s'est écoulé depuis la perte de l'œil: _____
 6e. L'œil perdu sera le droit ou le gauche: _____
 7e. Le globe oculaire sera ou non atrophié: _____
 8e. La réduction sera d'un quart, d'un tiers, de moitié ou de trois quarts: _____
 9e. La surface du moignon oculaire sera arrondie, légèrement conique ou aplatie: _____
 10e. La cornée sera ou non conservée en tout ou partie: _____
 11e. Si le globe oculaire a été amputé, ou s'il a subi une simple résection de sa partie antérieure; faire connaître la maladie qui a nécessité l'opération et l'époque à laquelle cette dernière a eu lieu: _____
 12e. Si la cavité orbitaire a subi un rétrécissement quelconque, ou s'il existe des complications pathologiques, mentionner leur nature et le siège: _____
 13e. L'œil sain sera de saillie ordinaire, proéminent ou enfoncé: _____
 14e. Le ton de la sclérotique sera blanc pur, blanc grisâtre ou blanc roussâtre: _____
 15e. L'iris sera déclaré être bleu, bleuâtre, gris, grisâtre, roux ou marron, et la teinte désignée comme tournant plus ou moins à l'une de ces couleurs et comme étant claire, moyenne ou foncée: _____
 16e. Le diamètre de l'iris sera approximativement de 5, 6, 7 ou 8 millimètres: _____
 17e. Celui de la pupille, qui pour cet objet devra être examinée près d'une fenêtre, sera de 1, 2 ou 3 millimètres environ: _____
 18e. Son pourtour ou auréole pupillaire, sera d'un roux clair ou foncé ou d'un brun grisâtre plus ou moins senti. _____
- Deuxième Partie. — Pour le cas où un œil artificiel fourni d'après les indications qui précèdent aurait besoin de subir quelque modification et celui où une personne déjà initiée à l'usage des yeux ordinaires voudrait faire corriger une pièce d'appropriation vicieuse. (Dans cette dernière circonstance, il faudrait également remplir les indications de la première partie de cette formale)
- 19e. Envoyer l'œil artificiel à faire modifier et l'accompagner des observations suivantes; il en sera de même des anciennes pièces que l'on voudrait faire corriger; mais si, dans ce cas, on n'en possédait qu'une seule dont on ne voulût pas se séparer, il suffirait d'envoyer à sa place son moule ou son empreinte en cire ou en plâtre.
- 20e. L'œil artificiel devant conserver de lui-même sa position horizontale, si, par un mouvement naturel de rotation, sa section caronculaire ou temporale se dirigeait sous la paupière inférieure, il faudrait en donner une indication précise. _____
- 21e. Si, conservant sa position horizontale, l'iris se trouvait trop rapproché du nez ou de la tempe, s'il montait ou descendait, on indiquerait la proportion du redressement à lui faire subir par des lignes tracées au crayon ou à la plume sur la surface de l'émail ou à l'intérieur du moule précité. Pour l'examen, on doit se regarder dans une glace à hauteur de tête; et, s'il est fait par un médecin, les deux personnes doivent se tenir debout et s'entreregarder les yeux sans que le patient imprime la moindre action de physionomie.
- 22e. Dire s'il paraît plus ou moins grand que nature.
- 23e. Les paupières devant se joindre en fermant les yeux sans effort, si une résistance se manifestait, elle serait générale ou plus particulièrement sentie vers la partie interne de la section palpébrale supérieure; préciser l'observation. _____
- 24e. Si cet œil occasionne un frottement ou une pression partielle sur le moignon oculaire, préciser le point douloureux. _____

Comme il peut arriver que M. Boissonneau ait besoin de quelques instructions complémentaires, Messieurs les médecins sont priés de vouloir bien donner leur adresse ici.

grösser als der bei gewöhnlicher Augenöffnung sichtbare Theil des Bulbus, nach Aussen und Oben etwas breiter und mit stumpfen Rändern versehen, um möglichst wenig zu reizen. Um günstig eingelegt werden zu können, sind in der Regel noch kleine Operationen an den Lidwinkeln erforderlich. Adhaerenzen zwischen dem Bulbus und einem Lide brauchen nicht immer operirt zu werden, da es einfacher, leichter und oft auch zur grösseren Festigkeit dienlich ist, an diesen Stellen entsprechende Einschnitte in die Scheibe machen zu lassen. — Vor der Einsetzung muss man jede Entzündlichkeit durch Bleiwassercompressen u. dgl. beseitigen und das Auge anfänglich nicht länger tragen lassen, als es ohne lästiges Gefühl möglich ist. Ich habe in einem Falle mit Erfolg zuerst kleinere, aus dünnen Bleiplatten getriebene Scheiben eingesetzt und erst nach gehöriger Vorbereitung auf diese Weise das künstliche Auge tragen lassen. Will man es einsetzen, so reinigt man den Stumpf, befeuchtet die Scheibe und schiebt sie, indem man das Unterlid abzieht, unter das Oberlid, um, sobald es passend unter dasselbe geglitten ist, auch das Unterlid auf die Scheibe zu heben. Nachts wird die Scheibe entfernt, um Morgens wieder eingelegt zu werden, was der Patient stets sehr bald selbst lernt.

Augenheilmittel.

Ausser der nach den Grundsätzen der speciellen Therapie anzuordnenden allgemeinen Krankheitsbehandlung kommen zur Heilung von Augenleiden eine Reihe von örtlichen Mitteln in verschiedenartiger Anwendungsweise in Betracht, deren anhangsweise Besprechung für das Studium nicht unwillkommen sein wird. — Die Formen der Anwendung sind folgende:

A. Das *Collyrium* oder Augenwasser ist die üblichste Form des Gebrauchs von örtlichen Heilmitteln und im Allgemeinen nur in wenigen Fällen, z. B. wo Feuchtigkeit nicht wohl ertragen wird, contraindicirt. Man wendet sie bald warm, bald kühl und entweder als Foment, als Waschwasser, als Augentropfwasser oder Augenpinselwasser an.

Das Foment wird vorgezogen, wo man vorwiegend auf die Schutzorgane und den ganzen Bulbus oder auf vertrocknete Secrete erweichend und reinigend einwirken will. Man applicirt sie mittelst leinener Compressen, die aber nur klein sein dürfen, um das Auge nicht durch Druck zu irritiren, und die deshalb häufig gewechselt werden müssen, um stets in dem beabsichtigten Temperaturgrade einzuwirken. Warmes Wasser wird benützt, wo man Secrete entfernen, höheren Spannungsgrad und schmerzhaften Entzündungsreiz beseitigen will, kaltes Wasser zu antiphlogistischen Zwecken, dann auch um die Contractilität, den Tonus der Gewebe zu steigern, Bluterguss zur Resorption zu bringen, Ciliarhyperästhesie zu beseitigen etc. Arzneiliche Fomente, zu 4—6 Unzen verschrieben, sind, wie Collyrien überhaupt, am zweckmässigsten einfache *Infusa*, *Decocta* oder *Solutionen* leicht löslicher Substanzen. Als Vehikel der Lösungen wählt man destillirtes oder aromatisches Wasser, denen man, um das Auge durch gleichzeitige Reizung empfänglicher zu machen, Opiumtinctur oder Spir. vini camphorat. zusetzt.

Vom Augenwaschwasser gilt ziemlich dasselbe, nur ist dessen Wirkung eine mehr vorübergehende. Intensiver kann sie gemacht werden, wenn man die Flüssigkeit als Douche auf das Auge applicirt, entweder mittelst des *Himly'schen* Apparates, der einer Feuerspritze ähnlich construirt und mit Ansatzstücken zu strahl- und brauseförmiger Douche versehen ist, oder mittelst eines S förmig gebogenen, nach Art der Heberröhre wirkenden Barometerglases. Augenbäder in kleinen

Schaalen nehmen zu lassen, ist nicht empfehlenswerth, da wegen der geneigten Haltung des Kopfes leicht Congestionen eintreten. Günstiger wirken Bäder in fließendem Wasser, die *Celsus* schon anrieth, sich durch Eintauchen des kranken Auges in die bei den Römern häufig gewesenen Aquaducte zu verschaffen. — Bei Augenblennorrhoeen ist es meist vorzuziehen, die reinigenden Flüssigkeiten mittelst einer Spritze in das Auge gelangen zu lassen, um durch die Gewalt des Strahles gleichzeitig lösend auf die Secrete zu wirken. Zu dem Behufe öffnet man die Lider mit zwei Fingern und lässt den Inhalt der Spritze von einem Augenwinkel her über den Bulbus und durch die Bindehauttaschen wirken, wobei man die eigenen Augen vor der umherspritzenden, mit ansteckendem Secrete vermischten Flüssigkeit sicher zu stellen Sorge tragen muss.

Als Augentropfwässer kommen die Collyrien hauptsächlich bei different wirkenden Arzneimitteln in Anwendung, welche direct auf den Bulbus einwirken sollen. Sie wirken stets anfänglich reizend, doch dürfen sie nicht stärker sein, als um höchstens 10 Minuten den Kranken zu belästigen. Je ruhiger das Auge geschlossen gehalten wird, um so geringer sind die Beschwerden und um so günstiger stellt sich die Wirkung des Mittels ein. Behufs der Application neigt der Patient den Kopf rückwärts, das Unterlid wird am inneren Winkel etwas abgezogen und mittelst eines Tropfgläschens, eines Pinsels oder Löffels die Instillation vollzogen. Am liebsten bediene ich mich eines oben und unten abgeschnittenen Gänsefederkiels, der beiderseits offen so tief in die Flüssigkeit getaucht wird, als man ihn anfüllen will, dann mit einem Finger oben geschlossen und erst wieder über dem abgezogenen Lide geöffnet wird, um die Flüssigkeit auströpfeln zu lassen. Nach der Instillation wird das Auge einige Minuten geschlossen, dann dieselbe Procedur am andern Auge vorgenommen und dem Patienten nun ruhiges Verhalten angewiesen. Was über 1—3 Tropfen eingeträufelt wird, kommt nicht zur Wirkung, da es beim Schluss des Auges abfließt. Da solche Einträufelungen in der Regel nur einige Male täglich vorgenommen werden, braucht man nie mehr als 1—2 Drachmen zur Zeit zu verordnen.

Augenpinselwasser wird verordnet, wo man ein reizendes oder ätzendes Mittel nur auf eine beschränkte Partie einwirken lassen will. Ist die Flüssigkeit so reizend, dass sie einen Malerpinsel zerstören würde, so bedient man sich eines Asbestpinsels oder eines angekauten und zerfaserten Holzstäbchens und beauftragt einen Assistenten, unmittelbar nach der Application Wasser oder Oel auf die bepinselte Stelle zu bringen, damit die Aetzung auf die geätzte Stelle beschränkt bleibe.

B. Die *Augensalben* kommen ebenfalls sehr häufig zur Anwendung und zwar besonders wegen ihrer eingreifenderen und

nachhaltigeren Wirkungsweise. Sie sind hauptsächlich bei chronisch verlaufenden, torpiden Krankheitszuständen indicirt, wo Härten zu schmelzen, Relaxationen zu beseitigen und auf die Circulation und Ausscheidung bethätigend einzuwirken ist. Das passendste Constituens ist Schweineschmalz, dem man je nach der Vermischung mit öligen oder schweren mineralischen Substanzen oder in heisser Jahreszeit mehr weniger weisses Wachs zusetzt. Alle Zusätze müssen exactissime pulverisirt oder vorher aufgelöst und dann wieder exactissime mit dem Constituens verrieben und vermischt werden, um nicht mechanisch zu reizen oder durch ungleichmässige Vertheilung in der Salbenmasse ungleichmässig einzuwirken. Da Salben, besonders im Sommer, leicht ranzig werden, so verschreibe man in der Regel nicht mehr als 1—2 Drachmen. Sie werden am passendsten mittelst eines feinen Malerpinsels bei abgezogenem Unterlide auf den Lidrand, den Bulbus oder die Lidconjunctiva gestrichen, selten häufiger als zwei Mal täglich, doch muss das Auge vorher gereinigt sein und nachher eine Zeitlang geschlossen bleiben. Jedes Mal wird selten mehr als eine linsengrosse Portion erforderlich sein, da mehr zwischen den Lidern doch wieder vorquillt.

Salben für die Umgegend des Auges werden besonders Abends in grösseren Portionen einige Minuten hindurch kräftig in die Haut eingerieben und erst andern Morgens mit lauem Wasser vorsichtig abgewaschen, damit Nichts zwischen die Lider gelange.

C. *Cataplasmen* sind nur selten indicirt, besonders, wenn Zertheilung oder Eiterung am Auge zu befördern ist oder wenn man die in einem zerstörten Augapfel stattfindenden Schmerzen zu besänftigen beabsichtigt. Die Masse wird am passendsten aus Hafergrütze mit Schmalz und Milch oder aus Leinsamenmehl, Semmelkrume und dgl. m. gekocht, in kleinen Paqueten von 28—30° R. Wärme aufgelegt, damit das Auge nicht durch zu grosse Schwere oder zu starke Hitze belästigt werde, und c. alle 15 Minuten gewechselt. — Sind sehr heftige Schmerzen zu bekämpfen, so kann man Opium zusetzen oder den Brei mit etwas Cicuta kochen lassen. — Bei grosser Torpidität kann man einen Zusatz von Wein machen.

D. *Das Augenpulver*, im Alterthum häufig verordnet, findet in neuester Zeit mit Recht nur beschränkte Anwendung, besonders da, wo man durch mechanisch reizende Einwirkung den Säfteumsatz und damit die Aufsaugung von Exsudaten befördern will. Calomelpulver mit oder ohne Zucker wirkt nachgewiesener Weise, auf Hornhauttrübungen gebracht, nicht anders, wie jedes ähnliche Pulver, das mit einem Federbart aufgestrichen wird oder wie der blosse Federbart. Anders ist es, wenn die Pulver von solcher Substanz sind, dass sie sich in den Drüsensecreten lösen und chemisch wirken, oder wenn

sie, wie Plumb. acet. in der granulirten Lidbindehaut unmittelbar zur Wirkung kommen.

Wo auf fettige Einreibungen in der Nachbarschaft des Auges Erythem oder Pustelbildung eintritt, ist es eine alte Vorschrift, die wirksame Substanz, z. B. Opium, bei Augenschmerzen, für sich zu verordnen, um sie, mit Speichel vermischt, vom Patienten in der Umgebung des Auges einreiben zu lassen.

E. Aromatische und spirituöse Mischungen werden theils als Einreibungen, theils als Augendunstbäder gebraucht und über den geschlossenen Augen in der obern Gesichtshälfte eingerieben, dann auch nach Oeffnung der Augen mit der hohlen Hand vorgehalten, so dass sie bei der Verflüchtigung nervenstärkend und überhaupt anregend auf das torpide Augennervensystem wirken. In ähnlicher Weise lässt man die feuchtwarmen Dämpfe von aromatischen Theespecies mittelst eines Trichters an die Augen leiten und nimmt zu solchem Behuf Species aromatic., Sem. Fœnical. contus. Hb. Menth. pip. u. d. m. — oder, wenn man nur zertheilend und entspannend einwirken will, reines warmes Wasser.

Aromatische Kräutersäckchen sind nicht sehr zu empfehlen, da sie durch ihre Schwere das Auge belästigen. — Reizende Pflaster werden am Auge nicht ertragen, wesshalb englisches Pflaster oder Collodiumstreifen zur Fixirung zu empfehlen sind. Um einen hermetischen Schutzverband bei contagiöser Blennorrhoe des einen Auges anzuwenden, decke man leichte, trockne Charpie auf die geschlossenen Lider, befestige selbige mit Bleiweisspflasterstreifen und überstreiche diese wieder mit einer Collodiumschicht.

Die Anwendung der Electricität geschieht nach den im Allgemeinen geltenden Regeln, besonders gegen Anästhesie und zur Aufsaugung von Exsudaten, zumal in der Hornhaut, doch nur in seltenen Fällen mit baldgünstigem Erfolge.

Die gebräuchlichsten localen Mittel

in alphabetischer Anordnung.

Aether und ätherische Mittel kommen bei Anästhesien und Acinesen zur Anwendung, um die gesunkene Nervenaction anzuregen. Die Form muss dem übrigen Zustande des Auges angemessen sein, da zu starke Aetherwirkung zu Congestion und Inflammation hinführen würde. Aromatische Kräuterkissen, ätherische Dünste und Einreibungen sind den Bähungen und Tropfwässern vorzuziehen. Rec. Ung. nervin. dr. 3, Tinct. Cantharid. Mixt. oleos. balsam. aa scrup. 1. Mds. Einreibung in die Lider und die Nachbarschaft des Auges. — Rec. Balsam. Peruvian. scrup. 1. Naphth. vitriol. dr. 2. Mds. Augenspiritus. —

Rep. Spirit. Lavandul. — Serpyll. — Anthos, Menth. pip. aa unc. $\frac{1}{2}$, Lig. Ammon. anisat. Mixtur. oleos. balsam. aa dr. 1. Mds. Augenspiritus.

Alaun ist vielfach als kräftiges Adstringens in Lösungen von 1—3 Gran auf eine Unze Wasser empfohlen worden, um als Tropfwasser oder Bähung angewendet zu werden. *Richter* empfahl es auch, um zugleich mechanisch bei Hornhautverdunkelungen zu wirken, und liess es mit einer gleichen Quantität Sacchar. alb. zu Augenpulver sehr sorgfältig verreiben und von Zeit zu Zeit auf die Hornhaut pinseln oder von einem gefalteten Papiere einblasen. Gegen Atonie der Bindehäute. Rep. Alumin. crudi gr. 12, Aq. destill. unc. 4, Tinct. Opii croc. scrup. 1 Mds.

Aqua laurocerasi findet nur beschränkte örtliche Anwendung, da es dem Opium nicht gleich kommt. Gegen Hornhautflecke wird gerühmt Rep. Sal. ammoniac scrup. $\frac{1}{2}$, solve in Aq. lauroc. unc. 2. Ds. — Rep. Hydrarg. muriat. corros. gr. $\frac{1}{4}$, solve in Aq. Rosar. Aq. lauroc. aa unc. $\frac{1}{2}$. Ds. Zum Einträufeln. — Rep. Hydrarg. muriat. corros. gr. 1, solve in Aq. destill. unc. 7, adde Aq. lauroc. unc. 1. Ds. Zu lauwarmen Fomenten.

Aqua oxymuriatica hat *Fr. Jäger* mit Wasser verdünnt gegen das Granulationsstadium der Ophthalmia aegyptiaca empfehlen zu können geglaubt. Er verordnete eine Drachme auf vier Unzen destillirten Wassers.

Argentum nitric. ist in Substanz wie in Lösung mit Recht eines der gebräuchlichsten Augenheilmittel. Um die ätzende Kraft abzuschwächen, bedient man sich je nach Bedarf einer mit 1, 2, 3 oder 4 Theilen Nitrum dep. zusammengeschnittenen und stangenförmig ausgegossenen Mischung. *Arlt* scheint der Verbindung mit Gummi den Vorzug zu geben. Nach der Anwendung im Auge gebietet die Vorsicht, Oel auf die geätzte Stelle zu bringen oder mit angesäuertem Wasser nachzuspülen, um die Weiterverbreitung abgestossener Partikelchen zu verhüten. Stärkere Solutionen wirken in derselben Weise ätzend, da ihre Wirkung aber nicht wohl auf eine bestimmte Stelle beschränkt werden kann, so bedient man sich schwächerer Lösungen (von gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1—3 auf eine Unze destill. Wassers ad vitrum nigrum), um kräftig adstringirend bei Erschlaffung, Ulceration, Granulation der Bindehaut, bei Hornhautflecken u. d. a. einzuwirken. Von vorzüglicher Wirkung ist die Lösung auch bei profusen Schleimflüssen des Auges, ebenso bei Thränenfisteln, die *Richter* mit Arg. nitric. (scr. 1 in Aq. dest. und Spirit. vin. aa unc. 2 aufgelöst) auszuspritzen empfahl.

Die Salbenform wirkt intensiver und wird vorgezogen bei profuser Secretion und torpiden Wucherungen. Man lässt den Höllenstein (gr. $\frac{1}{2}$ —2) zunächst in einigen Tropfen aq. destill. lösen und dann mit zwei Drachmen frischen Schweineschmalzes sehr sorgfältig vermischen, um Abends oder Morgens und

Abends die so bereitete Salbe linsengross mittelst eines Haarpinsels in die untere Bindehauttasche zu streichen.

Die von *Guthrie* empfohlene und vielverordnete Salbe wurde besonders gegen Blennorrhoeen ursprünglich also verschrieben: Rep. Argent. nitric. cryst. gr. 2, Aq. Saturn. gtts. 10, Adip. suill. dr. 1 Mds. Unguent. ophthalm. nigrum. Bei hochgradiger Entzündung eignet sie sich nicht.

Arnica ist als Infus. der Blumen (dr. 1 ad unc. 1) sehr geeignet, um Commotionen, Contusionen, Blutergüsse und lähmungsdrohende Zustände zu beseitigen.

Arsenik findet nur beschränkte Anwendung. Von *Dupuytren* ist es in Pastenform empfohlen worden, um bei messerscheuen Kranken Fungositäten zu zerstören. Nach Entfernung des vertrockneten Secretes wird eine entsprechende Dosis des Pastenpulvers mit destillirtem Wasser oder Speichel zu einem nicht abfliessenden Teige angerührt und ungefähr $\frac{1}{2}$ Linie dick aufgetragen. Der entstehende Schorf fällt nach einigen Tagen ab, worauf die Operation so oft wiederholt wird, bis die Wunde rein ist und Neigung zur Verheilung zeigt. — Man lässt das Pulver aus drei Drachmen Mimosenpulver mit sechs Gran Arsenik und einem Zusatz von $1\frac{1}{2}$ Drachme Calomel bereiten.

Atropinum sulph. wird in neuester Zeit fast ausschliesslich gebraucht, um Pupillendilatation zu bewirken. Nach Dr. *de Ruiter* (Nederl. Lancet 1854. pag. 464) bewirkt die Einträufelung eines Tropfens einer Atropinlösung, in der nicht mehr als $\frac{1}{129600}$ Sulph. Atrop. enthalten ist, in das Auge eines Hundes gebracht, eine 20 Stunden währende Pupillendilatation. — Eine Auflösung von $\frac{1}{3600}$ im Tropfen gibt nach 10—15 Minuten eine 4 Tage währende, eine Auflösung von $\frac{1}{21600}$, 5—10 Minuten einwirkend, noch starke Dilatation, bisweilen selbst Unbeweglichkeit. Die Dilatation nach Anwendung einer Auflösung von $\frac{1}{1296000}$, 5 bis 10 Minuten lang einwirkend, tritt nach einer Stunde ein und währt 20 Stunden. Letztere Auflösung, 3 Mal verdünnt, hat noch merkbare Dilatation zur Folge, die erst bei 6maliger Verdünnung, also mit $\frac{1}{772600}$ Sulph. Atrop., zweifelhaft bleibt. Die Empfindlichkeit des Auges für Atropin ist um so überraschender, da man bedenken muss, dass von dem einzelnen Tropfen dieser schwachen Solution, die zur Erweiterung der Pupille ausreicht, vielleicht nicht der 50ste Theil aufgesogen wird. Es ist gelungen, mit dem inficirten Humor aqueus eines kunstmässig dilatirten Thierauges auch die Pupille eines andern Thieres zu dilatiren, und diese Procedur noch über mehrere Thiere fortzusetzen, indem man sich jedes Mal des Humor aqueus des vorher dem Experimente unterworfenen Auges bediente.

Weil die 4—8 Tage bei Menschen andauernde Lichtscheu nach Einträufelung starker Solution ausserordentlich lästig ist, so hat Prof. *Donders* in Utrecht, auf die *de Ruiter'schen* Ver-

suche gestützt, die folgenden sehr zweckmässigen Regeln für die Anwendungsart des Sulph. Atrop. aufgestellt (l. c.):

1) gr. iv in unc. j Aq. destill. — als Vorbereitung für Operationen, um drohender Synechie, Synicesis oder Prolapsus iridis vorzubeugen, um bei centraler Cataracte, centraler Hornhautverdunkelung das Sehen möglich zu machen.

2) Dieselbe Solution mit 15 Theilen Wasser verdünnt, um vollkommene Dilatation mit vorübergehender Unbeweglichkeit der Pupille zu bewirken behufs gründlicher Untersuchung der inneren Augentheile nach allen Richtungen. Die Dilatation erfolgt nach 30—45 Minuten und stört das Sehvermögen gewöhnlich nur 24 Stunden.

3) Dieselbe Solution mit 80 Theilen Wasser verdünnt, also ein Theil Sulph. Atrop. auf 9600 Theile Wasser, für gewöhnlich anzuwenden. Ein oder zwei Tropfen dieser Solution, einige Secunden zwischen die Augenlider gehalten, gibt nach 30—60 Minuten eine genügende Dilatation, um die meisten Augen gut zu untersuchen. Die Erweiterung ist nicht so stark, um das Gesicht merklich zu stören, und ist nach 8—36 Stunden gänzlich verschwunden. (Cfr. Die künstliche Pupille vor und in dem Auge von Dr. C. H. Schauenburg. Lahr. 1854. J. H. Geiger. pag. 13 u. 14.)

Belladonna ist eines der geeignetsten Narcotica bei heftigen Augenschmerzen. Man kann das Extract pur verordnen und dem Patienten aufgeben, einige Male täglich eine kleine Portion mit Speichel in der Nachbarschaft des Auges einzureiben. Zweckmässiger lässt man ein schwaches Infusum als Foment gebrauchen. — Zur künstlichen Pupillendilatation benutzte man früher, als das Atropin noch weniger in Aufnahme war, die *Belladonna*, indem man ein aus einer halben Drachme bereitetes Infusum von unc. $\frac{1}{2}$ eine Stunde vor der Operation einträufelte.

Blei ist dem Zink ähnlich, nur hat es noch die Eigenschaft ausserdem, auf absondernde Flächen in höherem Grade austrocknend zu wirken und in Cornealgeschwüren als weisslich trübe Incrustation sich niederzuschlagen, wesshalb es bei letzteren contraindicirt ist. Bei traumatischen Augenentzündungen kann man es indess sehr passend als Bähung benutzen, indem man die Aq. saturn. rein oder verdünnt aufschlagen lässt oder nach *Rust* verordnet Rep. Acet. plumb. dr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 4. Mds. Augenbähung.

Ebenso eignet sich bei Conjunctivalatonie mit profusem Schleimausfluss Rep. Acet. plumb. gutt. 10 Aq. flor. Sambuc. unc. 1, Tinct. Opii simpl. gutt. 20 Mds. oder Rep. Plumb. acet. gr. 2—4, Aq. destill. unc. 1. Tinct. Opii simpl. scr. $\frac{1}{2}$ —1. Mds. Augentropfwasser. Rep. Extr. Opii, Plumb. acet. aa gr. 8 solve in Aq. dest. unc. 4. Adde celeriter quassando Mucilag. sem. Psyllii dr. 2. Mds. Augenwasser bei erethischen und catarrhalischen

Augenentzündungen. Rep. Minii dr. 1 Ung. rosat. unc. $\frac{1}{3}$. Mds. Salbe gegen Excoriationen von scharfen Thränen.

Plumb. acet. ist in Pulverform vielfältig empfohlen, um auf Bindehautgranulationen, besonders trachomatöser Natur gepinselt zu werden und die rückgängige Metamorphose der *granula* einzuleiten. Doch steht es in dieser Beziehung dem Argent. nitr. nach.

Blutegel können bei höheren Entzündungsgraden selten entbehrt werden, doch wird deren Nutzen wesentlich durch die Art und die Stelle der Application bedingt. Als erster Grundsatz gilt, dass man sie nicht im Bereiche der Orbita selbst ansetzt. Auf den Bindehäuten würden sie, ebenso wie auf den entzündeten Lidern, den Reiz steigern. Je nach dem Zwecke, den man erreichen will, setzt man eine grössere Anzahl auf den unteren Orbitalrand, oder man applicirt am Zitzenfortsatze hinter dem Ohre und unterhält die Nachblutung stundenlang durch Auflegen warmer Breiaufschläge. Die Application in dem Nasenloch der entsprechenden Seite ist vielfach empfohlen worden. Um der Wiederkehr der Phlogose zu begegnen, kann man eine continuirliche Blutströmung dadurch bewirken, dass man zur Zeit je einen Blutegel applicirt und sofort einen anderen ansetzt, wenn die Nachblutung aufhört, um mit dieser Art der Blutentleerung 12—24 Stunden fortzufahren.

Von den künstlichen Blutegeln ist besonders der *Heurteloup'sche* Apparat in Aufnahme gekommen.

Bolus, besonders der armenische, wirkt zusammenziehend und austrocknend, wesshalb er, früher mehr als jetzt, bei profusen Blennorrhoeen in Anwendung kommt. — Mit gleichen Theilen von Tart. dep. Tutia ppt. und Sacch. alb. bildet er das gegen Hornhautflecke und Pterygium empfohlene *Baldinger'sche* Augenpulver.

Borax scheint als resorptionbeförderndes Mittel mehr Anerkennung zu verdienen, als ihm gewöhnlich gezollt wird. Bei allen Hornhauttrübungen, besonders bei atonischem Pannus, habe ich ihn wiederholt mit Nutzen angewendet. Gegen Hornhautflecke verordnet *Horgens*: Rep. Borac. scrup. $\frac{1}{2}$, Aq. Lauroc. unc. 2, solve. D. s. Zum Einträufeln. — *Beer* und *Andreæ* lassen folgendes Pulver bei Augenfell einmal täglich aufpinseln: Rep. Borac., Vitriol. albi, Aluminis usti aa scrup. $\frac{1}{2}$, Sacch. alb. scrup. 1, M. f. pulv. subtiliss. — *Richter* gegen Hornhautflecke als Tropfwasser: Rep. Borac. Sacch. alb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ solve in Aq. Rosar. unc. $\frac{1}{2}$, filtra et adde Extr. Opii, Extr. Aloës aa gr. $1\frac{1}{2}$, iterum solve D. s. Wohlumgeschüttelt einige Mal täglich einzuträufeln.

Canthariden werden als Zugpflaster vielfach behufs Ableitung hinter das Ohr der kranken Seite oder in den Nacken

suche gestützt, die folgenden sehr zweckmässigen Regeln für die Anwendungsart des Sulph. Atrop. aufgestellt (l. c.):

1) gr. iv in unc. j Aq. destill. — als Vorbereitung für Operationen, um drohender Synechie, Synicesis oder Prolapsus iridis vorzubeugen, um bei centraler Cataracte, centraler Hornhautverdunkelung das Sehen möglich zu machen.

2) Dieselbe Solution mit 15 Theilen Wasser verdünnt, um vollkommene Dilatation mit vorübergehender Unbeweglichkeit der Pupille zu bewirken behufs gründlicher Untersuchung der inneren Augentheile nach allen Richtungen. Die Dilatation erfolgt nach 30—45 Minuten und stört das Sehvermögen gewöhnlich nur 24 Stunden.

3) Dieselbe Solution mit 80 Theilen Wasser verdünnt, also ein Theil Sulph. Atrop. auf 9600 Theile Wasser, für gewöhnlich anzuwenden. Ein oder zwei Tropfen dieser Solution, einige Secunden zwischen die Augenlider gehalten, gibt nach 30—60 Minuten eine genügende Dilatation, um die meisten Augen gut zu untersuchen. Die Erweiterung ist nicht so stark, um das Gesicht merklich zu stören, und ist nach 8—36 Stunden gänzlich verschwunden. (Cfr. Die künstliche Pupille vor und in dem Auge von Dr. C. H. Schauenburg. Lahr. 1854. J. H. Geiger. pag. 13 u. 14.)

Belladonna ist eines der geeignetsten Narcotica bei heftigen Augenschmerzen. Man kann das Extract pur verordnen und dem Patienten aufgeben, einige Male täglich eine kleine Portion mit Speichel in der Nachbarschaft des Auges einzureiben. Zweckmässiger lässt man ein schwaches Infusum als Foment gebrauchen. — Zur künstlichen Pupillendilatation benutzte man früher, als das Atropin noch weniger in Aufnahme war, die *Belladonna*, indem man ein aus einer halben Drachme bereitetes Infusum von unc. $\frac{1}{2}$ eine Stunde vor der Operation einträufelte.

Blei ist dem Zink ähnlich, nur hat es noch die Eigenschaft ausserdem, auf absondernde Flächen in höherem Grade austrocknend zu wirken und in Cornealgeschwüren als weisslich trübe Incrustation sich niederzuschlagen, wesshalb es bei letzteren contraindicirt ist. Bei traumatischen Augenentzündungen kann man es indess sehr passend als Bähung benutzen, indem man die Aq. saturn. rein oder verdünnt aufschlagen lässt oder nach *Rust* verordnet Rep. Acet. plumb. dr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 4. Mds. Augenbähung.

Ebenso eignet sich bei Conjunctivalatonie mit profusem Schleimausfluss Rep. Acet. plumb. gutt. 10 Aq. flor. Sambuc. unc. 1, Tinct. Opii simpl. gutt. 20 Mds. oder Rep. Plumb. acet. gr. 2—4, Aq. destill. unc. 1. Tinct. Opii simpl. scr. $\frac{1}{2}$ —1. Mds. Augentropfwasser. Rep. Extr. Opii, Plumb. acet. aa gr. 8 solve in Aq. dest. unc. 4. Adde celeriter quassando Mucilag. sem. Psyllii dr. 2. Mds. Augenwasser bei erethischen und catarrhalischen

Augenentzündungen. Rep. Minii dr. 1 Ung. rosat. unc. $\frac{1}{3}$. Mds. Salbe gegen Excoriationen von scharfen Thränen.

Plumb. acet. ist in Pulverform vielfältig empfohlen, um auf Bindehautgranulationen, besonders trachomatöser Natur gepinselt zu werden und die rückgängige Metamorphose der *granula* einzuleiten. Doch steht es in dieser Beziehung dem Argent. nitr. nach.

Blutegel können bei höheren Entzündungsgraden selten entbehrt werden, doch wird deren Nutzen wesentlich durch die Art und die Stelle der Application bedingt. Als erster Grundsatz gilt, dass man sie nicht im Bereiche der Orbita selbst ansetzt. Auf den Bindehäuten würden sie, ebenso wie auf den entzündeten Lidern, den Reiz steigern. Je nach dem Zwecke, den man erreichen will, setzt man eine grössere Anzahl auf den unteren Orbitalrand, oder man applicirt am Zitzenfortsatze hinter dem Ohre und unterhält die Nachblutung stundenlang durch Auflegen warmer Breiaufschläge. Die Application in dem Nasenloch der entsprechenden Seite ist vielfach empfohlen worden. Um der Wiederkehr der Phlogose zu begegnen, kann man eine continuirliche Blutströmung dadurch bewirken, dass man zur Zeit je einen Blutegel applicirt und sofort einen anderen ansetzt, wenn die Nachblutung aufhört, um mit dieser Art der Blutentleerung 12—24 Stunden fortzufahren.

Von den künstlichen Blutegeln ist besonders der *Heurteloup'sche* Apparat in Aufnahme gekommen.

Bolus, besonders der armenische, wirkt zusammenziehend und austrocknend, wesshalb er, früher mehr als jetzt, bei profusen Blennorrhoeen in Anwendung kommt. — Mit gleichen Theilen von Tart. dep. Tutia ppt. und Sacch. alb. bildet er das gegen Hornhautflecke und Pterygium empfohlene *Baldinger'sche* Augenpulver.

Borax scheint als resorptionbeförderndes Mittel mehr Anerkennung zu verdienen, als ihm gewöhnlich gezollt wird. Bei allen Hornhauttrübungen, besonders bei atonischem Pannus, habe ich ihn wiederholt mit Nutzen angewendet. Gegen Hornhautflecke verordnet *Horgens*: Rep. Borac. scrup. $\frac{1}{2}$, Aq. Lauroc. unc. 2, solve. D. s. Zum Einträufeln. — *Beer* und *Andräe* lassen folgendes Pulver bei Augenfell einmal täglich aufpinseln: Rep. Borac., Vitriol. albi, Aluminis usti aa scrup. $\frac{1}{2}$, Sacch. alb. scrup. 1, M. f. pulv. subtiliss. — *Richter* gegen Hornhautflecke als Tropfwasser: Rep. Borac. Sacch. alb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ solve in Aq. Rosar. unc. $\frac{1}{2}$, filtra et adde Extr. Opii, Extr. Aloës aa gr. $1\frac{1}{2}$, iterum solve D. s. Wohlumgeschüttelt einige Mal täglich einzuträufeln.

Canthariden werden als Zugpflaster vielfach behufs Ableitung hinter das Ohr der kranken Seite oder in den Nacken

suche gestützt, die folgenden sehr zweckmässigen Regeln für die Anwendungsart des Sulph. Atrop. aufgestellt (l. c.):

1) gr. iv in unc. j Aq. destill. — als Vorbereitung für Operationen, um drohender Synechie, Synicesis oder Prolapsus iridis vorzubeugen, um bei centraler Cataracte, centraler Hornhautverdunkelung das Sehen möglich zu machen.

2) Dieselbe Solution mit 15 Theilen Wasser verdünnt, um vollkommene Dilatation mit vorübergehender Unbeweglichkeit der Pupille zu bewirken behufs gründlicher Untersuchung der inneren Augentheile nach allen Richtungen. Die Dilatation erfolgt nach 30—45 Minuten und stört das Sehvermögen gewöhnlich nur 24 Stunden.

3) Dieselbe Solution mit 80 Theilen Wasser verdünnt, also ein Theil Sulph. Atrop. auf 9600 Theile Wasser, für gewöhnlich anzuwenden. Ein oder zwei Tropfen dieser Solution, einige Secunden zwischen die Augenlider gehalten, gibt nach 30—60 Minuten eine genügende Dilatation, um die meisten Augen gut zu untersuchen. Die Erweiterung ist nicht so stark, um das Gesicht merklich zu stören, und ist nach 8—36 Stunden gänzlich verschwunden. (Cfr. Die künstliche Pupille vor und in dem Auge von Dr. C. H. Schauenburg. Lahr. 1854. J. H. Geiger. pag. 13 u. 14.)

Belladonna ist eines der geeignetsten Narcotica bei heftigen Augenschmerzen. Man kann das Extract pur verordnen und dem Patienten aufgeben, einige Male täglich eine kleine Portion mit Speichel in der Nachbarschaft des Auges einzureiben. Zweckmässiger lässt man ein schwaches Infusum als Foment gebrauchen. — Zur künstlichen Pupillendilatation benutzte man früher, als das Atropin noch weniger in Aufnahme war, die Belladonna, indem man ein aus einer halben Drachme bereitetes Infusum von unc. $\frac{1}{2}$ eine Stunde vor der Operation einträufelte.

Blei ist dem Zink ähnlich, nur hat es noch die Eigenschaft ausserdem, auf absondernde Flächen in höherem Grade austrocknend zu wirken und in Cornealgeschwüren als weisslich trübe Incrustation sich niederzuschlagen, wesshalb es bei letzteren contraindicirt ist. Bei traumatischen Augenentzündungen kann man es indess sehr passend als Bähung benutzen, indem man die Aq. saturn. rein oder verdünnt aufschlagen lässt oder nach **Rust** verordnet Rep. Acet. plumb. dr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 4. Mds. Augenbähung.

Ebenso eignet sich bei Conjunctivalatonie mit profusem Schleimausfluss Rep. Acet. plumb. gutt. 10 Aq. flor. Sambuc. unc. 1, Tinct. Opii simpl. gutt. 20 Mds. oder Rep. Plumb. acet. gr. 2—4, Aq. destill. unc. 1. Tinct. Opii simpl. scr. $\frac{1}{2}$ —1. Mds. Augentropfwasser. Rep. Extr. Opii, Plumb. acet. aa gr. 8 solve in Aq. dest. unc. 4. Adde celeriter quassando Mucilag. sem. Psyllii dr. 2. Mds. Augenwasser bei erethischen und catarrhalischen

Augenentzündungen. Rep. Minii dr. 1 Ung. rosat. unc. $\frac{1}{3}$. Mds. Salbe gegen Excoriationen von scharfen Thränen.

Plumb. acet. ist in Pulverform vielfältig empfohlen, um auf Bindehautgranulationen, besonders trachomatöser Natur gepinselt zu werden und die rückgängige Metamorphose der *granula* einzuleiten. Doch steht es in dieser Beziehung dem Argent. nitr. nach.

Blutegel können bei höheren Entzündungsgraden selten entbehrt werden, doch wird deren Nutzen wesentlich durch die Art und die Stelle der Application bedingt. Als erster Grundsatz gilt, dass man sie nicht im Bereiche der Orbita selbst ansetzt. Auf den Bindehäuten würden sie, ebenso wie auf den entzündeten Lidern, den Reiz steigern. Je nach dem Zwecke, den man erreichen will, setzt man eine grössere Anzahl auf den unteren Orbitalrand, oder man applicirt am Zitzenfortsatze hinter dem Ohre und unterhält die Nachblutung stundenlang durch Auflegen warmer Breiaufschläge. Die Application in dem Nasenloch der entsprechenden Seite ist vielfach empfohlen worden. Um der Wiederkehr der Phlogose zu begegnen, kann man eine continuirliche Blutströmung dadurch bewirken, dass man zur Zeit je einen Blutegel applicirt und sofort einen anderen ansetzt, wenn die Nachblutung aufhört, um mit dieser Art der Blutentleerung 12—24 Stunden fortzufahren.

Von den künstlichen Blutegeln ist besonders der *Heurteloup'sche* Apparat in Aufnahme gekommen.

Bolus, besonders der armenische, wirkt zusammenziehend und austrocknend, wesshalb er, früher mehr als jetzt, bei profusen Blennorrhoeen in Anwendung kommt. — Mit gleichen Theilen von Tart. dep. Tutia ppt. und Sacch. alb. bildet er das gegen Hornhautflecke und Pterygium empfohlene *Baldinger'sche* Augenpulver.

Borax scheint als resorptionbeförderndes Mittel mehr Anerkennung zu verdienen, als ihm gewöhnlich gezollt wird. Bei allen Hornhauttrübungen, besonders bei atonischem Pannus, habe ich ihn wiederholt mit Nutzen angewendet. Gegen Hornhautflecke verordnet *Horgens*: Rep. Borac. scrup. $\frac{1}{2}$, Aq. Lauroc. unc. 2, solve. D. s. Zum Einträufeln. — *Beer* und *Andrae* lassen folgendes Pulver bei Augenfell einmal täglich aufpinseln: Rep. Borac., Vitriol. albi, Aluminis usti aa scrup. $\frac{1}{2}$, Sacch. alb. scrup. 1, M. f. pulv. subtiliss. — *Richter* gegen Hornhautflecke als Tropfwasser: Rep. Borac. Sacch. alb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ solve in Aq. Rosar. unc. $\frac{1}{2}$, filtra et adde Extr. Opii, Extr. Aloës aa gr. $1\frac{1}{2}$, iterum solve D. s. Wohlumgeschüttelt einige Mal täglich einzuträufeln.

Canthariden werden als Zugpflaster vielfach behufs Ableitung hinter das Ohr der kranken Seite oder in den Nacken

suche gestützt, die folgenden sehr zweckmässigen Regeln für die Anwendungsart des Sulph. Atrop. aufgestellt (l. c.):

1) gr. iv in unc. j Aq. destill. — als Vorbereitung für Operationen, um drohender Synechie, Synicesis oder Prolapsus iridis vorzubeugen, um bei centraler Cataracte, centraler Hornhautverdunkelung das Sehen möglich zu machen.

2) Dieselbe Solution mit 15 Theilen Wasser verdünnt, um vollkommene Dilatation mit vorübergehender Unbeweglichkeit der Pupille zu bewirken behufs gründlicher Untersuchung der inneren Augentheile nach allen Richtungen. Die Dilatation erfolgt nach 30—45 Minuten und stört das Sehvermögen gewöhnlich nur 24 Stunden.

3) Dieselbe Solution mit 80 Theilen Wasser verdünnt, also ein Theil Sulph. Atrop. auf 9600 Theile Wasser, für gewöhnlich anzuwenden. Ein oder zwei Tropfen dieser Solution, einige Secunden zwischen die Augenlider gehalten, gibt nach 30—60 Minuten eine genügende Dilatation, um die meisten Augen gut zu untersuchen. Die Erweiterung ist nicht so stark, um das Gesicht merklich zu stören, und ist nach 8—36 Stunden gänzlich verschwunden. (Cfr. Die künstliche Pupille vor und in dem Auge von Dr. C. H. Schauenburg. Lahr. 1854. J. H. Geiger. pag. 13 u. 14.)

Belladonna ist eines der geeignetsten Narcotica bei heftigen Augenschmerzen. Man kann das Extract pur verordnen und dem Patienten aufgeben, einige Male täglich eine kleine Portion mit Speichel in der Nachbarschaft des Auges einzureiben. Zweckmässiger lässt man ein schwaches Infusum als Foment gebrauchen. — Zur künstlichen Pupillendilatation benutzte man früher, als das Atropin noch weniger in Aufnahme war, die Belladonna, indem man ein aus einer halben Drachme bereitetes Infusum von unc. $\frac{1}{2}$ eine Stunde vor der Operation einträufelte.

Blei ist dem Zink ähnlich, nur hat es noch die Eigenschaft ausserdem, auf absondernde Flächen in höherem Grade austrocknend zu wirken und in Cornealgeschwüren als weisslich trübe Incrustation sich niederzuschlagen, wesshalb es bei letzteren contraindicirt ist. Bei traumatischen Augenentzündungen kann man es indess sehr passend als Bähung benutzen, indem man die Aq. saturn. rein oder verdünnt aufschlagen lässt oder nach **Rust** verordnet Rep. Acet. plumb. dr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 4. Mds. Augenbähung.

Ebenso eignet sich bei Conjunctivalatonie mit profusem Schleimausfluss Rep. Acet. plumb. gutt. 10 Aq. flor. Sambuc. unc. 1, Tinct. Opii simpl. gutt. 20 Mds. oder Rep. Plumb. acet. gr. 2—4, Aq. destill. unc. 1. Tinct. Opii simpl. scr. $\frac{1}{2}$ —1. Mds. Augentropfwasser. Rep. Extr. Opii, Plumb. acet. aa gr. 8 solve in Aq. dest. unc. 4. Adde celeriter quassando Mucilag. sem. Psyllii dr. 2. Mds. Augenwasser bei erethischen und catarrhalischen

Augenentzündungen. *Rep. Minii dr. 1 Ung. rosat. unc. $\frac{1}{3}$. Mds.*
Salbe gegen Excoriationen von scharfen Thränen.

Plumb. acet. ist in Pulverform vielfältig empfohlen, um auf Bindehautgranulationen, besonders trachomatöser Natur gepinselt zu werden und die rückgängige Metamorphose der *granula* einzuleiten. Doch steht es in dieser Beziehung dem *Argent. nitr.* nach.

Blutegel können bei höheren Entzündungsgraden selten entbehrt werden, doch wird deren Nutzen wesentlich durch die Art und die Stelle der Application bedingt. Als erster Grundsatz gilt, dass man sie nicht im Bereiche der Orbita selbst ansetzt. Auf den Bindehäuten würden sie, ebenso wie auf den entzündeten Lidern, den Reiz steigern. Je nach dem Zwecke, den man erreichen will, setzt man eine grössere Anzahl auf den unteren Orbitalrand, oder man applicirt am Zitzenfortsatze hinter dem Ohre und unterhält die Nachblutung stundenlang durch Auflegen warmer Breiaufschläge. Die Application in dem Nasenloch der entsprechenden Seite ist vielfach empfohlen worden. Um der Wiederkehr der Phlogose zu begegnen, kann man eine continuirliche Blutströmung dadurch bewirken, dass man zur Zeit je einen Blutegel applicirt und sofort einen anderen ansetzt, wenn die Nachblutung aufhört, um mit dieser Art der Blutentleerung 12—24 Stunden fortzufahren.

Von den künstlichen Blutegeln ist besonders der *Heurteloup'sche* Apparat in Aufnahme gekommen.

Bolus, besonders der armenische, wirkt zusammenziehend und austrocknend, wesshalb er, früher mehr als jetzt, bei profusen Blennorrhoeen in Anwendung kommt. — Mit gleichen Theilen von *Tart. dep.* *Tutia ppt.* und *Sacch. alb.* bildet er das gegen Hornhautflecke und Pterygium empfohlene *Baldinger'sche* Augenpulver.

Borax scheint als resorptionbeförderndes Mittel mehr Anerkennung zu verdienen, als ihm gewöhnlich gezollt wird. Bei allen Hornhauttrübungen, besonders bei atonischem Pannus, habe ich ihn wiederholt mit Nutzen angewendet. Gegen Hornhautflecke verordnet *Horgens*: *Rep. Borac. scrup. $\frac{1}{2}$, Aq. Lauroc. unc. 2, solve. D. s.* Zum Einträufeln. — *Beer* und *Andreæ* lassen folgendes Pulver bei Augenfell einmal täglich aufpinseln: *Rep. Borac., Vitriol. albi, Aluminis usti aa scrup. $\frac{1}{2}$, Sacch. alb. scrup. 1, M. f. pulv. subtiliss.* — *Richter* gegen Hornhautflecke als Tropfwasser: *Rep. Borac. Sacch. alb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ solve in Aq. Rosar. unc. $\frac{1}{2}$, filtra et adde Extr. Opii, Extr. Aloës aa gr. $1\frac{1}{2}$, iterum solve D. s.* Wohlumgeschüttelt einige Mal täglich einzuträufeln.

Canthariden werden als Zugpflaster vielfach behufs Ableitung hinter das Ohr der kranken Seite oder in den Nacken

suche gestützt, die folgenden sehr zweckmässigen Regeln für die Anwendungsart des Sulph. Atrop. aufgestellt (l. c.):

1) gr. iv in unc. j Aq. destill. — als Vorbereitung für Operationen, um drohender Synechie, Synicesis oder Prolapsus iridis vorzubeugen, um bei centraler Cataracte, centraler Hornhautverdunkelung das Sehen möglich zu machen.

2) Dieselbe Solution mit 15 Theilen Wasser verdünnt, um vollkommene Dilatation mit vorübergehender Unbeweglichkeit der Pupille zu bewirken behufs gründlicher Untersuchung der inneren Augentheile nach allen Richtungen. Die Dilatation erfolgt nach 30—45 Minuten und stört das Sehvermögen gewöhnlich nur 24 Stunden.

3) Dieselbe Solution mit 80 Theilen Wasser verdünnt, also ein Theil Sulph. Atrop. auf 9600 Theile Wasser, für gewöhnlich anzuwenden. Ein oder zwei Tropfen dieser Solution, einige Secunden zwischen die Augenlider gehalten, gibt nach 30—60 Minuten eine genügende Dilatation, um die meisten Augen gut zu untersuchen. Die Erweiterung ist nicht so stark, um das Gesicht merklich zu stören, und ist nach 8—36 Stunden gänzlich verschwunden. (Cfr. Die künstliche Pupille vor und in dem Auge von Dr. C. H. Schauenburg. Lahr. 1854. J. H. Geiger. pag. 13 u. 14.)

Belladonna ist eines der geeignetsten Narcotica bei heftigen Augenschmerzen. Man kann das Extract pur verordnen und dem Patienten aufgeben, einige Male täglich eine kleine Portion mit Speichel in der Nachbarschaft des Auges einzureiben. Zweckmässiger lässt man ein schwaches Infusum als Foment gebrauchen. — Zur künstlichen Pupillendilatation benutzte man früher, als das Atropin noch weniger in Aufnahme war, die *Belladonna*, indem man ein aus einer halben Drachme bereitetes Infusum von unc. $\frac{1}{2}$ eine Stunde vor der Operation einträufelte.

Blei ist dem Zink ähnlich, nur hat es noch die Eigenschaft ausserdem, auf absondernde Flächen in höherem Grade austrocknend zu wirken und in Cornealgeschwüren als weisslich trübe Incrustation sich niederzuschlagen, wesshalb es bei letzteren contraindicirt ist. Bei traumatischen Augenentzündungen kann man es indess sehr passend als Bähung benutzen, indem man die Aq. saturn. rein oder verdünnt aufschlagen lässt oder nach *Rust* verordnet Rcp. Acet. plumb. dr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 4. Mds. Augenbähung.

Ebenso eignet sich bei Conjunctivalatonie mit profusem Schleimausfluss Rcp. Acet. plumb. gutt. 10 Aq. flor. Sambuc. unc. 1, Tinct. Opii simpl. gutt. 20 Mds. oder Rcp. Plumb. acet. gr. 2—4, Aq. destill. unc. 1. Tinct. Opii simpl. scr. $\frac{1}{2}$ —1. Mds. Augentropfwasser. Rcp. Extr. Opii, Plumb. acet. aa gr. 8 solve in Aq. dest. unc. 4. Adde celeriter quassando Mucilag. sem. Psyllii dr. 2. Mds. Augenwasser bei erethischen und catarrhalischen

Augenentzündungen. *Rep. Minii dr. 1 Ung. rosat. unc. $\frac{1}{3}$. Mds.*
Salbe gegen Excoriationen von scharfen Thränen.

Plumb. acet. ist in Pulverform vielfältig empfohlen, um auf Bindehautgranulationen, besonders trachomatöser Natur gepinselt zu werden und die rückgängige Metamorphose der *granula* einzuleiten. Doch steht es in dieser Beziehung dem *Argent. nitr.* nach.

Blutegel können bei höheren Entzündungsgraden selten entbehrt werden, doch wird deren Nutzen wesentlich durch die Art und die Stelle der Application bedingt. Als erster Grundsatz gilt, dass man sie nicht im Bereiche der Orbita selbst ansetzt. Auf den Bindehäuten würden sie, ebenso wie auf den entzündeten Lidern, den Reiz steigern. Je nach dem Zwecke, den man erreichen will, setzt man eine grössere Anzahl auf den unteren Orbitalrand, oder man applicirt am Zitzenfortsatze hinter dem Ohre und unterhält die Nachblutung stundenlang durch Auflegen warmer Breiaufschläge. Die Application in dem Nasenloch der entsprechenden Seite ist vielfach empfohlen worden. Um der Wiederkehr der Phlogose zu begegnen, kann man eine continuirliche Blutströmung dadurch bewirken, dass man zur Zeit je einen Blutegel applicirt und sofort einen anderen ansetzt, wenn die Nachblutung aufhört, um mit dieser Art der Blutentleerung 12—24 Stunden fortzufahren.

Von den künstlichen Blutegeln ist besonders der *Heurteloup'sche* Apparat in Aufnahme gekommen.

Bolus, besonders der armenische, wirkt zusammenziehend und austrocknend, wesshalb er, früher mehr als jetzt, bei profusen Blennorrhoeen in Anwendung kommt. — Mit gleichen Theilen von *Tart. dep. Tutia ppt.* und *Sacch. alb.* bildet er das gegen Hornhautflecker und Pterygium empfohlene *Baldinger'sche* Augenpulver.

Borax scheint als resorptionbeförderndes Mittel mehr Anerkennung zu verdienen, als ihm gewöhnlich gezollt wird. Bei allen Hornhauttrübungen, besonders bei atonischem Pannus, habe ich ihn wiederholt mit Nutzen angewendet. Gegen Hornhautflecker verordnet *Horgens*: *Rep. Borac. scrup. $\frac{1}{2}$, Aq. Lauroc. unc. 2, solve. D. s.* Zum Einträufeln. — *Beer* und *Andreæ* lassen folgendes Pulver bei Augenfell einmal täglich aufpinseln: *Rep. Borac., Vitriol. albi, Aluminis usti aa scrup. $\frac{1}{2}$, Sacch. alb. scrup. 1, M. f. pulv. subtiliss.* — *Richter* gegen Hornhautflecker als Tropfwasser: *Rep. Borac. Sacch. alb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ solve in Aq. Rosar. unc. $\frac{1}{2}$, filtra et adde Extr. Opii, Extr. Aloës aa gr. $1\frac{1}{2}$, iterum solve D. s.* Wohlumgeschüttelt einige Mal täglich einzuträufeln.

Canthariden werden als Zugpflaster vielfach behufs Ableitung hinter das Ohr der kranken Seite oder in den Nacken

ist der Verlust der Thränendrüse für das Auge keineswegs von solchem Nachtheile, als man lange Zeit annahm, da die Befeuchtung des Bulbus, wie die Erfahrung lehrt, dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die **Thränensackfistel** hat man auf die verschiedenartigste Weise zu heben gesucht und eine grosse Reihe von Methoden bezeugt die Schwierigkeit der Aufgabe. Zur Lösung derselben hat man drei verschiedene Wege eingeschlagen, indem man

- 1) den normalen Thränencanal durch Injection, Katheterismus, Dilatation oder Cauterisation zu restituiren versucht,
- 2) einen neuen Abflusscanal etablirt (durch Perforation des Thränenbeines oder Eröffnung des *antr. Highmor.*) oder
- 3) den Thränenschlauch vollständig verödet hat.

In neuester Zeit wird vorwiegend die letztere Methode ausgeübt, da sie ebenso zuverlässig ist, als alle übrigen unzuverlässig, und keineswegs stets lästiges Thränenträufeln zur Folge hat. Vielmehr scheinen bei aufgehobener Thränenableitung auch weniger Thränen producirt zu werden und zwar nicht mehr, als vom Bulbus leicht verdünsten.

Ist der Thränennasengang nicht verwachsen, sondern nur verstopft, so suche man ihn durch Injection von Flüssigkeiten oder Luft (*v. Gräfe*) wieder wegsam zu machen, prüfe aber sorgfältig mit der Sonde, ob nicht etwa schon Caries vorhanden ist, da dieselbe jede Herstellung des normalen Abflusses regelmässig vereitelt.

Behufs Ausspritzung des Schlauches mittelst der Anel'schen Spritze stellt man sich hinter den Kranken, fixirt dessen Kopf auf seiner Brust und hält das Röhrchen zuerst leise auf den unteren Thränenpunkt, bis derselbe die Berührung erträgt und sich nicht mehr contrahirt. Dann senkt man ihn c. 1''' tief ein und drückt mit mässiger Kraft auf den Stempel, lässt dann nach, um die eingedrungene Flüssigkeit nebst gelöstem Schleim auszudrücken und wiederholt diese Procedur in jeder Sitzung einige Male.

Anel führte seine feinen silbernen Knopfsonden auf dieselbe Weise ein und bis in die Nase durch; da aber Laesionen oft schwer zu vermeiden sind, so betrachtet man mit Recht das *Gensoul'sche* Verfahren als im Allgemeinen vorzüglicher. Dessen Sonde, die von der Nase her eingebracht wird, ist einem verkleinerten männlichen Katheter nicht ganz unähnlich und wird mit abwärts gewendeter Spitze c. 1'' tief auf dem Boden der Nasenhöhle vorgeschoben, dann gibt man ihr eine Seitwärtsdrehung, so dass sie in den unteren Nasengang eindringt, bei vorsichtigem Zurückziehen und Andrängen die Schleimhautklappe abdrückt und so auch in den Thränennasencanal gelangt.

Mejean führte von dem Thränenpunkte aus eine geöhrte Sonde in den Nasengang und nach Aussen, um einen Faden

einziehen und durch den Thränenpunkt hervorbringen zu können. Es gelingt nicht, auf die Art den verengten Thränennasengang zu dilatiren; vielmehr verursacht dies Verfahren Reizung, Entzündung und oft gänzliche Verwachsung.

Petit's Methode war lange Zeit die anerkannteste und hat zu verschiedenen Variationen geführt. Sie wird am besten nach *Schlemm* so verrichtet, dass man den Daumen der linken Hand dicht an den äusseren Augenwinkel legt, so dass die flache Hand beim linken Auge neben den Mund des Kranken, beim rechten auf die Schläfe und den Hinterkopf desselben zu liegen kommt, und spannt nun beide Augenlider nach Aussen an. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand fühlt man im inneren Augenwinkel unter dem angespannten *Tendo m. orbic.* nach dem unteren Orbitalrande. Hat man sich von dessen Lage und Richtung überzeugt, so fasst man ein schmales, spitzes Messer wie eine Schreibfeder, stützt den kleinen Finger auf die Wange und setzt das Messer unter dem Tendo vor dem Orbitalrande so auf, dass seine Spitze nach dem Kieferwinkel der gesunden, seine Schneide nach dem der kranken Seite gerichtet ist. In dieser Richtung stösst man es einige Linien tief ein und macht beim Zurückziehen desselben einen kleinen, 4—5'' langen Bogenschnitt vor und parallel dem Orbitalrande. An der Stelle des Messers wird nun eine geknöpfte Sonde eingeführt und abwärts bis in den Thränennasengang geschoben. Sind alle Hindernisse beseitigt, so dilatirt man durch Einlage von allmählig dickeren Violinsaiten, indem man zuerst die E, dann die A, endlich die Dsaite gebraucht, und schliesslich einen s. g. *Scarpa'schen* Bleinagel tragen lässt.

Statt des Bleinagels hat *Dupuytren* eine aus Gold, Silber oder Platina gearbeitete Canüle einzulegen eingeführt. Dieselbe hat eine konische Form, ist 8—10'' lang, $1\frac{1}{2}$ —2'' breit, oben mit einem Rande versehen, um nicht zu tief einzugleiten, unten schräg abgeschnitten und dem Canale gemäss wenig gebogen. Die Ein- und Ausführung wird mittelst eines knieförmig gekrümmten Conductors ausgeführt, an dem die Röhrchen bequem fixirt werden können.

In neuester Zeit wird auch diese Methode nur noch wenig geübt, da die Verengerung sich nach Monaten oder Jahren doch fast stets wieder einstellt.

Das gebräuchlichste Verfahren ist heutzutage die vollständige Verödung des Thränenschlauches, der *Nannoni* in der Praxis Eingang verschafft hat. Man bedient sich des Höllensteins, des Aetzkali, der Spiessglanzbutter, der Schwefel- und Salpetersäure, der Wiener Paste, am besten aber eines eigens für den Zweck geschmiedeten Ferrum candens, da man dessen Wirkung sicherer beherrscht, als die des potentiellen Cauteriums. Ist der Knochen cariös, so lässt man es zugleich nachdrücklich auf denselben einwirken, um Exfoliation der erkrankten

Partie herbeizuführen. Die Aetzung muss so oft wiederholt werden, bis die Verödung vollständig gelungen ist.

Die **Exstirpatio bulbi** wird entweder für sich ausgeführt oder es werden zugleich die entarteten Lider entfernt, welcher Verschiedenheit gemäss die Methode verschieden ist. Krebs-entartung ist vorwiegend Indication zur Totalexstirpation, da jede partielle Abtragung mit der s. g. Staphylomoperation zusammenfällt. Sollen die Lider erhalten werden, so werden sie mit stumpfen Haken vom Bulbus entfernt und dieser mittelst einer durchgeführten Schlinge, eines spitzen Hakens oder einer *Muzeux'schen* Hakenzange fixirt. Darauf spaltet man mit einem schmalen Bistouri zuerst die äussere Commissur c. 1''' weit, senkt es am inneren Winkel ein, löst den Bulbus durch sägeförmige Schnitte aus der Orbita unter vorsichtiger Schonung des Lides los, wendet nun den Bulbus nach dieser Seite hin und vollendet die Loslösung ebenso an der anderen Seite. Mit einer geschlossen eingeführten Hohlscheere wird der *nerv. opticus*¹⁾ und alles Uebrige, was den Bulbus noch fixirt, abgeschnitten, sofort auch die Thränendrüse vorgezogen und ebenfalls exstirpirt. Der Verband darf nicht früher angelegt werden, als bis man sich überzeugt hat, dass nichts Krebshaftes zurück ist. Blutungen begegnet man durch Tamponade oder schlimmsten Falls durch Anwendung des Ferr. candens. — Muss ein Lid gleichzeitig entfernt werden, so wird die Commissur vorher getrennt, das Lid mitgefasst und der Schnitt wie vorher im Gesunden geführt. Sind beide Lider entartet, so wird die Commissur nicht gespalten, vielmehr werden beide Lider sofort mit in die Zange genommen und Alles gleichzeitig durch das Bistouri gelöst und demnach die Hohlscheere an den *nerv. opticus* gebracht. — Der Verband wird durch Heftpflasterstreifen befestigt und anfänglich energische Antiphlogose angewendet, während später die Behandlung gegen Fungositäten, Nekrose der Orbitalknochen etc. zu richten ist.

Um die Gefahr vor Blutungen zu verringern, schlug *Bonnet* vor, die Augenmuskeln bei der Exstirpation zu schonen, doch ist die Aufgabe ebenso schwierig, als die Erreichung des Zweckes unsicher.

Prothesis ocularis oder Einsetzung künstlicher Augen ist schon bei den Alten geübt worden, aber erst in unserer Periode auf eine anerkennenswerthe Stufe der Vollkommenheit gehoben. *Harard*, *Mirault*, besonders aber *Boissonneau* zu Paris haben um die Vervollkommnung der Anfertigung und Einsetzung künstlicher Augen das Hauptverdienst, da ihre Augen

¹⁾ Bei der Durchschneidung des Nerv. optic. klagen die Operirten nicht über Schmerz. Sie geben in der Regel eine subjective blitzähnliche Lichterscheinung gehabt zu haben an.

nicht bloss von grosser Güte und Aehnlichkeit sind und dadurch der Entstellung entgegenreten, sondern auch durch ihre Gestalt wesentlich dazu beitragen, lästigen Folgeübeln des Augendefectes vorzubeugen. Diese sind besonders die Einwärtskehrung der Lider und Cilien und die durch sie stets unterhaltene Reizung und Entzündlichkeit des Stumpfes. Die das Auge ersetzende Scheibe, aus Kieselsäure und Wismuth angefertigt, hält die Lider, von denen sie selbst zugleich gehalten wird, angemessen von einander, so dass die Thränen bequem über sie abfliessen können. Ein weiterer Vorthail besteht darin, dass die Brauen und die Stirnhaut ebenfalls emporgetragen werden und sich nicht, wie dies ohne künstliches Auge oft geschieht, abwärts senken und dadurch zur Assymetrie beider Gesichtshälften führen können.

Soll Pseudocornea abgetragen und ein künstliches Auge eingesetzt werden, so muss man sorgen, dem Stumpfe die Grösse zu geben, dass er mit der Scheibe hernach den Umfang des normalen Bulbus hat. Sodann muss man die Augenmuskeln möglichst erhalten, weil nur dann der Stumpf und mit dem Stumpfe das künstliche Auge an den Bewegungen des anderen Auges zu participiren im Stande ist.

Die aus Glas, Porcellan, Gold oder anderen Metallen fabricirten Augen, auf die Iris und Pupille gemalt wurden, liessen viel zu wünschen übrig. Die Boissonneau'schen ¹⁾ sind schöner

¹⁾ Fabricirt werden die besten Augen in Paris bei M. Noël, Rue du temple. Nro. 187, bei Desjardins de Morainville, Rue Louvois, Nro. 12, bei Boissonneau, Rue neuve des Mathurins, Nro. 58. — Boissonneau père hat folgende Anzeige in den Ann. d'oculist. von diesem Jahre erlassen, zu deren Verbreitung ich gern dadurch beitrage, dass ich sie hier einrücke:

Boissonneau père, Oculariste des hôpitaux de Paris, Londres, etc., Chevalier et Officier de plusieurs Ordres, actuellement 11, rue du Monceau, faubourg Saint-Honoré à Paris. Pour épargner au corps médical jusqu'aux moindres des désagréments qui pourraient surgir à l'égard d'yeux artificiels que l'on propose souvent sous son nom ou comme ayant été faite par lui, il faut dire que ses yeux sont brevetés dans les principaux royaumes, qu'il n'a concédé à personne le droit d'user de ses privilèges et que l'on ne peut se procurer ses produits qu'en s'adressant à son unique établissement de la rue du Monceau.

Mode d'appropriation de l'œil artificiel par correspondance. La grande pratique de M. Boissonneau ayant enfin simplifié ses études d'appropriation individuelle au point de lui permettre l'exécution de ses yeux artificiels d'après nature par correspondance, et de tous les points du monde, il lui suffit actuellement de renseignements écrits par un médecin, et en deux mots, sur la ligne de chaque question de la présente formule, pour arriver ainsi à des restaurations qui ne laissent rien à désirer. Par ce nouveau mode de correspondance, on pourra s'éviter les frais de voyages à Paris, et des déplacements souvent impossibles.

Formule des indications pathologiques à transmettre. Première Partie — Pour les personnes qui n'ont jamais fait usage de l'œil artificiel. — Les réponses à cette formule devant également servir de guide dans les fournitures ultérieures, les trois premières indications doivent être écrites très-lisiblement. (Pour les enfants, elles concernent les parents, et on dira M..... pour son fils ou pour sa fille)

1re INDICATION. — Noms: M _____
2e. Profession ou qualités _____

und dauerhafter, da die Färbung in den verschiedenen Theilen durch die Substanz geht. Die Scheibe ist concav-convex, etwas

- 3e. Demeure _____
 - 4e. Age du sujet: _____
 - 5e. Temps qui s'est écoulé depuis la perte de l'œil: _____
 - 6e. L'œil perdu sera le droit ou le gauche: _____
 - 7e. Le globe oculaire sera ou non atrophié: _____
 - 8e. La réduction sera d'un quart, d'un tiers, de moitié ou de trois quarts: _____
 - 9e. La surface du moignon oculaire sera arrondie, légèrement conique ou aplatie: _____
 - 10e. La cornée sera ou non conservée en tout ou partie: _____
 - 11e. Si le globe oculaire a été amputé, ou s'il a subi une simple résection de sa partie antérieure; faire connaître la maladie qui a nécessité l'opération et l'époque à laquelle cette dernière a eu lieu: _____
 - 12e. Si la cavité orbitaire a subi un rétrécissement quelconque, ou s'il existe des complications pathologiques, mentionner leur nature et le siège: _____
 - 13e. L'œil sain sera de saillie ordinaire, proéminent ou enfoncé: _____
 - 14e. Le ton de la sclérotique sera blanc pur, blanc grisâtre ou blanc roussâtre: _____
 - 15e. L'iris sera déclaré être bleu, bleuâtre, gris, grisâtre, roux ou marron, et la teinte désignée comme tournant plus ou moins à l'une de ces couleurs et comme étant claire, moyenne ou foncée: _____
 - 16e. Le diamètre de l'iris sera approximativement de 5, 6, 7 ou 8 millimètres: _____
 - 17e. Celui de la pupille, qui pour cet objet devra être examinée près d'une fenêtre, sera de 1, 2 ou 3 millimètres environ: _____
 - 18e. Son pourtour ou auréole pupillaire, sera d'un roux clair ou foncé ou d'un brun grisâtre plus ou moins senti. _____
- Deuxième Partie. — Pour le cas où un œil artificiel fourni d'après les indications qui précèdent aurait besoin de subir quelque modification et celui où une personne déjà initiée à l'usage des yeux ordinaires voudrait faire corriger une pièce d'appropriation vicieuse. (Dans cette dernière circonstance, il faudrait également remplir les indications de la première partie de cette formale)
- 19e. Envoyer l'œil artificiel à faire modifier et l'accompagner des observations suivantes; il en sera de même des anciennes pièces que l'on voudrait faire corriger; mais si, dans ce cas, on n'en possédait qu'une seule dont on ne voulût pas se séparer, il suffirait d'envoyer à sa place son moule ou son empreinte en cire ou en plâtre.
 - 20e. L'œil artificiel devant conserver de lui-même sa position horizontale, si, par un mouvement naturel de rotation, sa section caronculaire ou temporale se dirigeait sous la paupière inférieure, il faudrait en donner une indication précise.
 - 21e. Si, conservant sa position horizontale, l'iris se trouvait trop rapproché du nez ou de la tempe, s'il montait ou descendait, on indiquerait la proportion du redressement à lui faire subir par des lignes tracées au crayon ou à la plume sur la surface de l'émail ou à l'intérieur du moule précité. Pour l'examen, on doit se regarder dans une glace à hauteur de tête; et, s'il est fait par un médecin, les deux personnes doivent se tenir debout et s'entreregarder les yeux sans que le patient imprime la moindre action de physionomie.
 - 22e. Dire s'il paraît plus ou moins grand que nature.
 - 23e. Les paupières devant se joindre en fermant les yeux sans effort, si une résistance se manifestait, elle serait générale ou plus particulièrement sentie vers la partie interne de la section palpébrale supérieure; préciser l'observation.
 - 24e. Si cet œil occasionne un frottement ou une pression partielle sur le moignon oculaire, préciser le point douloureux.

Comme il peut arriver que M. Boissonneau ait besoin de quelques instructions complémentaires, Messieurs les médecins sont priés de vouloir bien donner leur adresse ici.

grösser als der bei gewöhnlicher Augenöffnung sichtbare Theil des Bulbus, nach Aussen und Oben etwas breiter und mit stumpfen Rändern versehen, um möglichst wenig zu reizen. Um günstig eingelegt werden zu können, sind in der Regel noch kleine Operationen an den Lidwinkeln erforderlich. Adhaerenzen zwischen dem Bulbus und einem Lide brauchen nicht immer operirt zu werden, da es einfacher, leichter und oft auch zur grösseren Festigkeit dienlich ist, an diesen Stellen entsprechende Einschnitte in die Scheibe machen zu lassen. — Vor der Einsetzung muss man jede Entzündlichkeit durch Bleiwassercompressen u. dgl. beseitigen und das Auge anfänglich nicht länger tragen lassen, als es ohne lästiges Gefühl möglich ist. Ich habe in einem Falle mit Erfolg zuerst kleinere, aus dünnen Bleiplatten getriebene Scheiben eingesetzt und erst nach gehöriger Vorbereitung auf diese Weise das künstliche Auge tragen lassen. Will man es einsetzen, so reinigt man den Stumpf, befeuchtet die Scheibe und schiebt sie, indem man das Unterlid abzieht, unter das Oberlid, um, sobald es passend unter dasselbe geglitten ist, auch das Unterlid auf die Scheibe zu heben. Nachts wird die Scheibe entfernt, um Morgens wieder eingelegt zu werden, was der Patient stets sehr bald selbst lernt.

Augenheilmittel.

Ausser der nach den Grundsätzen der speciellen Therapie anzuordnenden allgemeinen Krankheitsbehandlung kommen zur Heilung von Augenleiden eine Reihe von örtlichen Mitteln in verschiedenartiger Anwendungsweise in Betracht, deren anhangsweise Besprechung für das Studium nicht unwillkommen sein wird. — Die Formen der Anwendung sind folgende:

A. Das *Collyrium* oder Augenwasser ist die üblichste Form des Gebrauches von örtlichen Heilmitteln und im Allgemeinen nur in wenigen Fällen, z. B. wo Feuchtigkeit nicht wohl ertragen wird, contraindicirt. Man wendet sie bald warm, bald kühl und entweder als Foment, als Waschwasser, als Augentropfwasser oder Augenpinselwasser an.

Das Foment wird vorgezogen, wo man vorwiegend auf die Schutzorgane und den ganzen Bulbus oder auf vertrocknete Secrete erweichend und reinigend einwirken will. Man applicirt sie mittelst leinener Compressen, die aber nur klein sein dürfen, um das Auge nicht durch Druck zu irritiren, und die deshalb häufig gewechselt werden müssen, um stets in dem beabsichtigten Temperaturgrade einzuwirken. Warmes Wasser wird benützt, wo man Secrete entfernen, höheren Spannungsgrad und schmerzhaften Entzündungsreiz beseitigen will, kaltes Wasser zu antiphlogistischen Zwecken, dann auch um die Contractilität, den Tonus der Gewebe zu steigern, Bluterguss zur Resorption zu bringen, Ciliarhyperästhesie zu beseitigen etc. Arzneiliche Fomente, zu 4—6 Unzen verschrieben, sind, wie Collyrien überhaupt, am zweckmässigsten einfache *Infusa*, *Decocta* oder *Solutionen* leicht löslicher Substanzen. Als Vehikel der Lösungen wählt man destillirtes oder aromatisches Wasser, denen man, um das Auge durch gleichzeitige Reizung empfänglicher zu machen, Opiumtinctur oder Spir. vini camphorat. zusetzt.

Vom Augenwaschwasser gilt ziemlich dasselbe, nur ist dessen Wirkung eine mehr vorübergehende. Intensiver kann sie gemacht werden, wenn man die Flüssigkeit als Douche auf das Auge applicirt, entweder mittelst des *Himly'schen* Apparates, der einer Feuerspritze ähnlich construirt und mit Ansatzstücken zu strahl- und brauseförmiger Douche versehen ist, oder mittelst eines S förmig gebogenen, nach Art der Heberröhre wirkenden Barometerglases. Augenbäder in kleinen

Schaalen nehmen zu lassen, ist nicht empfehlenswerth, da wegen der geneigten Haltung des Kopfes leicht Congestionen eintreten. Günstiger wirken Bäder in fließendem Wasser, die *Celsus* schon anrieth, sich durch Eintauchen des kranken Auges in die bei den Römern häufig gewesenen Aquaducte zu verschaffen. — Bei Augenblennorrhoeen ist es meist vorzuziehen, die reinigenden Flüssigkeiten mittelst einer Spritze in das Auge gelangen zu lassen, um durch die Gewalt des Strahles gleichzeitig lösend auf die Secrete zu wirken. Zu dem Behufe öffnet man die Lider mit zwei Fingern und lässt den Inhalt der Spritze von einem Augenwinkel her über den Bulbus und durch die Bindehauttaschen wirken, wobei man die eigenen Augen vor der umherspritzenden, mit ansteckendem Secrete vermischten Flüssigkeit sicher zu stellen Sorge tragen muss.

Als Augentropfwässer kommen die Collyrien hauptsächlich bei different wirkenden Arzneimitteln in Anwendung, welche direct auf den Bulbus einwirken sollen. Sie wirken stets anfänglich reizend, doch dürfen sie nicht stärker sein, als um höchstens 10 Minuten den Kranken zu belästigen. Je ruhiger das Auge geschlossen gehalten wird, um so geringer sind die Beschwerden und um so günstiger stellt sich die Wirkung des Mittels ein. Behufs der Application neigt der Patient den Kopf rückwärts, das Unterlid wird am inneren Winkel etwas abgezogen und mittelst eines Tropfgläschens, eines Pinsels oder Löffels die Instillation vollzogen. Am liebsten bediene ich mich eines oben und unten abgeschnittenen Gänsefederkiels, der beiderseits offen so tief in die Flüssigkeit getaucht wird, als man ihn anfüllen will, dann mit einem Finger oben geschlossen und erst wieder über dem abgezogenen Lide geöffnet wird, um die Flüssigkeit auströpfeln zu lassen. Nach der Instillation wird das Auge einige Minuten geschlossen, dann dieselbe Procedur am andern Auge vorgenommen und dem Patienten nun ruhiges Verhalten angewiesen. Was über 1—3 Tropfen eingeträufelt wird, kommt nicht zur Wirkung, da es beim Schluss des Auges abfließt. Da solche Einträufelungen in der Regel nur einige Male täglich vorgenommen werden, braucht man nie mehr als 1—2 Drachmen zur Zeit zu verordnen.

Augenpinselwasser wird verordnet, wo man ein reizendes oder ätzendes Mittel nur auf eine beschränkte Partie einwirken lassen will. Ist die Flüssigkeit so reizend, dass sie einen Malerpinsel zerstören würde, so bedient man sich eines Asbestpinsels oder eines angekauten und zerfaserten Holzstäbchens und beauftragt einen Assistenten, unmittelbar nach der Application Wasser oder Oel auf die bepinselte Stelle zu bringen, damit die Aetzung auf die geätzte Stelle beschränkt bleibe.

B. Die *Augensalben* kommen ebenfalls sehr häufig zur Anwendung und zwar besonders wegen ihrer eingreifenderen und

nachhaltigeren Wirkungsweise. Sie sind hauptsächlich bei chronisch verlaufenden, torpiden Krankheitszuständen indicirt, wo Härten zu schmelzen, Relaxationen zu beseitigen und auf die Circulation und Ausscheidung bethätigend einzuwirken ist. Das passendste Constituens ist Schweineschmalz, dem man je nach der Vermischung mit öligen oder schweren mineralischen Substanzen oder in heisser Jahreszeit mehr weniger weisses Wachs zusetzt. Alle Zusätze müssen exactissime pulverisirt oder vorher aufgelöst und dann wieder exactissime mit dem Constituens verrieben und vermischt werden, um nicht mechanisch zu reizen oder durch ungleichmässige Vertheilung in der Salbenmasse ungleichmässig einzuwirken. Da Salben, besonders im Sommer, leicht ranzig werden, so verschreibe man in der Regel nicht mehr als 1—2 Drachmen. Sie werden am passendsten mittelst eines feinen Malerpinsels bei abgezogenem Unterlide auf den Lidrand, den Bulbus oder die Lidconjunctiva gestrichen, selten häufiger als zwei Mal täglich, doch muss das Auge vorher gereinigt sein und nachher eine Zeitlang geschlossen bleiben. Jedes Mal wird selten mehr als eine linsengrosse Portion erforderlich sein, da mehr zwischen den Lidern doch wieder vorquillt.

Salben für die Umgegend des Auges werden besonders Abends in grösseren Portionen einige Minuten hindurch kräftig in die Haut eingerieben und erst andern Morgens mit lauem Wasser vorsichtig abgewaschen, damit Nichts zwischen die Lider gelange.

C. *Cataplasmen* sind nur selten indicirt, besonders, wenn Zertheilung oder Eiterung am Auge zu befördern ist oder wenn man die in einem zerstörten Augapfel stattfindenden Schmerzen zu besänftigen beabsichtigt. Die Masse wird am passendsten aus Hafergrütze mit Schmalz und Milch oder aus Leinsamenmehl, Semmelkrume und dgl. m. gekocht, in kleinen Paqueten von 28—30° R. Wärme aufgelegt, damit das Auge nicht durch zu grosse Schwere oder zu starke Hitze belästigt werde, und c. alle 15 Minuten gewechselt. — Sind sehr heftige Schmerzen zu bekämpfen, so kann man Opium zusetzen oder den Brei mit etwas Cicuta kochen lassen. — Bei grosser Torpидität kann man einen Zusatz von Wein machen.

D. *Das Augenpulver*, im Alterthum häufig verordnet, findet in neuester Zeit mit Recht nur beschränkte Anwendung, besonders da, wo man durch mechanisch reizende Einwirkung den Säfteumsatz und damit die Aufsaugung von Exsudaten befördern will. Calomelpulver mit oder ohne Zucker wirkt nachgewiesener Weise, auf Hornhauttrübungen gebracht, nicht anders, wie jedes ähnliche Pulver, das mit einem Federbart aufgestrichen wird oder wie der blosse Federbart. Anders ist es, wenn die Pulver von solcher Substanz sind, dass sie sich in den Drüsensecreten lösen und chemisch wirken, oder wenn

sie, wie Plumb. acet. in der granulirten Lidbindehaut unmittelbar zur Wirkung kommen.

Wo auf fettige Einreibungen in der Nachbarschaft des Auges Erythem oder Pustelbildung eintritt, ist es eine alte Vorschrift, die wirksame Substanz, z. B. Opium, bei Augenschmerzen, für sich zu verordnen, um sie, mit Speichel vermischt, vom Patienten in der Umgebung des Auges einreiben zu lassen.

E. Aromatische und spirituöse Mischungen werden theils als Einreibungen, theils als Augendunstbäder gebraucht und über den geschlossenen Augen in der obern Gesichtshälfte eingerieben, dann auch nach Oeffnung der Augen mit der hohlen Hand vorgehalten, so dass sie bei der Verflüchtigung nervenstärkend und überhaupt anregend auf das torpide Augennervensystem wirken. In ähnlicher Weise lässt man die feuchtwarmen Dämpfe von aromatischen Theespecies mittelst eines Trichters an die Augen leiten und nimmt zu solchem Behuf Species aromatic., Sem. Fœnical. contus. Hb. Menth. pip. u. d. m. — oder, wenn man nur zertheilend und entspannend einwirken will, reines warmes Wasser.

Aromatische Kräutersäckchen sind nicht sehr zu empfehlen, da sie durch ihre Schwere das Auge belästigen. — Reizende Pflaster werden am Auge nicht ertragen, wesshalb englisches Pflaster oder Collodiumstreifen zur Fixirung zu empfehlen sind. Um einen hermetischen Schutzverband bei contagiöser Blennorrhoe des einen Auges anzuwenden, decke man leichte, trockne Charpie auf die geschlossenen Lider, befestige selbige mit Bleiweisspflasterstreifen und überstreiche diese wieder mit einer Collodiumschicht.

Die Anwendung der Electricität geschieht nach den im Allgemeinen geltenden Regeln, besonders gegen Anästhesie und zur Aufsaugung von Exsudaten, zumal in der Hornhaut, doch nur in seltenen Fällen mit baldgünstigem Erfolge.

Die gebräuchlichsten localen Mittel

in alphabetischer Anordnung.

Aether und ätherische Mittel kommen bei Anästhesien und Acinesen zur Anwendung, um die gesunkene Nervenaction anzuregen. Die Form muss dem übrigen Zustande des Auges angemessen sein, da zu starke Aetherwirkung zu Congestion und Inflammation hinführen würde. Aromatische Kräuterkissen, ätherische Dünste und Einreibungen sind den Bähungen und Tropfwässern vorzuziehen. Rec. Ung. nervin. dr. 3, Tinct. Cantharid. Mixt. oleos. balsam. aa scrup. 1. Mds. Einreibung in die Lider und die Nachbarschaft des Auges. — Rec. Balsam. Peruvian. scrup. 1. Naphth. vitriol. dr. 2. Mds. Augenspiritus. —

Rep. Spirit. Lavandul. — Serpyll. — Anthos, Menth. pip. aa unc. $\frac{1}{2}$, Lig. Ammon. anisat. Mixtur. oleos. balsam. aa dr. 1. Mds. Augenspiritus.

Alaun ist vielfach als kräftiges Adstringens in Lösungen von 1—3 Gran auf eine Unze Wasser empfohlen worden, um als Tropfwasser oder Bähung angewendet zu werden. *Richter* empfahl es auch, um zugleich mechanisch bei Hornhautverdunkelungen zu wirken, und liess es mit einer gleichen Quantität Sacchar. alb. zu Augenpulver sehr sorgfältig verreiben und von Zeit zu Zeit auf die Hornhaut pinseln oder von einem gefalteten Papiere einblasen. Gegen Atonie der Bindehäute. Rep. Alumin. crudi gr. 12, Aq. destill. unc. 4, Tinct. Opii croc. scrup. 1 Mds.

Aqua laurocerasi findet nur beschränkte örtliche Anwendung, da es dem Opium nicht gleich kommt. Gegen Hornhautfleckchen wird gerühmt Rep. Sal. ammoniac scrup. $\frac{1}{2}$, solve in Aq. lauroc. unc. 2. Ds. — Rep. Hydrarg. muriat. corros. gr. $\frac{1}{4}$, solve in Aq. Rosar. Aq. lauroc. aa unc. $\frac{1}{2}$. Ds. Zum Einträufeln. — Rep. Hydrarg. muriat. corros. gr. 1, solve in Aq. destill. unc. 7, adde Aq. lauroc. unc. 1. Ds. Zu lauwarmen Fomenten.

Aqua oxymuriatica hat *Fr. Jäger* mit Wasser verdünnt gegen das Granulationsstadium der Ophthalmia aegyptiaca empfehlen zu können geglaubt. Er verordnete eine Drachme auf vier Unzen destillirten Wassers.

Argentum nitric. ist in Substanz wie in Lösung mit Recht eines der gebräuchlichsten Augenheilmittel. Um die ätzende Kraft abzuschwächen, bedient man sich je nach Bedarf einer mit 1, 2, 3 oder 4 Theilen Nitrum dep. zusammengeschnittenen und stangenförmig ausgegossenen Mischung. *Arlt* scheint der Verbindung mit Gummi den Vorzug zu geben. Nach der Anwendung im Auge gebietet die Vorsicht, Oel auf die geätzte Stelle zu bringen oder mit angesäuertem Wasser nachzuspülen, um die Weiterverbreitung abgestossener Partikelchen zu verhüten. Stärkere Solutionen wirken in derselben Weise ätzend, da ihre Wirkung aber nicht wohl auf eine bestimmte Stelle beschränkt werden kann, so bedient man sich schwächerer Lösungen (von gr. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1—3 auf eine Unze destill. Wassers ad vitrum nigrum), um kräftig adstringirend bei Erschlaffung, Ulceration, Granulation der Bindehaut, bei Hornhautflecken u. d. a. einzuwirken. Von vorzüglicher Wirkung ist die Lösung auch bei profusen Schleimflüssen des Auges, ebenso bei Thränenfisteln, die *Richter* mit Arg. nitric. (scr. 1 in Aq. dest. und Spirit. vin. aa unc. 2 aufgelöst) auszuspritzen empfahl.

Die Salbenform wirkt intensiver und wird vorgezogen bei profuser Secretion und torpiden Wucherungen. Man lässt den Höllenstein (gr. $\frac{1}{2}$ —2) zunächst in einigen Tropfen aq. destill. lösen und dann mit zwei Drachmen frischen Schweineschmalzes sehr sorgfältig vermischen, um Abends oder Morgens und

Abends die so bereitete Salbe linsengross mittelst eines Haarpinsels in die untere Bindehauttasche zu streichen.

Die von *Guthrie* empfohlene und vielverordnete Salbe wurde besonders gegen Blennorrhoen ursprünglich also verschrieben: Rcp. Argent. nitric. cryst. gr. 2, Aq. Saturn. gtts. 10, Adip. suill. dr. 1 Mds. Unguent. ophthalm. nigrum. Bei hochgradiger Entzündung eignet sie sich nicht.

Arnica ist als Infus. der Blumen (dr. 1 ad unc. 1) sehr geeignet, um Commotionen, Contusionen, Blutergüsse und lähmungdrohende Zustände zu beseitigen.

Arsenik findet nur beschränkte Anwendung. Von *Dupuytren* ist es in Pastenform empfohlen worden, um bei messerscheuen Kranken Fungositäten zu zerstören. Nach Entfernung des vertrockneten Secretes wird eine entsprechende Dosis des Pastenpulvers mit destillirtem Wasser oder Speichel zu einem nicht abfließenden Teige angerührt und ungefähr $\frac{1}{2}$ Linie dick aufgetragen. Der entstehende Schorf fällt nach einigen Tagen ab, worauf die Operation so oft wiederholt wird, bis die Wunde rein ist und Neigung zur Verheilung zeigt. — Man lässt das Pulver aus drei Drachmen Mimosenpulver mit sechs Gran Arsenik und einem Zusatz von $1\frac{1}{2}$ Drachme Calomel bereiten.

Atropinum sulph. wird in neuester Zeit fast ausschliesslich gebraucht, um Pupillendilatation zu bewirken. Nach Dr. *de Ruiter* (Nederl. Lancet 1854. pag. 464) bewirkt die Einträufelung eines Tropfens einer Atropinlösung, in der nicht mehr als $\frac{1}{129600}$ Sulph. Atrop. enthalten ist, in das Auge eines Hundes gebracht, eine 20 Stunden währende Pupillendilatation. — Eine Auflösung von $\frac{1}{3600}$ im Tropfen gibt nach 10—15 Minuten eine 4 Tage währende, eine Auflösung von $\frac{1}{21600}$, 5—10 Minuten einwirkend, noch starke Dilatation, bisweilen selbst Unbeweglichkeit. Die Dilatation nach Anwendung einer Auflösung von $\frac{1}{1296000}$, 5 bis 10 Minuten lang einwirkend, tritt nach einer Stunde ein und währt 20 Stunden. Letztere Auflösung, 3 Mal verdünnt, hat noch merkbare Dilatation zur Folge, die erst bei 6maliger Verdünnung, also mit $\frac{1}{772600}$ Sulph. Atrop., zweifelhaft bleibt. Die Empfindlichkeit des Auges für Atropin ist um so überraschender, da man bedenken muss, dass von dem einzelnen Tropfen dieser schwachen Solution, die zur Erweiterung der Pupille ausreicht, vielleicht nicht der 50ste Theil aufgesogen wird. Es ist gelungen, mit dem inficirten Humor aqueus eines kunstmässig dilatirten Thierauges auch die Pupille eines andern Thieres zu dilatiren, und diese Procedur noch über mehrere Thiere fortzusetzen, indem man sich jedes Mal des Humor aqueus des vorher dem Experimente unterworfenen Auges bediente.

Weil die 4—8 Tage bei Menschen andauernde Lichtscheu nach Einträufelung starker Solution ausserordentlich lästig ist, so hat Prof. *Donders* in Utrecht, auf die *de Ruiter*'schen Ver-

suche gestützt, die folgenden sehr zweckmässigen Regeln für die Anwendungsart des Sulph. Atrop. aufgestellt (l. c.):

1) gr. iv in unc. j Aq. destill. — als Vorbereitung für Operationen, um drohender Synechie, Synicesis oder Prolapsus iridis vorzubeugen, um bei centraler Cataracte, centraler Hornhautverdunkelung das Sehen möglich zu machen.

2) Dieselbe Solution mit 15 Theilen Wasser verdünnt, um vollkommene Dilatation mit vorübergehender Unbeweglichkeit der Pupille zu bewirken behufs gründlicher Untersuchung der inneren Augentheile nach allen Richtungen. Die Dilatation erfolgt nach 30—45 Minuten und stört das Sehvermögen gewöhnlich nur 24 Stunden.

3) Dieselbe Solution mit 80 Theilen Wasser verdünnt, also ein Theil Sulph. Atrop. auf 9600 Theile Wasser, für gewöhnlich anzuwenden. Ein oder zwei Tropfen dieser Solution, einige Secunden zwischen die Augenlider gehalten, gibt nach 30—60 Minuten eine genügende Dilatation, um die meisten Augen gut zu untersuchen. Die Erweiterung ist nicht so stark, um das Gesicht merklich zu stören, und ist nach 8—36 Stunden gänzlich verschwunden. (Cfr. Die künstliche Pupille vor und in dem Auge von Dr. C. H. Schauenburg. Lahr. 1854. J. H. Geiger. pag. 13 u. 14.)

Belladonna ist eines der geeignetsten Narcotica bei heftigen Augenschmerzen. Man kann das Extract pur verordnen und dem Patienten aufgeben, einige Male täglich eine kleine Portion mit Speichel in der Nachbarschaft des Auges einzureiben. Zweckmässiger lässt man ein schwaches Infusum als Foment gebrauchen. — Zur künstlichen Pupillendilatation benutzte man früher, als das Atropin noch weniger in Aufnahme war, die *Belladonna*, indem man ein aus einer halben Drachme bereitetes Infusum von unc. $\frac{1}{2}$ eine Stunde vor der Operation einträufelte.

Blei ist dem Zink ähnlich, nur hat es noch die Eigenschaft ausserdem, auf absondernde Flächen in höherem Grade austrocknend zu wirken und in Cornealgeschwüren als weisslich trübe Incrustation sich niederzuschlagen, wesshalb es bei letzteren contraindicirt ist. Bei traumatischen Augenentzündungen kann man es indess sehr passend als Bähung benutzen, indem man die Aq. saturn. rein oder verdünnt aufschlagen lässt oder nach *Rust* verordnet Rep. Acet. plumb. dr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 4. Mds. Augenbähung.

Ebenso eignet sich bei Conjunctivalatonie mit profusem Schleimausfluss Rep. Acet. plumb. gutt. 10 Aq. flor. Sambuc. unc. 1, Tinct. Opii simpl. gutt. 20 Mds. oder Rep. Plumb. acet. gr. 2—4, Aq. destill. unc. 1. Tinct. Opii simpl. scr. $\frac{1}{2}$ —1. Mds. Augentropfwasser. Rep. Extr. Opii, Plumb. acet. aa gr. 8 solve in Aq. dest. unc. 4. Adde celeriter quassando Mucilag. sem. Psyllii dr. 2. Mds. Augenwasser bei erethischen und catarrhalischen

Augenentzündungen. Rep. Minii dr. 1 Ung. rosat. unc. $\frac{1}{3}$. Mds. Salbe gegen Excoriationen von scharfen Thränen.

Plumb. acet. ist in Pulverform vielfältig empfohlen, um auf Bindehautgranulationen, besonders trachomatöser Natur gepinselt zu werden und die rückgängige Metamorphose der *granula* einzuleiten. Doch steht es in dieser Beziehung dem Argent. nitr. nach.

Blutegel können bei höheren Entzündungsgraden selten entbehrt werden, doch wird deren Nutzen wesentlich durch die Art und die Stelle der Application bedingt. Als erster Grundsatz gilt, dass man sie nicht im Bereiche der Orbita selbst ansetzt. Auf den Bindehäuten würden sie, ebenso wie auf den entzündeten Lidern, den Reiz steigern. Je nach dem Zwecke, den man erreichen will, setzt man eine grössere Anzahl auf den unteren Orbitalrand, oder man applicirt am Zitzenfortsatze hinter dem Ohre und unterhält die Nachblutung stundenlang durch Auflegen warmer Breiaufschläge. Die Application in dem Nasenloch der entsprechenden Seite ist vielfach empfohlen worden. Um der Wiederkehr der Phlogose zu begegnen, kann man eine continuirliche Blutströmung dadurch bewirken, dass man zur Zeit je einen Blutegel applicirt und sofort einen anderen ansetzt, wenn die Nachblutung aufhört, um mit dieser Art der Blutentleerung 12—24 Stunden fortzufahren.

Von den künstlichen Blutegeln ist besonders der *Heurteloup'sche* Apparat in Aufnahme gekommen.

Bolus, besonders der armenische, wirkt zusammenziehend und austrocknend, wesshalb er, früher mehr als jetzt, bei profusen Blennorrhoeen in Anwendung kommt. — Mit gleichen Theilen von Tart. dep. Tutia ppt. und Sacch. alb. bildet er das gegen Hornhautflecke und Pterygium empfohlene *Baldinger'sche* Augenpulver.

Borax scheint als resorptionbeförderndes Mittel mehr Anerkennung zu verdienen, als ihm gewöhnlich gezollt wird. Bei allen Hornhauttrübungen, besonders bei atonischem Pannus, habe ich ihn wiederholt mit Nutzen angewendet. Gegen Hornhautflecke verordnet *Horgens*: Rep. Borac. scrup. $\frac{1}{2}$, Aq. Lauroc. unc. 2, solve. D. s. Zum Einträufeln. — *Beer* und *Andreæ* lassen folgendes Pulver bei Augenfell einmal täglich aufpinseln: Rep. Borac., Vitriol. albi, Aluminis usti aa scrup. $\frac{1}{2}$, Sacch. alb. scrup. 1, M. f. pulv. subtiliss. — *Richter* gegen Hornhautflecke als Tropfwasser: Rep. Borac. Sacch. alb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ solve in Aq. Rosar. unc. $\frac{1}{2}$, filtra et adde Extr. Opii, Extr. Aloës aa gr. $1\frac{1}{2}$, iterum solve D. s. Wohlumgeschüttelt einige Mal täglich einzuträufeln.

Canthariden werden als Zugpflaster vielfach behufs Ableitung hinter das Ohr der kranken Seite oder in den Nacken

gelegt. Ausserdem benutzt man die Tinctur, um die Nerven-thätigkeit zu steigern, desshalb bei allen paralytischen Zuständen, Rcp. Tinct. Cantharid. dr. 1, Aq. Foenical. unc. 2, Mds. Mit einem Schwämmchen vorsichtig auf die Lider zu streichen (bei paralyt. En- und Ectropium etc.) — Rcp. Spirit. Rorismarini dr. 3, Tinct. Cantharid. dr. 1, Aq. destill. dr. 6, Mds. Zweimal täglich das Lid damit anzufeuchten.

China ist eines der beliebtesten vegetabilischen Adstringentien. Folgender stärkende Augenwein, zur Hälfte oder zu zwei Dritttheilen mit Wasser verdünnt, verdient Anerkennung: Rcp. Pulv. cort. Chin. reg. unc. $\frac{1}{2}$, Vini rubr. unc. 4 stent per 48 hor. in digestionem. Col.

Chlorum calcariae als fäulnisswidriges, die Secretion verbesserndes und gelinde reizendes Mittel wird vorzugsweise bei Brand und jauchigen Geschwüren der Lider zu Fomenten benutzt. Rcp. Fl. Arnicae dr. 2, Fl. Chamomillae unc. $\frac{1}{2}$, f. infus. unc. 5, cui adde Chlor. calcar. scrup. unum. — Rcp. Chlor. calc. gr. 12—16, Aq. destill. unc. 4, Tinct. Opii spl. dr. $\frac{1}{2}$. Mds. Augenfoment.

Electricität, Galvanismus etc. sind bei manchen Augenärzten im Ruf, um die gesunkene Nervenfunction anzuregen und den verlangsamten Stoffwechsel zu beschleunigen. Man hat die Anwendungsart vielfach variirt und der Anwendbarkeit ohne Zweifel einen zu grossen Umfang vindicirt. Durch Electropunctur hat man in Einzelfällen ziemlich schnell günstige Resultate erzielt, wo es galt, auf bestimmte Muskelpartien einen intensiven Reiz direct einwirken zu lassen. Die mit der Prätension veröffentlichte Erfindung von *Gustav Crusell* (1841), durch Einleiten eines galvanischen Stromes in die cataractöse Linse dieselben aufblähen, in ihre Lamellen zerlegen und auf diese Weise sehr bald zur Resorption bringen zu können, ist bisher unbestätigt geblieben.

Fel tauri, Axungia viperina, Fel Lucii piscis, Liquor hepatis mustelae fluviatilis u. a. ähnliche Mittel werden zur Bethätigung des Stoffwechsels bei Cornealtrübungen empfohlen. Je energischer bei torpiden Exsudationen eingewirkt werden muss, um so günstiger ist es, wenn diese Fette bereits ranzig geworden sind.

Jod und besonders *Jodkali* ist längere Zeit gegen chronische Lidblennorrhoeen im Ansehen gewesen. Rcp. Kal. jodat. gr. 8, Aq. destill. unc. 8, Tinct. Opii scrup. 1. Mds. Augewasser.

Kali carbonicum verdient nach meinen Erfahrungen häufiger gegen Hornhautverdunkelung versucht zu werden. Man lässt in einer Unze destillirten Wassers zwei bis sechs Gran auflösen und mehrere Male täglich einträufeln.

Kali causticum verdient in einer von *A. Schmidt* angegebenen Weise wieder in Gebrauch zu kommen, wo es sich darum handelt, zugleich vom Auge abzuleiten und die Thätigkeit des 3. Astes des Nerv. quintus anzuregen. Er liess ein Klebepflaster mit einem Fenster von c. 1" Durchmesser vor und theilweise auf den proc. mastoid. der kranken Seite legen und das auf Charpie gebrachte, zerfliessende Aetzkali, das wieder mit Klebepflaster befestigt war, durch das Fenster 3 bis 6 Stunden einwirken. Das entstehende Geschwür wurde mit Ung. digestivum, dem man nach Umständen rothen Präcipitat oder Cantharidenpulver zusetzte, verbunden. Der Erfolg ist besonders bei beginnendem Strabismus und bei Luscitas günstig.

Kupfer ist als adstringirendes Mittel beliebt, doch darf es nur in kleinen Gaben verordnet werden, da es sonst seine ätzende Wirkung entfaltet. Gegen Auflockerung und Erschlaffung beider Bindehäute, Trübung, Erweichung und Ulceration der Hornhaut lässt man gr. 1 in unc. 1 destillirten Wassers auflösen. Doch kann man auch nöthigenfalls bis zu gr. 8 steigen und eine oder zwei Scrupel einfache Opiumtinctur zusetzen.

Von *Rust* ist bei chronischer Lidentartung, Lidschwiele, empfohlen, die folgende Salbe jeden Abend linsengross mit dem Finger in die Lidkante einreiben zu lassen: Rcp. Cupr. sulphur. in Aq. dest. q. s. solut., Zinc. oxydati aa gr. 5 (—10), Camphor. c. pauxillo Ol. Oliv. trit. gr. 2, Butyr. recent. insuls. dr. 2. M. exactiss. F. ung. ophthalm.

Der *Kupferalaun*, Lapis divinus oder nach seinem Erfinder auch sogenannte Lapis ophthalmicus St. Yves, wird aus gleichen Theilen Alaun, Salpeter und Grünspan (aa unc. 2) unter schliesslichem Zusatz von dr. 1 gepülverten Kamphers zusammengeschnitten, sieht grünlich aus und löst sich in Wasser leicht. Er gehört zu den gelinde ätzend, austrocknend und adstringirend wirkenden Mitteln und eignet sich desshalb besonders bei allen chronisch verlaufenden Entzündungen, bei denen man schwach reizend und umstimmend eingreifen will. Auch bei Hornhautgeschwüren, Narben und Trübungen ist er vielfach angewandt und gepriesen worden. Als Tropfwasser (gr. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ auf dr. 2 aq. dest. mit Zusatz von Aq. lauroceras.) oder als Bähung (gr. 1 auf unc. 1) passt er am besten zum Gebrauch. Die pulverige Anwendung gegen Hornhautflecke ist nicht anzupfehlen.

Bekannte Formeln sind die *Gräfe'sche* gegen chron. Bindehautentzündung: Rcp. Cupr. aluminat. gr. 2, solve in Aq. Rosar. unc. 1, Mucil. Gum. Mimos. dr. 1, Tinct. Opii croc. dr. $\frac{1}{2}$. Mds. Umgeschüttelt zur Befeuchtung von Augenläppchen. *Richter's* Collyrium gegen Erschlaffung, die nach Entzündungen zurückgeblieben war, besteht aus einer Auflösung von drei Gran in

einer Unze destill. Wassers und wird Morgens und Abends tropfenweise angewendet.

Opium. — Um der narkotischen Wirkung des Opiums bei Augenübeln sicher zu sein, wendet man es innerlich oder als Einreibung in der Nachbarschaft des Auges an. In Form von Tincturen oder als Aq. Opii auf die Augengebilde direct applicirt ist die Wirkung mehr eine reizende, wesshalb man sich auch der Tincturen besonders bedient, um durch gelinde Reizung die Resorption zu befördern. Bei Hornhauttrübungen wird sie zu diesem Behuf rein oder verdünnt in Gebrauch gezogen, ebenso bei atonischen Geschwüren, Pannus u. d. Die Tinct. Opii simpl. wirkt etwas schwächer, als die T. Op. crocata. — Häufiger kommen die Tincturen indess als Zusatz zu Collyrien zur Anwendung. — Um bei schmerzhaften Augenkrankheiten mit erethischem Character, wo Salben nicht wohl vertragen werden, Linderung zu verschaffen, lässt *Jüngken* gleiche Theile Opiumpulver und Zucker vom Patienten mit Speichel vermischen und um das Auge einreiben. Zu demselben Zwecke kann man das wässrige Opiumextrat (scr. 1) in einem Eibischdecoct (unc. 4) auflösen und als Bähung gebrauchen lassen.

Quecksilberpräcipitat, rother, ist als Mischungänderndes und Reizmittel bei allen chronischen Entzündungsformen der Lider und Liddrüsen sehr empfehlenswerth. Zuerst von *St. Yves* als Augenheilmittel benutzt, möchte ihn jetzt kein Augenarzt entbehren. Wegen seiner reizenden Eigenschaft eignet er sich nicht bei acuten Leiden, wegen seiner chemischen Eigenschaften wird er am zweckmässigsten in Salbenform verordnet.

Von *St. Yves* selbst rührt nachstehende Formel gegen s. g. Psorophthalmie her: Rcp. Cerae alb. gr. 15, Adip. suill. dr. 1½; liquefactis et refrigeratis adde Hydrargyri oxydati rubr. ppt. gr. 7½, Zinc. oxydat. gr. 4 Camphor. trit. gr. 3, Ol. Ovor. gtts. 2 M. exactissime. D. s. Balsamum ophthalmicum.

In heutiger Zeit verordnet man meistens den rothen Präcipitat nur mit Fett und zwar bei der Anwendung desselben auf den Bulbus auf zwei Drachmen Fett oder frischer ungesalzener Butter 1—2 gr., bei der Anwendung auf den Lidern die doppelte Dosis.

Die *Beer'sche* vielgebrauchte Augensalbe enthält für gewöhnliche Fälle zu viel Präcipitat: Rcp. Hydrarg. oxydat. rubr. ppt. gr. 12, Zinc. sulphurici (in aq. destill. gutt. 6 solut.) gr. 2, Butyr. rec. insuls. unc. dimid. M. exactiss. f. ung. Sie ist bei sehr torpiden chronischen Lidentzündungen und Entartungen der Drüsen von grossem Nutzen. Bei allen acuten Leiden ist Präcipitat überhaupt contraindicirt.

Richter liess das Mittel bei chronischen Entzündungszuständen um die Orbita einreiben in folgender Verbindung Rcp. Ol. Cacao, Adip. suill. aa drachm. 1; leni igne liquefactis

et refrigeratis admisce Hydrarg. oxydat. rubr. ppt. scrup. 1. M. f. ung.

Die von *Rust* bei allen vorgeschrittenen chron. Entzündungen, Verschwärungen der Corn. Conj. und bei Lidverhärtung empfohlene und oft gebrauchte Salbe ist folgende: Rep. Hydrarg. oxydat. rubr. ppt. gr. 6, Butyr. rec. insuls. dr. 2, Tinct. Opii crocat. Acet. plumb. aa scrup. $\frac{1}{2}$ M. exactissime, donec omnis humiditas disparuerit, ut fiat unguentum ophthalmicum.

Jüngken liess zwei Drachmen Rosensalbe, 6—8 Gran Präcipitat und 4—6 Gran gepülvertes Opium mischen und bei Blepharadenitis 1—2 Mal täglich erbsengross in die Lidränder einreiben.

Gegen Hornhautflecke gab *J. A. Schmidt* folgende Salbenmischung an: Rep. Hydrarg. oxydat. rubr. ppt. subtilissime pulv, scrup. $\frac{1}{2}$, Ol. Ovor. scrup. 1, Butyr. rec. insuls. unc. $\frac{1}{2}$, Cer. alb. dr. $\frac{1}{2}$. Butyrum et cera leni igne liquefiant, deinde admisceatur intime Hydrargyrum oleo sat bene subactum. F. ung.

Die zahlreichen übrigen Formeln für ähnliche Salben unterscheiden sich von den genannten wenig. Gegen Pannus hat man vielfach die Pulverform vorgezogen. *Benedict* liess einmal täglich eine Mischung von gleichen Theilen Präcipitat und Bol. Armen. auf 8 Theile weissen Zuckers zwischen die Lider blasen. Rep. Merc. præcip. rubr. (vel albi) gr. 2, m. terendo c. aliq. gutt. Ol. amygd. dulc. ad perf. subact., adde Adip. suill. dr. 1, Cer. alb. liquefact. scrup. $\frac{1}{2}$ M. f. ung. Im 2. Stad. der Ophth. aegypt. bei vorherrschender Granulation lässt *Fr. Jäger* diese Salbe 1—3 Mal täglich, anfänglich auf die Aussenseite der Lider, dann unmittelbar auf die granulöse Bindehaut mit dem Finger einstreichen.

Der *weisse Präcipitat* wird seiner schwächeren Wirkung gemäss in etwas stärkerer Dosis gebraucht. *Arlt* wendet ihn in den Fällen von Trachoma an, in welchen das Touchiren, weder mit Lapis noch mit Cuprum, vertragen wird oder nicht hinreichend oft vom Arzte selbst vorgenommen werden kann, und lässt ihn (3—6 gr. auf eine Drachme Fett) an der äusseren Lidfläche aufstreichen oder auch etwas schwächer zwischen die Lider bringen. Er zieht indess Cuprum in Substanz oder (mit Gummi arab. abgeschwächten) Lap. inf. vor. *Janin's* Augensalbe ist folgende: Rep. Axung. porc. unc. $\frac{1}{2}$, Merc. præcip. alb. dr. 1, Tutiae præp. Boli Armen. aa dr. 2, m. f. ung. — *Andreae* empfiehlt bei Schleimflüssen und gleichzeitiger Lidrüsenverschwärung Rep. Merc. præcip. alb., Tutiae præp., Boli albi aa gr. 8, Cer. alb. dr. $\frac{1}{2}$, Adip. suill. dr. $1\frac{1}{2}$ M. exactiss. Ds. Ein oder zwei Mal täglich linsengross in's Auge zu streichen. — Rep. Merc. præcip. alb. gr. 15, Adip. suill. rec. dr. 2, M. f. ung. Im 2. Stad. der Ophth. aegypt. auf die innere Lidfläche zu pinseln.

Quecksilbersublimat darf seiner stark ätzenden Wirkung halber nur in sehr schwacher Dosis und in Auflösung verordnet werden. *Gräfe* sen. verordnete, um bei torpiden Entzündungen und Schleimflüssen den Stoffwechsel anzuregen: Rcp. Hydrarg. muriat. corros. gr. $\frac{1}{4}$, solve in Aq. Rosar. unc. 1, adde Mucilag. Gum. Mimos. dr. 2, Tinct. Opii crocat. scrup. 2. Mds.

Ratannh. kommt als Adstring. örtlich nicht mehr häufig zur Anwendung. *Kneschke* empfahl für das 2. Stadium der Ophthalm. neonatorum folgende Salbe: Rcp. Axung. porc. dr. 1, Mercurii præcipit. alb. gr. 1—2, Flor. Zinci Extr. Ratannh. aa gr. 3—6. M. exact. D. s.

Salvia wird wie Rad. Ratannh. Cort. Salicis und andere gerbestoffhaltige Mittel bei allen Zuständen mit Erschlaffung und gesteigerter Empfindlichkeit vielfach gerühmt. Als stärkendes Augenwasser in folgender Bereitung: Rcp. Inf. herbae Salviae unc. 3, Spirit. Vin. unc. $\frac{1}{2}$. Mds.

Schwefel ist gegen s. g. Lidräude und Kupferausschlag Tags als Waschmittel und für die Nacht zu Compressen empfohlen worden. Rcp. Fl. Sulphur. dr. 2, Camphor. dr. 1, Aq. Rosar. unc. 7. — Rcp. Lact. Sulph. dr. 1, Aq. Rosar. unc. 4, Tinct. Benz. dr. 2. Mds. Waschmittel.

Zink ist wegen seiner zusammenziehenden und beruhigenden Wirkung eines der Augenmittel, welche oft sowohl in Salbenform als in Auflösung gebraucht werden. Beliebter als die Zinkblumen ist mit Recht das schwefelsaure Zinkoxyd, das unter dem Namen weisser Augenstein, Gallitzenstein gegen alle Arten von krankhaften Secretionen auch populären Ruf hat. Augenbähungen setzt man es bis zu einem halben Scrup. auf 4—6 Unz. zu. Als Einträufelung bei Empfindlichkeit nach Entzündungen benutzt man es gern in Opiumwasser oder in destillirtem Wasser aufgelöst. (gr. $\frac{1}{2}$ —1—2 in unc. dimid.) — Bei Conjunctivalauflockerung mit Hornhauttrübungen: Rcp. Zinc. sulphurici gr. 1—4, Aq. dest. dr. 2 — unc. dim. Gum. Mimos. scr. 1, Tinct. Opii simpl. scrup. 1 — drachm. 1. Mds. Ein bis drei Mal umgeschüttelt einzuträufeln. —

Bei chron. Entzündungsformen lässt *Jüngken* das Zink lauwarm einträufeln und verordnet: Zinc. sulphurici gr. $\frac{1}{2}$ —1 solve in Aq. destill. unc. 1, adde Tinct. Opii crocat. gutt. 15. —

Bei demselben Zustande mit starker Schleimbildung verordnet v. *Gräfe* sen. Rcp. Zinc. sulph. gr. 3, solve in Aq. Rosar. dr. 3, Mucil. Gum. Mimos. dr. 1, Tinct. Opii crocat. dr. $\frac{1}{2}$. Mds. Umgeschüttelt 1—2 Mal täglich einzuträufeln.

In Salbenform wendet man es bei denselben Krankheiten lieber an, wenn Wässer wegen recenter Entzündung nicht wohl ertragen werden und wenn man wegen Entartung der Meibom'schen und Ciliardrüsen und wegen Excoriation der Lidränder

eine intensivere, nachhaltigere Wirkung beabsichtigt. Rcp. Zinc. sulph. scr. $\frac{1}{2}$ —1, Axung. porc. dr. 2 M. exactissime. Um die Wirkung zu verstärken, kann man dieser Salbe passend Hydrarg. oxydati rubri gr. 1—4 oder Hydrarg. ammoniato-muriati gr. 2—6 zusetzen. —

Gegen Ophthalm. neonat. empfiehlt *Ad. Schmidt* Rcp. Zinc. sulphur. scr. 1 Extr. Saturn. dr. $\frac{1}{2}$, Aq. destill. unc. 10 Spir. Vin. camphor. dr. 2, Alum. crud. scrup. 1, um mit dieser Mischung 2—4 Mal täglich das Auge auspinseln zu lassen.

Das *Chlorzink*, eines der heftigsten Aetzmittel, muss mit grösster Vorsicht gebraucht werden. Man wendet es am besten als Paste an (nach *Canquoin*) und verordnet, um z. B. Krebsgeschwülste u. d. zu beseitigen, Rcp. Zinc. muriatici dr. 1, Amyli unc. $\frac{1}{2}$, M. f. pulvis. Das Pulver wird zur Zeit des Gebrauches mit Speichel zu einer Paste angerührt und mit einem Myrtenblatt auf die kranke Stelle gestrichen. Anfänglich ist der Schmerz heftig, die harte Kruste kann man durch Cataplasmen zum früheren Abfallen bringen. Ist dann das Geschwür noch nicht rein, so muss die Aetzung repetirt werden.

Formeln,

auf die im Texte verwiesen ist.

1. Rep. Spirit. Vin. rfti unc. $1\frac{1}{2}$ Aeth. sulph. unc. $\frac{1}{2}$. Mds. Waschmittel. —
 2. Rep. Zinc. sulph. dr. $\frac{1}{2}$ —1 Aq. destill. unc. $1\frac{1}{2}$. Mds. Bähung. —
 3. Rep. Ol. Croton. dr. $\frac{1}{2}$ Ung. rosat. unc. 1 M. f. unguent. —
 4. Rep. Coniini gr. $\frac{1}{2}$, ff. albi dr. 1 Mfp. Div. in pts. aeq. 6. Ds. Täglich 2—3 Pulver.
 5. Rep. Hydrarg. muriat. corros. gr. $\frac{1}{2}$ —1 in Aq. destill. unc. 4 sol. Mds. Collyrium.
 6. Rep. Hydrarg. pt. rubr. gr. 2—4 Ad. suill. dr. 2. Mds. Augensalbe. Linsengross Abends mit einem Malerpinsel auf den Lidrand zu streichen.
 7. Rep. Hydrarg. pt. albi gr. 2—4 Ad. suill. dr. 2. Mds. Augensalbe.
 8. Rep. Hydrarg. præcipit. alb. gr. 4, Extract. Belladonn. gr. scrup. $\frac{1}{2}$ Adip. suill. dr. 1. Mds. 4stündlich tüchtig einzureiben. —
 9. Rep. Tart. stib. dr. $\frac{1}{2}$, Cort. Metzger. pulv. scrup. 1 Adip. suill. dr. 2. Mds. Pockensalbe.
 10. Rep. Coniini gr. 2 solve in Spir. Vin. scrup. 1 Aq. destill. unc. 4. Mds. 2—3 Mal 20—40 Tropfen.
 11. Rep. Coniini gr. 1 Elaeos. cort. Aurant. dr. 1 Mfp. Div. in pts. aeq. Nro. 10. Ds. Täglich 1—2 Pulver.
 12. Rep. Arg. nitr. fus. gr. 1—4, Aq. destill. unc. 1, D. in vitro charta nigra obducta. Ds. Mit einem Federkiele 1—2 Mal einige Tropfen einzuträufeln.
 13. Rep. Hydrarg. muriat. corros. gr. $\frac{1}{4}$ Aq. destill. unc. 2 Mucilag. Cydonior. dr. $\frac{1}{2}$ Laudani liq. Sydenh. gtts. 6—8. Mds. 2—3 Mal zur Benetzung der Lider. (*Conradi.*)
 14. Rep. Lapid. divin. gr. 16, Aq. destill. unc. 4, Tinct. anodyn. dr. 1, Acet. Litharg. gtts. 4. Mds. Augenwasser.
 15. Rep. Hydrarg. præcip. rubr. Hydr. præcip. alb. aa gr. $\frac{1}{2}$ —2, Adip. suill. dr. 1. Mds. Erbsengross Abends auf die Lider zu streichen.
 16. Rep. Hydrarg. præcip. rubr. gr. 2—4. Lapid. divin. alcoholis. gr. 4—8, Laudan. liq. Sydenh. gtts. 10—15, Adip. suill. dr. 1. Mds. (bei Ophth. senil. noch $\frac{1}{2}$ gr. Camph. hinzu.)
-

Glossarium und Register.

A.

- Ablepharon, Lidmangel, p. 5, Operat. p. 189.
Abolitio sac. lacr., Verödung des Thränensackes.
Accommodationsparese, p. 131.
Achlys s. macula semipellicuda corneae.
Achromatopsia, Unvermögen der Farbenunterscheidung.
Acinesia pupillae, Unbeweglichkeit der Pupille.
Acinesis, p. 129.
Acyanoblepsia, s. Acyanopsia (*Göthe*), Unvermögen, blaue Farbe zu erkennen.
Adenosynchitonitis s. Ophthalmia neonatorum, p. 30.
Adhaesionsstaphylom, Verschmelzung von Pseudocornea und Iris (*v. Gräfe* sen.), p. 66.
Aegilops, Geisauge, Zellgewebsabscess im Augenwinkel.
Aegis, undurchsichtige Hornhautverdunkelung, p. 56.
Akrochordon, krebshafte Lidwarze.
Albinismus, Pigmentmangel im Auge, p. 148.
Albugo s. Aegis, p. 56.
Alopecia, Wimper- und Brauenmangel, s. Madarosis, p. 12.
Amaurosis, schwarzer Staar, vollständige Functionsstörung des optischen Sinnesorganes aus unerkannter Ursache.
Amblyopia, Stumpfsichtigkeit, unvollständige Functionsstörung desselben aus unerkannter Ursache.
Amblyopisches oder amaurotisches Katzenauge (*Beer*), glänzender Reflex aus dem Augengrunde, wie er zumal bei beginnendem Markschwamm der Retina beobachtet wird.
Amphiblestroditis, Inflammatio retinae, p. 112.
Amphiblestritis, idem.
Anabrochismus (*Celsus*), unbrauchbare Methode, entropionirte Wimperhaare mittelst einer Haarschlinge nach Aussen zu stellen.
Anaesthesia retinae, p. 120. — A. nerv. opt., p. 128. — A. cil., p. 135.
Anaphalantiasis s. Madarosis, Wimper- und Brauenmangel, p. 12.
Ankyloblepharon, Verwachsung der Lidspalte, p. 6. — Operat. p. 190.
Anchylops (*Heister*), entzündliche Geschwulst im Augenwinkel, Vorstadium von Aegilops, p. 157.
Anerythroptie s. Daltonismus, Unvermögen, rothe Farben zu erkennen.

- Aneurysma orbitae, Schlagadergeschwulst.
 Aniridie s. Irideremie, Irismangel, p. 87.
 Anophthalmos, Mangel beider Augen, p. 160.
 Anthrax palp., Milzbrandkarbunkel am Auge, p. 19.
 Apoplexia choroideae, p. 145.
 Aquocapsulitis s. Hydatoditis, Entzündung der Wasserhaut, p. 110.
 Arcus senilis s. Gerontoxon, Greisenbogen, p. 55.
 Aridura bulbi s. Atrophia bulbi, Augapfelschwund, p. 167.
 Ashenopia, Debilitas nervosa oculi, Nervenschwäche des Auges, p. 135.
 Atonia und Atresia punct. et canaliculorum lacrym., p. 158.
 Atoniatonblepharon, Ptosis des Oberlides aus Erschlaffung des *m. levat.*
 Atresia duct. nas., Verwachsung z. B. des Nasenschlauches, p. 157.
 Atrophia bulbi, p. 167.
 Augenprismen, p. 185.
 Augenspiegel, p. 182.

B.

- Blennorrhoea, Schleimfluss.
 Blepharadenitis s. Blepharitis glandulo-ciliaris, Liddrüsenentzündung, p. 16. — Bl. Meybomiana, p. 18.
 Blepharitis, Lidentzündung, phlegmonosa, p. 14. — Bl. erysipelata, p. 15.
 Blepharoblennorrhoea s. Lippitudo, Epiphora sebacea, Augenlidschleimfluss.
 Blepharophthalmia, Complication der Lid- und Bindehautentzündung.
 Blepharophthalmitis s. Blepharophlegmasia, phlegmonöse Lidentzündung.
 Blepharoplastik, operative Lidbildung, p. 189.
 Blepharoplegia, Lidlähmung, p. 129.
 Blepharoptosis, Senkung des oberen Lides aus mechanischer oder paralytischer Ursache, p. 7. — Operat. p. 193.
 Blepharospasmus, Lidkrampf, p. 132.
 Blepharopyorrhoea glandulosa, Eiterungszustand der Meybom'schen Drüsen.
 Buphthalmus s. Megalophthalmus, Ochsen- oder Glotzauge, Volumenzunahme des Bulbus in Folge von Wassersucht oder angeboren, p. 161.

C.

- Caecitas crepuscularis, Blindheit in der Dämmerung.
 — nocturna und diurna, Tag- und Nachtblindheit, p. 126 u. 120.
 Caligo s. Achlys (s. d.)
 Callositas palp. s. Tylosis, Augenlidschwiele.
 Cancer bulbi, p. 165.

- Capsitis s. Capsulitis s. Periphakitis, p. 97.
 Carbunculus palp., p. 19.
 Carcinoma oculi, krebshafte Geschwulst an oder im Auge.
 Carunculae rebelles s. malignae corneae et scleroticae, rothe, krebshafte (?) Knötchen, Warzen, meist zufolge Vernachlässigung oder schlechter Behandlung.
 Canthitis s. Ophthalmia angularis, jede Entzündung im Augwinkel.
 Cataracta, grauer Staar, p. 98. — Operat. p. 211.
 Ceratocele s. Keratocele s. hernia corneae, Vorlage von Iris-substanz in eine verdünnte, bläschenartigvorgetriebene Cornealpartie, — auch überwachsener Irisvorfall, p. 62.
 Chalazion s. Chalazosis, Hagelkorn, p. 13. — Operat. p. 199.
 Chemosia serosa, Oedem der Bindehaut, p. 39.
 — phlegmonosa, Entzündung derselben und des subconjunctivalen Zellgewebes, p. 39.
 Chondroma conj. corn., grössere, knorpelartige, mit varicösen Gefässen umzogen, aus Zellgewebsfasern bestehende Geschwülste.
 Choroiditis, Entzündung der Aderhaut, p. 140.
 Choroidealcongestion, p. 139.
 Chromatopseudopsia s. -metablepsia s. Achromatopsia. (S. d.).
 Chrupsia s. Chromopsie, Farbensehen, Erscheinung ein- und mehrfarbiger Flecken, Kreise aus Hyperästhesie der Netzhaut.
 Cirsophthalmos, irrthümlich angenommene varicöse Entartung des vorderen Augenhemiglobus, p. 65.
 Ciliaramaurose, Blindheit aus Functionsstörung der Ciliarnerven durch verminöse, gastrische Reize, narkotische Gifte, Druck durch die dislocirte Linse auf das corp. ciliare.
 Clavus s. Hilon, Helos, Nagelkopf, obsoleter Namen für weissüberzogenen Irisvorfall, p. 65.
 Coloboma iridis, Spalte in der Iris, p. 94. — Operat. p. 190.
 Coloboma palp., Spalte im Lide, p. 5.
 Condyloma iridis, Exsudatklümpchen, von Walther bei syphil. Iritis fälschlich als Condyloma aufgefasst, p. 85.
 Conjunctivitis simpl., p. 20. — C. exanthematica, p. 21. — C. catarrhalis, p. 22. — C. trachomatosa, p. 23. — C. lymphatica, p. 27. — C. blennorrhoeica, p. 29. — C. membranacea, p. 35.
 Corectopia, Seitenlage der Pupille, p. 86.
 Coremorphosis, künstliche Pupillenbildung, p. 225.
 Corencleisis, Verziehung der natürlichen Pupille, p. 226.
 Coreoncion, Instrument zur Bewirkung derselben, p. 271.
 Corepalinanoixis, Wiedereröffnung der natürlichen Pupille, p. 227.
 Coreparhelkysis s. Corencleisis (s. d.).
 Corestenoma congenitum, angeborene, durch Auswüchse bedingte Pupillenenge (v. Ammon).
 Corneitis s. Keratitis, p. 45 etc.

- Corodialysis s. Iridodialysis (s. d.) p. 226.
 Corotomia s. Iridotomia (s. d.), p. 226.
 Crithe s. Hordeolum, Gerstenkorn, p. 12.
 Crusta lactea palp., p. 19.
 Crystallitis s. Phakitis, p. 97.
 Cyclopia, p. 161.
 Cystotom, p. 270.
 Cysticerius cellulosa s. Hydatid finna, Finnenwurm, p. 44, p. 75.

D.

- Dacryadenitis, Thränendrüseneentzündung, p. 154.
 Dacryalloeosis, fehlerhafte Mischung der Thränenflüssigkeit.
 Dacryadenalgia s. Neuralgia lacr., d. h. rami ophthalm. nervi trigemini.
 Dacryoblennorrhoea s. Dacryocystalgia (s. d.)
 Dacryocystalgia cacoehymica s. Dacryoblennorrhoea s. Blennorrh. sac. lacrym. seroph., serophulöser Thränensacktripper, — empfindliche Blennorrhoe des Thränensackes.
 Dacryocystitis, Entzündung des Thränensackes, p. 156.
 Dacryocystoatonia s. Atonia s. Hernia (*Beer*) sacci lacrymalis, Erschlaffung und wässrige Anfüllung des Thränensackes.
 Dacryohaemorrhysis, Blutweinen, Bluterguss in die Thränenorgane, nach Traumen, bei Scorbut, Menstruatio anomala etc. beobachtet.
 Dacryolithi, Thränensteine, kalkartige Concretionen, die sich aus den Thränen und den übrigen Augensecreten präcipitiren.
 Dacryops, Thränengeschwulst des Oberlides, *fistulosus* (*Schmidt*), wenn der D. mit einer künstlichen Fistel versehen ist, *blennoideus* (*Schmidt*), blennorrh. Ausgang der Dacryocystitis, p. 155.
 Dacryorhysis s. Dacryorrhoea s. Epiphora, Thränenträufeln aus vermehrter Thätigkeit der Thränendrüse.
 Dacryostagon s. Stillicidium lacrymarum, idem aus Entartung der thränenableitenden Organe. (*Ad. Schmidt*).
 Dasyma s. Dasytes, Augenlidrauhigkeit.
 Depressio catar. p. 212.
 Dermatitis palp. s. Erythema, Entzündung der Lederhaut des Lides, siehe Blepharitis.
 Deplumatio, Brauen- und Wimperndefect, p. 12.
 Dictyitis s. Retinitis, Entzündung der Netzhaut. p. 112.
 Diapyesis, Eiteransammlung zwischen Iris und Linse.
 Diphtheritis conj., p. 35.
 Diplopia s. Visus duplex, Doppelsichtigkeit, p. 163.
 Diplokorie, Vorhandensein zweier Pupillen, p. 86.
 Distichiasis, zwei Reihen einwärts gekehrter, überzähliger Wimper, p. 11. — Operat. p. 198.
 Dislocatio catar., p. 210.

- Distoma oculi humani, Saugwurm innerhalb des Bulbus.
 Dyschroia palp. congenita, Entfärbung im rete Malpighi der Lidhaut.
 Dyscoria, abnorme Pupillarform.
 Dysopia tenebrarum, Nachtblindheit, p. 126.

E.

- Ecblepharon, künstliche Augen aus bemalten Metallplatten, bei den Alten üblich.
 Ecchymosis conj., palp., — Bluterguss in die Bindehaut, das Lid.
 Ecchymoma, voluntarium, Augenblutung aus inneren Ursachen, p. 75.
 Ectopia tarsi, fehlerhafte Lage des Lidknorpels als Ursache von Ptoſis (*Blasius*).
 Ectropium, Auswärtskehrung der Lider, p. 10. — Operat. p. 195.
 Emphraxis ductus nasalis, Obstruction des Nasencanals durch Schleim oder Thränensteine.
 Emphysema palp., Luftgeschwulst der Lider.
 Empyesis oculi, Eiterheerd im Innern des Auges.
 Encanthis, Carunkelgeschwulst, p. 160.
 Enchondroma orbitae, Knorpelgeschwulst in der Augenhöhle.
 Enothes s. Symblepharon, Verwachsung der Lider mit dem Bulbus, p. 6.
 Entozoa oculi, Würmer im Auge.
 Entropium, Einwärtskehrung der Lider, p. 9. — Operat. p. 193.
 Entoptik, p. 175.
 Epicanthus, halbmondförmige Hautfalte an beiden inneren Augenecken, p. 8. — Operat. p. 193.
 Epicauma, Cornealgeschwür mit corrodirendem Secrete.
 Epiphora s. Dacryorrhysis, s. d.
 Erysipelas palp., Lidrose, p. 15.
 Erosionsgeschwür s. ulcus catarrhale, unmerklich vertiefte Cornealfacette bei catarrhalischer Conjunctivitis, p. 51.
 Exophthalmia, Vorlagerung des Bulbus wegen Volumenzunahme desselben.
 Exophthalmus, Vorlagerung des Bulbus wegen Raumverminderung der Orbita.
 Exostosis orbitae, Knochenauswuchs in der Augenhöhle.

F.

- Facettirung der Hornhaut, sehr geringer, wie ausgeschliffener Substanzdefect der Cornea, p. 51.
 Fistula corneae, permanente Hornhautperforation mit Kammerwasserabfluss, p. 61.
 Fistula glandulae lacrymalis, callöser, haarfeiner Fistelgang in die Thränendrüse, p. 154.

- Fistula sacci lacrymalis, Thränensackfistel, p. 157.
 — orbitae, Fistelöffnung, die an der inneren oder äusseren Lidfläche bis tief in die Orbita verläuft; nach Orbitalabscess.
 Fungus medullaris retinae, Markschwamm der Netzhaut, besonders im Kindesalter, p. 114.
 Fungus melanodes oculi, pigmentreiche Krebsgeschwulst in oder am Auge.
 Furunculus palp., Blutschwäre des Lides, p. 19.

G.

- Gangraena corn., p. 53.
 — oculi, Ausgang der Panophthalmitis in Brand.
 Gerontoxon s. Arcus senilis, Greisenbogen, p. 55.
 Glaucoma s. Glaucoſis, unvollständige oder vollständige Erblindung mit oder ohne Schmerzen, acut oder chronisch etc., aber mit grünlichem Schimmer aus dem Grunde des Auges, p. 144.
 Glaucomatosa, Cataracta, cataractöse Erblindung mit grünlichem Schimmer etc.
 Grando s. Chalazion, Hagelkorn.
 Granulationes conjunctivae, körnige Bindehautentartung mit Neigung zur Wucherung, verschieden von Hypertrophie des Papillarkörpers.
 Gutta serena s. suffusio nigra s. Amaurosis perfecta, schwarzer Staar, siehe Anaesthesia retinae perfecta etc., p. 121.

H.

- Haemalops intern., Bluterguss in die Kammern aus inneren Ursachen, z. B. nach unterdrückter Hämorrhoidalblutung, p. 75.
 Haematomma s. Haemalops. (S. d.)
 Haemodacrysis, Blutweinen, blutige Färbung der Thränen.
 Haemophthalmia int. s. Haemalops. (S. d.)
 Haemophthalmus ext. äusseres Blutauge, Bluterguss unter die Conjunctiva, p. 43.
 Haemorrhagia conjunctivae, p. 43. — H. interna, Blutauge, p. 75.
 Hallucinationes visus, Gesichtstäuschungen bei optischer Hyperästhesie des Centralapparates.
 Hebetudo visus s. visus evanidus, Gesichtsschwäche bei Ciliaranästhesie, die sich durch schnelle Ermüdung beim Gebrauch der Augen characterisirt, p. 135.
 Hemeralopia s. Caecitas diurna, Tagblindheit, Unvermögen bei Tageslicht zu sehen. Viele Autoren verstehen irrthümlich unter H., welche die Alten nicht kannten, Nachtblindheit, p. 126.
 Hemiopia, Halbsehen, Unvermögen alle Theile des Gesichtsfeldes zu sehen, p. 119.

- Helos s. Clavus, Nagelkopf. (S. d.)
 Hernia corneae s. Keratocele, Hornhautbruch. (S. d.)
 — iridis, Hornhautbruch, in den Irissubstanz vorgesunken ist.
 — sacci lacrym. (*Beer*) s. Relaxatio s. lacr. Erschlaffung des Thränensackes, p. 156.
 — choroideae, richtiger Prolapsus chor., Vorfall der Aderhaut aus Wundöffnungen.
 — scleroticae (*Ruete*), Vereiterung und Bruch der Lederhaut.
 Hilon s. Helos. (S. d.)
 Hippus, klonischer Iriskrampf, p. 89.
 Hordeolum, Gerstenkorn, p. 12.
 Horopter, linea, quae visum finit ac terminat (*Aquilonius*); neuerdings dient das Wort Horopter zur Bezeichnung derjenigen Fläche, welche durch diejenigen Punkte bestimmt wird, die gleichzeitig einfach erscheinen.
 Hyalitis s. Hyaloideitis, Entzündung der Glaskörperhaut, p. 110.
 Hydatis gland. lacrym. p. 155.
 — finna, Finnenwurm.
 Hydatocapsulitis, Name für die fälschlich statuirte Entzündung des inneren Hornhautüberzuges (*Andreae*), — Hydrops caps. lentis (*Ruete*). — ? —
 Hydatoditis s. Hydatocapsulitis (s. d.).
 Hydromeningitis s. Hydatocapsulitis (s. d.), p. 50.
 Hydrophthalmus anticus s. Hydrops camerae anter., übermäßige Anhäufung von Kammerwasser, p. 73.
 Hydrophthalmus posterior s. Hydrops corp. vitrei, Anhäufung von Feuchtigkeit im Parenchym des corp. vitreum, p. 110.
 Hydrophthalmus mixtus s. universalis, Wassersucht in allen Augentheilen, p. 165.
 Hydrops sacci lacrymalis (*Beer*), Ausdehnung der vorderen Thränensackwand durch Schleimwasser, p. 156.
 Hydrops capsulae lentis s. Phakohydropsie, Wassersucht der Linsenkapsel. (*Ruete*).
 Hydrops choroideae int. und ext., Wasseransammlung innerhalb und ausserhalb der Aderhaut, p. 146.
 Hydrops camerae anterioris s. Hydrophthalmus ant. (s. d.)
 — corporis vitrei s. Hydrophthalmus post. (s. d.), p. 110.
 Hydrorrhoea (*Gräfe* sen.), wässriger Erguss als erstes Stadium der Blennorrhoe, p. 29.
 Hylos s. Clavus.
 Hyperästhesia retinae, gesteigerte Reizbarkeit der Netzhaut, p. 115.
 — nerv. optici, gest. Reizbarkeit des Sehnerven, p. 127.
 — nerv. cil., gest. Reizbarkeit der Ciliarnerven, p. 135.
 Hyperämia choroideae, Blutüberfüllung der Aderhaut, p. 138.
 Hypercinesis, p. 132.
 Hyperkeratosis s. Keratoconus, kegelförmige Hervorwölbung der durchsichtigen Hornhaut, p. 71.
 Hypertrophia iridis, Volumenzunahme der Iris.

Hypoaema s. Hyphaema s. Haemalops (s. d.), inneres Blutaugen, p. 75.

Hypoblepharon, künstliches Auge der Alten, aus einer bemalten Metallplatte bestehend, und so geformt, um unter die Lider geschoben zu werden.

Hypochyma s. Hypochysis s. suffusio, s. gutta opaca, graue Staar, p. 98.

Hypophthalmia s. Hypoaema, Bluterguss in das Kammer-system aus innern Ursachen, p. 75.

Hypopyon, Eiterauge, Eitererguss in das Kammer-system, p. 73.

I.

Inversio palp. s. Entropium, p. 9.

Iriankistron (*Schlagintweit*), Instrument zur künstlichen Pupillenbildung.

Iridaraeosis s. Atrophia iridis, Irisverdünnung.

Iridauxesis s. Hypertrophia iridis, Verdickung der Iris.

Iridectomie, Pupillenbildung durch Excision eines Irisstückes, p. 227.

Iridelcosis, Geschwürsbildung und Verschwärung der Iris.

Iridoencleisis, Pupillenbildung durch Einklemmung des losgerissenen Iristheiles, p. 226.

Iridentomencleisis, Iridectomie mit gleichzeitiger Einklemmung der Iris (*Himly*).

Irideremia, Irismangel, p. 87.

Iridodonesis s. Iridodenosis, Iriszittern, p. 88.

Iridodialysis, Pupillenbildung durch Ablösen eines Iristheiles vom Ciliarringe (*Schmidt* und *Scarpa*), p. 226.

Iridoncosis s. Iridauxesis.

Iridoparelykysis s. Koreparelykysis, Pupillenbildung durch Verziehung und Einklemmung eines Iristheiles, p. 227.

Iridoperiphakitis (*Sichel*), complicirte Entzündung der Linsenkapsel, Uvea (?) und der Iris.

Iridoperisphinx (*v. Ammon*), überschüssige Pigmenteinlagerung (*Melanose?*) im kleinen Iriskreise.

Iridoschisma s. Coloboma iridis, angeborener Irisspalt, p. 94.

Iridotomedialysis, Iridotomie mit gleichzeitiger Ablösung der Iris (*Donegana*).

Iridotomia, Pupillenbildung durch Incision der Iris, p. 226.

Iridorhexis, Pupillenbildung durch Zerreißung der Iris, p. 229.

Iritis, Entzündung der Iris, p. 79.

K.

Keratitis, Hornhautentzündung, pustulosa p. 45, K. pannosa p. 46, K. parenchymatosa p. 48.

Keratocele, Hornhautbruch, p. 62.

- Keratoconus s. Hyperkeratosis, p. 71.
 Keratomalacia, Hornhautreweichung, p. 53.
 Keratonyxis, Linsendislocation nach Hornhautstich, p. 216.
 Keratoplastik, (ohne Erfolg angestellte) Verpflanzung der Hornhaut von einem Thiere in ein menschliches Auge.
 Kerectomia s. Abrasio corneae, Abtragung eines undurchsichtigen Hornhautstückes, p. 204.
 Koloboma iridis, Irisspalt, p. 94.
 — palpebr., widernatürlicher Spalt des Lides, p. 5.
 Kopiopie (*Pétrequin*), s. Asthenopie (*Mackenzie*), hebetudo visus, p. 135.
 Korectom (*Stromeier*), Instrument zur künstlichen Pupillenbildung.
 Korectopie, Pupilla excentrica, p. 86.
 Koremorphosis oder Bildung einer künstlichen Pupille, p. 225.
 Kyklitis, Entzündung des corp. ciliare, p. 149.

L.

- Lagophthalmus, Hasenauge, organ. paralyt. spastic., p. 7. — Operat. p. 192.
 Leucoma, undurchsichtige, prominente, ausgedehnte Hornhauttrübung, p. 56.
 Leucopathia s. Albinismus, Pigmentmangel, p. 148.
 Leucosis s. Leucopathia.
 Lemia s. Lippitudo angularis, chronischer Augewinkelschleimfluss.
 Lemositas s. Blepharoblennorrhoea.
 Lippitudo, chronischer Augenschleimfluss.
 Loupe, p. 169.
 Luscitas s. Strabismus immobilis, unbewegliches Schiefstehen des Bulbus, p. 134.

M.

- Madesis, Schwund der Wimpern und Brauen, p. 12.
 Madarosis s. Madesis, p. 12.
 Malacia corn., p. 53.
 Malum s. Myokephalon, verwachsener Irisvorfall, p. 65.
 Margarita, Perle, perlähnliches Leucoma, p. 56.
 Marmaryge Hippokratis s. Chrupsia, Farbensehen, bei optischer Hyperästhesie und einigen dioptrischen Störungen vorkommend.
 Megalopia, dioptrische oder katoptrische Anomalie, vermöge derer die Sehobjecte vergrößert erscheinen.
 Megalophthalmus, Ochsenauge, p. 161.
 Melanosis oculi, krankhafte Pigmentbildung, gewöhnlich mit Markschwamm complicirt.

- Metamorphopsia, Missgestaltsehen, auf geringer Richtungs-
differenz der Sehaxen beruhend, p. 122.
- Melon s. Malum, p. 65.
- Meropia s. Hemioopia, p. 119.
- Mikropia, Gegensatz von Megalopia.
- Mikrophthalmus, angeborene Bulbuskleinheit, p. 161.
- Milium palp., Hirsekorn, p. 14. — Operat. p. 199.
- Milphosis s. Madesis, p. 12.
- Monophthalmus s. Cyclopie, p. 161.
- Monostoma lentis, Eingeweidewurm in der Linse.
- Morum palp. (*Plenk*), maulbeerähnliche Granulation der Lid-
bindehaut.
- Mydriasis, krankhafte Pupillenweite, p. 90.
- Myodesopsia, mouches volantes, Mückensehen, p. 116.
- Myitis oculi, Augenmuskelentzündung, p. 150.
- Myocephalon, Fliegenkopf, s. Malum, p. 65.
- Myopia, Kurzsichtigkeit, p. 161.
- Myopodiorthoticon, Apparat zur Bekämpfung der Kurzsichtig-
keit, p. 162.
- Myosis, krankhafte Pupillenenge, p. 89.
- Myotische Brillen, p. 187.
- Myotomia ocularis, Augenmuskeldurchschneidung, p. 229.

N.

- Naevus iridis, Pigmentflecken der Iris.
- Nebula, Nebelfleck der Hornhaut.
- Nephelium s. Nebula.
- Neoplasmata conj., p. 43.
- Neuralgia ciliaris, p. 138.
- Nictitatio, krankhaftes Blinzeln, p. 132.
- Nubecula, Nubes, s. Nebula.
- Nyctalopia, Nachtsehen oder Tagblindheit, p. 120.
- Nystagmus, klonischer Augenmuskelkrampf. p. 133.

O.

- Obliteratio art. centr. ret. part. p. 126.
- Obscuratio corneae, Hornhautverdunkelung, p. 54.
- Obturator pupillae, Pupillensperre, p. 92.
- Oculus leporinus s. Lagophthalmus.
- Onyx s. Unguis, nagelwurzelähnliche Eiteransammlung in der
vorderen Kammer, p. 74.
- Opacitäten des corp. vitr. p. 111.
- Ophthalmia, jede Entzündung am Auge. — O. neonatorum p. 30. —
O. gonorrhoeica, p. 32. — O. aegyptiaca, p. 33.
- Ophthalmodynia, nervöser Augenschmerz, p. 138.
- Ophthalmomyitis, Augenmuskelentzündung, p. 150.

Ophthalmodesmitis (*v. Ammon*) s. Kyklitis (*Bérard*), Strahlenkörperentzündung, p. 149.

Ophthalmopyorrhoea, jeder Augenschleimfluss.

Ophthalmoplegia, Lähmung sämtlicher Augenmuskeln.

Ophthalmoptosis, Prominenz des Bulbus bei Ophthalmoplegia.

Ophthalmospasmus, Augenmuskelkrampf, p. 133.

Ophthalmostat, Instrument zur Fixirung des Bulbus bei Augenoperationen.

Optometer, p. 181.

Oxyopia, visus acies acuta, krankhafte Schärfe des Auges bei mangelhafter Beleuchtung, meist Vorstadium von Tagblindheit.

P.

Pachyblepharon, { s. Tylosis, schwielige Entartung der Lider.
 Pachyblepharosis, {
 Pachytes, {

Pannus, das dichte Augenfell, p. 46.

Panophthalmia, Panophthalmitis, Entzündung sämtlicher Augenorgane, p. 167.

Paralampsis s. Leucoma, Leucoma cretaceum.

Perforatio corn., p. 61.

Peribrosis, chron. Excoriationen der Augenwinkel.

Pericrasis s. Peribrosis.

Periorbitis, Entzündung der Knochenhaut der Augenhöhle.

Periphakitis, Bezeichnung der nicht vorkommenden Linsenkapselentzündung.

Periscopische Brillen (*Wollaston*), p. 180.

Perspicilli, Brillen, p. 178.

Phalangosis s. Distichiasis, die Doppelreihe der Wimpern, p. 11.

Phakitis, Linsenentzündung (?), p. 97.

Phakohydropsia s. Cataracta fluida, Verflüssigung der Linsensubstanz.

Phakohymenitis s. Capsulitis, Linsenkapselentzündung.

Phakomalacia s. Cataracta mollis, Weichstaar.

Phakopyosis, Eitererguss in die Linsenkapsel.

Phakoscleroma s. Cataracta dura, Hartstaar.

Phantasmen, subjective Gesichterscheinungen, Gesichtstäuschungen, p. 128.

Phlegmatorrhoea, Schleimfluss.

Phlegmasia oculi dolens s. Ophthalmia nervosa, Complication eines Entzündungszustandes mit Ciliar- oder Supraorbitalneuralgie.

Phlyctaena, Wasserbläschen (auf der Bindehaut).

Phimosis palp. (*v. Ammon*), zu enge Lidöffnung p. 6. — Operat. p. 190.

Photolimia, Lichthunger, Unvermögen bei schwacher Beleuchtung zu sehen, oft Vorstadium von Nachtblindheit.

Phophobia, Lichtscheu, p. 137.

- Photopsia, Lichtsehen, als optische Hyperästhesie, p. 128.
 Phthiriasis palp. et superciliar., Läuse sucht der Augen, p. 12.
 Phthisis bulbi, Augapfelschwund, p. 167.
 Pinguecula, sogen. Fettfleck der Bindehaut, p. 42.
 Pinna s. Pterygium, p. 40.
 Platycoria, Defect des kleinen Irisringes oder bloss des Pupillar-
 randes, als erster Grad der Irideremie.
 Polycoria, Vorhandensein mehrerer Pupillen, p. 86.
 Polypi duct. lacrym., p. 159.
 Porosis s. Chalazion, Hagelkorn, p. 13.
 Presbyopia, Weitsichtigkeit, p. 163.
 Prolapsus iridis, lentis, Vorfall der Iris, p. 64, der Linse, p. 96.
 Prosphysis s. Symblepharon, p. 6.
 Prothesis ocularis, Einsetzung künstlicher Augen, p. 236.
 Pseudoblepsis, Pseudopia, Falschsehen.
 Psilosis, partieller oder totaler Ciliendefect.
 Pseudocilien, überzählige Cilien.
 Pseudocornea, p. 65. — Operat. p. 202.
 Psorophthalmia, Augenentzündung, die man ehemals fälschlich
 mit einer Krätzeachexie (?) in Causalnexus brachte.
 Pterygium, s. Sagitta, Polypus (?) oculi, Flügelfell, p. 40. —
 Operat. p. 201.
 Ptilosis s. Psilosis.
 Ptosis paralytica etc. Herabsinken des Oberlides, p. 7.
 Punctio corneae, Anstechen der Hornhaut, p. 201.
 Pupilla artificialis, künstliche Pupille, p. 225.
 Purkinje-Sanson'sches Experiment, p. 170.
 Pustula maligna palp., schwarze Blatter am Augenlide, p. 19.
 Pyorrhoea, Eiterfluss, p. 29.
 Pyramidenstaar, p. 100.

R.

- Raphiankistron (*Emden*), Nadel mit Haken zur Koremorphose.
 Reclinatio cataractae, p. 217.
 Relaxatio sacc. lacrym. s. atonia, p. 157.
 Resorptionsgeschwür, flache, selten tiefgehende Hornhautge-
 schwüre mit transparenter Basis, sog. Facetten, p. 51.
 Retinitis s. Dictyitis, Netzhautentzündung, p. 112.
 Rhacosis, partieller oder theilweiser Carunkelschwund nach
 Encanthis, p. 160.
 Rhexis oculi, Bersten des Auges.
 Rhinorrhaphie (*v. Ammon*), Operation des Epicanthus, p. 193.
 Rhyas s. Rhacosis, p. 160.
 Rhyditosis s. Ruditosia, Trübung, Runzelung, Schrumpfung der
 Hornhaut, Vorstadium von Xerosis, p. 40.

S.

- Scarrificatio corneae, p. 203.
 Scirrhus bulbi, p. 165.
 Sclerectasia, p. 77.
 Scleriasis palp. s. Tylosis, Augenlidschwiele.
 Scleritis, Lederhautentzündung, p. 76.
 Scleroma s. Sclerosis conj, s. Conj. arida, Dörrsucht der Bindehaut, p. 40.
 Scleronyxis, Nadeloperation durch die Lederhaut, p. 211.
 Scotomata, Scheinobjecte, Puncte, Flecken, Ringe, Fäden, Haare, Ketten, Kugeln, Bläschen, Fliegen etc. etc. mouches volantes, p. 178.
 Scotopsie s. Myodesopsie, Zustand des Sehens von Scotomen.
 Skiauge s. Scotopsie.
 Sphacelescenz der Cornea, Malacie und Necrotisirung der Hornhaut, p. 53.
 Spintheropie (*Sichel*), Sichtbarwerden von Cholestearine im Auge, p. 101.
 Staphyloma, obsoleter Name für Ectasie der Hornhaut oder der Sclera, für Pseudocornea, Keratoconus, Hydrophthalmus ant. etc. — St. corp. ciliar. p. 150.
 Stenochoria duct. nasal., Verengerung des Nasenganges durch Geschwulst der Schleimhaut derselben, p. 157.
 Stenocoria s. Myosis, p. 89.
 Stillicidium lacr. s. Dacryostagon, Thränenträufeln bei Unwegsamkeit des Nasenganges.
 Strabismus, Schielen, p. 151. — Operat. 229.
 Sublatio catar. (*Pauli*), Dislocation der Staarlinse nach Oben, p. 215.
 Suffusio nigra, s. Amaurosis.
 Sycosis, Bindehautgranulationen mit Ectropium, die dem Auge das Ansehen einer aufgeschnittenen Feige geben (*Plenk*), s. Palpebra ficosa.
 Symblepharon, Verwachsung der Lider mit dem Bulbus, p. 6. — Operat. p. 191.
 Syncathesis s. Synicesis pupill., p. 92.
 Syncanthus ext. u. int. (*v. Ammon*), Verwachsung eines Augenwinkels mit Sclera oder Cornea.
 Synchysis corp. vitr., Erweichung des Glaskörpers, p. 110. — S. scintillans, wenn Cholestearine gleichzeitig sichtbar wird.
 Syndesmitis, Bindehautcatarrh etc.
 Synechia ant. und S. post., Verwachsung der Iris mit der Cornea, p. 63 oder mit der Linsenkapsel, p. 93.
 Synicesis s. Atresia pupillae, Pupillensperre, p. 92.

T.

Taraxis, obsolete Bezeichnung für Bindehautschwellung und Entzündung.

Tarsoraphia (*v. Walther*), Methode der Operatio ectropii, p. 197.

Teleangiectasia palp., erectile Lidgeschwulst.

Tetanus oculi s. Spasmus oculi tonicus, p. 133.

Tinea ciliarum, sehr unpassender Name für Blepharodenitis; früher mit Lidkrätze Lippitudo herpetica u. dgl. identificirt.

Trachoma, Rauchigkeit der inneren Lidflächen, p. 23.

Trichiasis, Einwärtsstehen der Wimpern, p. 11. — Operat. p. 198.

Trichosis bulbi, Haarbildung auf entarteter Bindehaut.

Tristichiasis und Tetrastichiasis, dreifache, vierfache Cilienreihe, p. 11.

Tylosis, knotige Lidschwiele, Narbenwirkung.

U.

Ulcera corn., Hornhautgeschwüre, p. 51.

Ule, cicatrix corneae, glänzend weisse, undurchsichtige Hornhautnarbe.

Unguis s. Onyx, p. 74.

Uveitis (*v. Ammon*) meist chronischer Entzündungszustand des hinteren Irisüberzuges, dessen Vorkommen sehr zweifelhaft ist.

V.

Varices, Varicositas orbitae, Blutaderknoten in der Augenhöhle.

Varicositäten des Bulbus, fälschliche Bezeichnung für Ectasieen, mit Exsudaten gefüllt, die an der Cornea und Sclera häufig vorkommen, aber niemals auf Venenentartung beruhen.

Varicositas choroideae und retinae ist möglich, aber durch die ophthalmoskopische Methode bisher nicht mit Sicherheit nachweisbar gewesen.

Vesicula conjunctivae s. Phlyctaena, Wasserbläschen der Bindehaut, p. 27.

Visio muscarum s. Myodesopsie, p. 116.

Visio phantasmatum s. Pseudoblepsie, Sehen von Scheinbildern, p. 115.

Visus defiguratus, Entstelltsehen, p. 119.

Visus dimidiatus s. Hemiopia, p. 119.

Visus diurnus, Nachtblindheit, p. 126.

Visus duplex, Diplopia, Doppelsehen, p. 163.

Visus evanidus s. Asthenopia, p. 135.

Visus interruptus, lückenhaftes Sehen, p. 120.

Visus metamorphoticus s. defiguratus, p. 119.

Visus nocturnus, Tagblindheit, p. 120.

Visus reticulatus, Sehen von Netzen, dunklen vor hellem, hellen vor dunklem Hintergrunde.

Vortex purulentus, Eiterstock der Hornhaut, der Eiter und hum. aq. entleert.

X.

Xeroma s. Ophthalmia arida, sicca, Trockenheit der besonders durch Trachoma cutisirten Conjunctiva.

Xeromycter, Trockenheit der Nase bei aus Verengung des Nasenganges stammendem Thränenträufeln.

Xerophthalmia s. Xeroma.

Xerophthalmus, Trockenheit des Auges, z. B. bei Dacryadenitis.

Xerosis conjunct. s. Xeroma p. 40.

Erklärung der Tafeln.

Tafel I. Schematischer Horizontaldurchschnitt des rechten Auges.

Tafel II. 1. Cystotom von *Sichel* und Löffel von *Daviel* an einem Stiele.

2. Der Daviel'sche Löffel, von Vorn gesehen.

3. Gerade Staarnadel, Flächenansicht.

4. Dieselbe, Seitenansicht.

5. Gekrümmte Staarnadel.

6. Nadel zum Hornhautstich.

7a. und 7b. Sichelnadeln.

8. Ophthalmostat. (*Pamard*.)

9. Scharfer Haken zur Erhebung von Bindehautfalten etc.

10. Irishäkchen.

11a. Biegsamer Silberspatel von *Sichel*,

11b. Messerchen von *Desmarres* zur Vergrößerung des Hornhautschnittes.

12. Staarmesser von *Beer*.

13. Staarmesser von *F. Jäger*.

Tafel III. 14. Staphylommesser.

15. Lanzenmesser von *F. Jäger*.

16. Coreoncion von *Jüngken*.

17. Cylinderpincette (oder Serretête) von *Sichel* zur
Ectraktion von Kapselstaaren, Pseudomembra-
nen etc. Geöffnet.

18. Dasselbe Instrument mit geschlossenen Branchen.

19. Spritze von *Anel* mit geradem Röhrchen.

20. Aufsatz zu der *Anel'schen* Spritze mit krummem
Röhrchen.

21. Feine gekrümmte Augenpincette.

22. Pincette zur Iridectomie. Jede Branchenspitze
enthält ein Zäpfchen und eine demselben ent-
sprechende Oeffnung behufs festeren Erfassens
der Iris.

Tafel IV. I. Ein für Nadeloperation geöffnetes, cataractöses
Auge. — *a*. Verschliessbare Pincette, mit der
behufs Fixation des Bulbus eine Bindehautfalte
erfasst ist. — *b*. Scleroticalstich. — *b*. Corneal-
stich.


II. Bildung eines Hornhautlappens nach Oben.


III *a'* und *b'*. *Dieffenbach's* Methode der Transplanta-
tion eines seitlich entnommenen Hautlappens
zur Neubildung des zerstörten Unterlides.


IV *a* und *b*. *Desmarres* Modification der *Adams'schen*
Methode der Operatio ectropii. Der Horizontal-
schnitt darf die Lidcommissur nicht treffen.


V *a'''*, *b'''*, *c'''*. *Dieffenbach's* Methode zur Bildung
eines neuen Lides. *a'''* zeigt die Richtung der
Schnittlinien, *b'''* das von den Schnittlinien her


abgelöste und emporgehobene Unterlid, c''' die Befestigungsart des emporgehobenen Unterlides und den Schluss des Defectes durch Herbeiziehen und Befestigen der Seitenpartieen.











Im vorigen Jahre erschien:

DER AUGENSPIEGEL,

SEINE ANWENDUNG UND MODIFICATIONEN

NEBST BEITRÄGEN

ZUR DIAGNOSTIK INNERER AUGENKRANKHEITEN.

Nach dem Holländischen des Dr. van Trigt

mit Zusätzen bearbeitet

von

Dr. C. H. SCHAUENBURG,

Docenten an der Universität zu Bonn.

Preis 21 Sgr. = 1 fl. 24 kr. Mit col. Abbildungen 1 Rthlr. = 1 fl. 48 kr.
Eleganteste Ausstattung.

Auszüge aus Recensionen.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien.

Mit wahrem Vergnügen geben wir obigem Werke das Zeugniß, dass es das angestrebte Ziel erreicht habe. — Wir stehen daher auch nicht an, dieses Werk als ein in hohem Grade zeitgemässes und den Bedürfnissen des practischen Arztes jedenfalls mehr als die meisten übrigen diesfälligen Werke entsprechendes bestens zu empfehlen. Allenthalben spiegelt sich in der Sprache und in den dargelegten Ergebnissen der gafflogenen Untersuchungen die Nüchternheit des Forschers und sein aufrichtiges, zum Theil sehr glückliches Streben, der Wahrheit nahe zu rücken etc. —

Stellwag von Carion.

Canstatt's Jahresbericht. 1854. II. 2.

Die unter der Leitung von Donders gearbeitete Schrift von van Trigt hat Herr Schauenburg mit eigenen werthvollen Zusätzen ins Deutsche übertragen. Was diese mit ausserordentlich zahlreichen Specialbeobachtungen versehene Schrift noch besonders auszeichnet, ist der Versuch, die klinischen Resultate durch Experimente an Kaninchen einer genaueren Controlle zu unterwerfen.

Prof. Virchow.

Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer. VIII.

Wir glauben unserer Aufgabe Genüge zu leisten, wenn wir den Leser auf den lehrreichen Inhalt dieser mit Fleiss und grosser Genauigkeit bearbeiteten Schrift aufmerksam machen.

Fr.

Zeitschrift des deutschen Chirurgen-Vereins.

Eine kurze Betrachtung des Inhaltes der vorliegenden Schrift wird den strebsamen Praktiker zu weiterem Studium derselben veranlassen.

Medicinische Central-Zeitung.

So fordern wir denn im Interesse der Wissenschaft wie ihrer Vertreter diejenigen unserer Collegen, die es bisher unterlassen, auf der neuen Methode die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, und sich zu diesem Behuf Schauenburg's vor uns liegende Bücher.

DAS ACCOMMODATIONSVERMÖGEN DER AUGEN.

Nach Dr. A. Cramer zu Groningen und Professor Donders zu Utrecht
von

Dr. C. H. SCHAUENBURG, Docenten zu Bonn.

Mit Abbildungen. Preis 10 Sgr. = 36 kr.

DIE KÜNSTLICHE PUPILLE VOR UND IN DEM AUGE

von

Dr. C. H. SCHAUENBURG, Docenten zu Bonn.

Preis 10 Sgr. = 36 kr.

Druck von J. H. Geiger in Lahr.

Schauenburg, Hermann,

Ophthalmiatrik Mit Holzschnitten u. 4 lithogr. Tafeln

Lahr 1846

Chir. 270 f

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10391940-5